


Smithsonian Institution
Libraries



GIFT OF
Marcia Brady Tucker



vaernewyck



Dessiné et Gravé par F. N. Martinet, Dessinateur de M^{te} le Duc de la Rochefoucauld, et d'Expilly.

ORNITHOLOGIA

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES,
Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

*CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIEI
descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium,
Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nomi-
nibusque vulgaribus.*

A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Opus Figuris æneis adornatum.

VOLUMEN V.



PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM,

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam,
ad Insigne S^æ. Genovefæ, & S^{ti}. Joannis in Deserto.

M. DCC. LX.

CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.

ORNITHOLOGIE

O U

M É T H O D E

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX
en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés.

*A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION
exacte de chaque Espece, avec les Citations des Auteurs
qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux
que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms
vulgaires.*

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

T O M E V.



A P A R I S,

QUAY DES AUGUSTINS,


Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte
Geneviève & S. Jean dans le Désert.

M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.



QL
673
Bis
P. 5
t. 5
SCN. 117



REGNUM LE REGNE
 ANIMALE. ANIMAL.
 CLASSIS III. CLASSE III.
 ORDO XV. ORDRE XV.
 AVES LES OISEAUX

Digitis membranis destitutis: cruribus in parte inferiore plumis denudatis: alisque, pro mole corporis, exiguis & volatui inutilibus donatae.

Qui ont les doigts dénués de membranes: la partie inférieure des jambes dénuée de plumes: & les ailes petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

HUJUS Ordinis Aves nunquam volant, idque ob alarum breviteriam corporis molli comparatam.

Aliae duobus tantum donantur digitis anticè positis, postico nullo: aliae tres ha-

Tom. V.

LES Oiseaux de cet Ordre ne volent jamais, vu la brieveté de leurs ailes, eu égard à la grosseur de leur corps.

Les uns n'ont que deux doigts placés en-devant, & n'en ont point derriere: d'au-

A

2 LE REGNE ANIMAL.

tres ont trois doigts aussi placés en-devant, sans en avoir derriere : d'autres enfin ont quatre doigts, sçavoir trois placés en-devant, & un en-arriere. Je les divise en trois sections : dans la premiere sont ceux qui ont deux doigts devant & point derriere (voyez *Tome I. Pl. II. Fig. 1*), comme l'*Austruche* : dans la seconde ceux qui ont trois doigts devant, & point derriere, comme le *Thouyou*, le *Casoar* : & dans la troisieme ceux qui ont quatre doigts, sçavoir trois devant & un derriere, comme le *Dronte*.

bent digitos, anticè similiter positos, postico quoque nullo : alia tandem quatuor digitis præditæ sunt, tribus scilicet anticis, unico postico. In tres sectiones dividuntur : prima continet eas quæ digitos habent duos anticos, posticum nullum (vide *Vol. I. Tab. II. Fig. 1*), ut *Struthio* : secunda eas quæ digitis donantur tribus anticis, postico nullo, ut *Rhea*, *Casuarium* : tertia verò illas quæ digitos habent quatuor, tres scilicet anticos & posticum unum, ut *Raphus*.

SECTION I.

Ceux qui ont deux doigts devant & point derriere.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui de l'*Austruche*.

Cet Oiseau a le bec droit, applati horizontalement ; & son bout est onguiculé & arrondi : la partie supérieure de sa tête est chauve & calleuse.

SECTIO I.

Eæ quæ digitos habent duos anticos, posticum nullum.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Struthionis*.

Avis ista rostro donatur recto, horizontaliter subplano, cujus apex est subrotundus, unguiculatus : capitis ipsius superior pars calva est & callosa.

Genus Struthionis.

Le Genre de l'Austruche.

Hujus character est
 Digiti duo antichi, membran-
 nis destituti; digitus pos-
 ticus nullus:
 Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:
 Rostrum rectum, horizon-
 taliter subplanum; hujus
 apex subrotundus, ungui-
 culatus:
 Superior capitis pars calva
 & callosa:
 Alæ, pro corporis mole,
 exiguæ, & volatui inu-
 tiles.

Son caractere est d'avoir
 Deux doigts devant, dénués
 de membranes; & point de
 doigt derriere:
 La partie inférieure des jambes
 dénuée de plumes:
 Le bec droit, applati horizon-
 talement; son bout ongui-
 culé & arrondi:
 La partie supérieure de la tête
 chauve & calleuse:
 Les ailes petites à proportion
 de la grosseur du corps, &
 point propres pour le vol.

** I. L'AUTRUCHE.

Voyez Pl. I. Fig. 1.

Struthio pennis nigris in toto corpore vestitus, albis & gri-
 seis quandoque admixtis; remigibus majoribus rectricibus-
 que candidis STRUTHIO.

Struthio pedibus didactylis. Camelus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 86.*
sp. 1.

Struthio pennis candidissimis, lanuginosis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen XL.*

Struthio. *Klein. Avi. pag. 16.*

Moehr. Avi. Gen. 54.

Struthio; Struthio-Camelus. *Charlet. Exer. pag. 79. N°. X.*

Charlet. Onomazt. pag. 71. N°. X.

Struthio; Struthio-Camelus; Struthio Africa; Struthio Libycus; Stru-
 thio-Camelus. *Gesn. icon. Avi. pag. 69, in qua hujus icon pessima.*

Struthio-Camelus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag. 587. icones non satis ac-
 curatæ, maris pag. 590, & feminae pag. 591.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 350.

Willugh. Ornith. pag. 104. hujus icon satis accurata (exceptis pedibus)

Tab. XXV.

- Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 200.*
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 62. sp. 1.
 Struthio-Camelus, five Struthio. *Raj. Syn. Avi. pag. 36. N^o. 1.*
 Struthio-Camelus Africanus, pullus. *Seb. Vol. I. pag. 83. hujus icon
 satis accurata Tab. LI. fig. 6.*
 Strutho-Camelus. *Gesn. Avi. pag. 739. hujus icon pessima pag. 740.*
Jonst. Avi. pag. 35. hujus duæ icones non satis accuratæ Tab. XXI.
 Autruche. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 231 ; avec une très-mauvaise figure
 pag. 232.*
Bel. Portr. d'Ois. pag. 55 a, dans laquelle est la même figure.
*Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 113 ; avec une figure assez
 exacte Pl. 53.*
*Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 147 ; avec une mau-
 vaise figure pag. 164. N^o. 3.*
Alb. Tom. III. pag. 13 ; avec une figure mal coloriée Pl. 31.
 Les Hébreux l'appellent JACUAH. *Gesn. Aldrov.*
 Les Chaldéens, NAAMITHA. *Gesn. Aldrov.*
 Les Arabes, NEAMAH. *Gesn. Aldrov.*
 Les Grecs, Στρυθος. *Bel. Gesn. Στρυθος ; Στρυθοκάμηλος ; Στρυθοῦκαμήλος.*
Aldrov. Jonst. Στρουδιοκάμηλος ; Στρουθος ; μεγάλην ; Στρουθος λιγυκος.
Schwenck. Στρυθος. Bel.
 Les Grecs modernes, Στρυφοκάμηλος. *Gesn. Aldrov. Στρειτοκαμηλος. Jonst.*
 Les Portugais, EMA. *Klein. EMA DI GEI. Gesn. Aldrov.*
 Les Espagnols, AVESTRUZ. *Gesn. Aldrov.*
 Les Catalans, ABASTRUS. *Barr.*
 Les Italiens, STRUTZA. *Bel. Gesn. STRUZZO ; STURZO. Gesn. Aldrov.*
 Les Allemands, STRUSS ; STRAUSS. *Gesn. Aldrov. STRAUS ; STRAUS-
 VOGEL. Schwenck.*
 Les Flamands, VOGEL STRUIJS. *Aldrov.*
 Les Illyriens, PSTROS. *Gesn. Aldrov.*
 Les Polonois, STRUS. *Gesn. Aldrov.*
 Les Suédois, STRUTZ. *Linn.*
 Les Anglois, OSTRICH. *Willugh. Raj. Klein. Alb. OSTRIDGE. Charlet.*

L'Autruche est le plus grand & le plus gros de tous les Oiseaux. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pieds six pouces, & jusqu'à celui de l'ongle de huit pieds quatre pouces. Son bec, qui a à son origine deux pouces six lignes de

Alitum omnium maximus & crassissimus est *Struthio*. Ipsi^{us} longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pedes & sex pollices æquat, & ad extremos ungues octo pedes & quatuor pollices. Rostrum, quod in exortu

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XV.* 5

Quorum pollicum & sex linearum latitudinem obtinet, ab ipsius extremitate ad oris angulos, ultra oculos quidem protensos, quatuor pollices & sex lineas longum est; cauda tredecim pollices; pes quindecim pollices & tres lineas; major digitus, scilicet interior, cum ungue septem pollices & novem lineas; exterior, qui quidem ungue caret, quatuor pollices & sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & septem pollicum intervallo distant: alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem pertingere queunt. Capitis superior pars plumis est omnino destituta & penitus nuda. Reliquum caput, guttur & collum, per mediam ipsius longitudinem capiti finitimam, cute obteguntur carneo colore livido imbutâ, lanugine, rariorum pilorum æmulâ, albâ & splendente obsitâ. Collum per mediam ipsius longitudinem corpori viciniorem, dorsum, uropygium, pectus & ventrem vestiunt pennæ nigræ, quas inter quandoque immiscentur quædam candidæ & quædam griseæ. Pennæ sca-

largeur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-delà des yeux, quatre pouces six lignes de long; sa queue treize pouces; son pied quinze pouces trois lignes; le plus grand de ses doigts, qui est l'intérieur, joint avec l'ongle, sept pouces neuf lignes; l'extérieur quatre pouces six lignes. Ce dernier n'a point d'ongle. Elle a six pieds sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, peuvent s'étendre jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est tout-à-fait dégarinée de plumes & entièrement nue. Le reste de la tête, la gorge & le col, dans la moitié de sa longueur qui est la plus voisine de la tête, sont couverts d'une peau de couleur de chair livide, garnie d'un duvet, en forme de poils clair-semés, blanc & brillant. La moitié de la longueur du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine & le ventre sont couverts de plumes noires, parmi lesquelles en sont mêlées quelquefois quelques-unes de blanches & quelques-unes de grises. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont pareillement noires, & mêlées de quel-

ques plumes blanches & grises. (Dans les jeunes tout le corps est couvert de plumes d'un gris-brun). Les jambes, les côtés & le dessous des ailes sont entièrement dé garnis de plumes ; & la peau est dans ces endroits d'un blanc-rougeâtre. La peau qui couvre les jambes, est garnie de rides un peu élevées, qui se croissent les unes & les autres, & laissent entr'elles des espaces quarrés. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un très-beau blanc : les moyennes sont noires. La queue est composée de plumes du même blanc que celui des grandes plumes de l'aîle. Toutes les plumes de cet Oiseau sont décomposées, c'est-à-dire, que leurs barbes sont séparées les unes des autres, & n'ont aucune connexion entr'elles. Cet Oiseau a au bas du sternon une callosité sur laquelle il s'appuye, lorsqu'il se couche. A chaque aîle sont deux ergots, longs d'environ un pouce, ayant à leur bâte une ligne & demie de diamètre, d'une substance semblable à de la corne, placés, l'un au bout de l'aîle, & l'autre au bout de l'aîle bâtarde. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est de couleur de corne, excepté son bout qui est noirâtre. Les

pulares & superiores alarum rectrices sunt similiter nigrae, plumis quibusdam albis & griseis interfertis. (Juniores per universum corpus pennis vestiuntur griseo-fuscis). Crura, latera & partes subalares plumis penitus destituuntur ; cutis autem iis in locis ex albo rubescit. Supra cutem crura cooperientem rugae sunt ipsius superficiem nonnihil excedentes, aliae alias decussantes, & intervalla inter se quadrata efformantes. Remiges alarum majores candore nitent : minores sunt nigrae. Caudam componunt rectrices eodem imbutae candido ac remiges majores ipsae tinguntur. Omnes hujus Avis pennae sunt decompositae, sive, quod idem est, ipsarum pinnulae sunt à se invicem disjunctae, & nullo modo inter se connectuntur. In infima sterni parte callositas est quaedam, cui, humi procumbens, insidet haec Avis. Utraque ala binis donatur calcaribus, unum circiter pollicem longis, quorum in basi diameter sesquilineam aequat, substantiae corneae æmulis, alio scilicet in alae apice, altero in alae nothae extremitate posito. Oculorum irides avellanæ.

Rostrum corneo colore imbutum, attamen in extremitate nigricans. Pedes grisei sunt; unguis autem nigricat. Bini digiti membranâ validâ, ad primum usque articulum extensâ, inter se connectuntur. *Struthio* in arenam ova ponit; & per noctem tantum ea incubat; interdum enim sol ad ipsorum incubationem sufficientem præbet calorem. Habitat in *Africa*.
Ex museo Realmuriano.

pieds sont gris; & l'ongle est noirâtre. Les deux doigts sont réunis par une forte membrane qui s'étend jusqu'à la première articulation. L'*Autruche* dépose ses œufs dans le sable, & ne les couve que pendant la nuit; parce que pendant le jour le soleil donne une chaleur suffisante pour leur incubation. On la trouve en *Afrique*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

SECTIO II.

Eæ quæ digitos habent tres anticos, posticum nullum.

DUO in illa sectione continentur genera Avium, rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur recto, horizontaliter subplano; hujus apice subrotundo, ut *Rhea*: aliæ verò rostrum habent rectum, subconicum: istæ autem habent quoque caput galeâ corneâ instructum: & palearia bina in juguli medio posita, ut *Casuarus*.

SECTION II.

Ceux qui ont trois doigts devant & point derriere.

CETTE section contient deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec droit, applati horizontalement; & son bout est arrondi, comme le *Thouyou*: & les autres ont le bec droit & presque conique; ceux-là ont un casque de corne sur la tête: & deux membranes charnues placées vers le milieu de la gorge, comme le *Casuar*.

Le genre du Thouyou. (1).

Son caractère est d'avoir
Trois doigts devant, dénués
de membranes; & point de
doigt derrière :

La partie inférieure des jam-
bes dénuée de plumes :

Le bec droit, aplati horizon-
talement; son bout arrondi :

Les aîles petites à proportion
de la grosseur du corps, &
point propres pour le vol.

(1) *Thouyou*, nom formé de *Thouyouyou*,
qui est celui que les Indiens de la *Guiane*
donnent à l'espèce de ce genre.

Genus Rheæ. (1):

Hujus character est
Digiti tres antichi, membra-
nis destituti; digitus pos-
ticus nullus :

Crura in parte inferiore plu-
mis denudata :

Rostrum rectum, horizon-
taliter subplanum; hujus
apex subrotundus :

Alæ, pro corporis mole,
exiguæ, & volatui inuti-
les.

(1) *Rheæ*, nomen à *Mochringia*
huic generi inditum.

I. LE THOUYOU.

Rheæ pennis griseis in toto corpore vestita RHEÆ.

Rheæ. Moehr. Avi. Gen. 55.

Struthio digito postico rotundato mutilo. Struthio Americanus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 86. sp. 3.

Struthio. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 557.

Euf. Nieremb. pag. 217. hujus icon minus accurata pag. 218, sub titulo, Emeu.

Struthio-Camelus. Jonst. Avi. pag. 153.

Struthio-Camelus Americanus. Raj. Syn. Avi. pag. 36. N°. 2.

Struthio nothus. Klein. Avi. pag. 17.

Grus cinerea ferrivora. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 133.

Ardea Americana, cinerea, ferrivora, capite calvo. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 11.

Avis Eme. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 541, in qua hujus icon à Nierembergio mutuata.

Emeu nigricans, cervice longiori ac tenuiori. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXVIII. sp. 2.

Emeu Nierembergii. Jonst. Avi. hujus icon à Nierembergio mutuata Tab. 56.

Yandou,

- Yandou. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 616.*
 Iandou. *Jonst. Avi. pag. 125.*
Charlet. Exer. pag. 118. N^o. XX.
Charlet. Onomazt. pag. 115. N^o. XX.
 Nhandu-guacu. *Pison. Hist. Nat. pag. 84, in qua hujus icon non satis accurata.*
 Nhandu-guacu Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 190.*
Jonst. Avi. pag. 130.
 Nhandu-guacu Brasiliensibus, Ema Lusitanis, sive Struthio-Camelus Americanus *Marcgravio. Willugh. Ornith. pag. 105.*
 Autruche de Guiane. *Des March. Tom. III. pag. 324.*
Les Portugais l'appellent EMA. Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.
Les Barbares, YANDOU. De Laët. Jonst. ANDUGOACU. De Laët.
Les Brasiliens, NHANDU-GUACU. Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.
Les Indiens, SURI: & d'autres IARDU. Nieremb.
Les Indiens de la Guiane, THOUYOUYOU. Barr.

Magnitudine & crassitie paululum *Struthioni* cedit. Collum ipsius duos circiter pedes longum est; rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices cum sex lineis; pes octodecim pollices; crus unum pedem. Universum corpus vestiunt pennæ griseæ. Alæ sunt valdè breves. Caudâ caret hæc Avis; sed ipsius loco pennæ uropygium vestientes longæ sunt, deorsum tendunt; & anum obtegunt. Oculos habet aterrimos; digitos unguibus nigris, crassis & obtusis armatos. Dignifici postici loco callositas extat crassa & rotundata. Fructibus & carne vescitur. Habitat in *Guiana & Brasilia* in *Seregippæ & Fluvii magni præfecturis.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros; ni si grand que l'*Autruche*. Son col a environ deux pieds de long; son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces six lignes; son pied dix-huit pouces; & sa jambe un pied. Tout son corps est couvert de plumes grises. Ses ailes sont extrêmement courtes. Il n'a point de queue; mais à sa place les plumes du croupion sont longues, & retombent en en-bas, pour venir couvrir l'anus. Ses yeux sont d'un très-beau noir. Ses doigts sont armés d'ongles noirs, gros & obtus. A la place du doigt de derrière est une callosité épaisse & arrondie. Il se nourrit de fruits & de viande. On le trouve dans *la Guiane*, & au *B Brésil* dans les Gouvernemens de *Seregippe* & de *Rio Grande*.

*Le genre du Casoar.**Genus Casuarii.*

Son caractère est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de
membranes; & point de doigt
derrière :

La partie inférieure des jambes
dénuée de plumes :

Le bec droit, presque coni-
que :

Un casque de corne sur la tête :

Deux membranes charnues vers
le milieu de la gorge :

Les ailes petites à proportion
de la grosseur du corps, &
point propres pour le vol.

Hujus character est
Digiti tres antici, membra-
nis destituti; digitus pot-
ticus nullus :

Crura in parte inferiore plu-
mis denudata :

Rostrum rectum, subconi-
cum :

Caput galeâ corneâ instruc-
tum :

Palcaria bina in juguli me-
dio :

Alæ, pro corporis mole, exi-
guæ, & volatui inutiles.

** I. LE CASOAR.

Voyez Pl. I. Fig. 2.

Casuarus niger; capite & collo supremo nudis . . . ,
CASUARIUS.

Casuarus. *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab. 105.*

Casuarus. *Klein. Avi. pag. 17.*

Struthio pedibus tridactylis, vertice palearibusque nudis. Casuarus.
Linn. Syst. Nat. ed. 10. Gen. 86. sp. 2.

Cela. *Moehr. Avi. Gen. 56.*

Avis Eme. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 541.*

Emeu pennis setosis, nigricantibus, crassâ cervice. *Barr. Ornith.*
Class. III. Gen XXXVIII. sp. 1.

Emeu Avis. *Clus. exot. Lib. V. Cap. III. pag. 97. hujus icon satis ac-*
curata pag. 98.

Emeu. *Charlet. Exer. pag. 79. N° XI.*

Charlet. Onomazt. pag. 71. N° XI.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 63. sp. 1.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XV.* 11

Emeu Clusii. *Euf. Nieremb. pag. 218, in qua hujus icon à Clusio mutuata.*

Emeu, seu Eme Clusii. *Jonst. Avi. pag. 119. hujus icon à Clusio mutuata Tab. 56.*

Emeu, seu Eme Aldrovandi, Clusii, Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag. 105. hujus icon non satis accurata Tab. XXV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 36. N^o. 3.

Emeu, vulgò Casoar. *Bont. Ind. Ori. pag. 71, in qua hujus icon pessima.*

Emeu à quibusdam dictus Casearius. *Mus. Worm. pag. 292.*

Casoar. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 157; avec une figure pas assez exacte Pl. 56.*

Cassowary. *Alb. Tom. II. pag. 39; avec une figure peu exacte, & mal coloriée Pl. 60.*

Les Allemands l'appellent CASUAR, ou EMEU. Frisch.

Les Suédois, EME. Linn.

Les Anglois, CASSOWARY. Willugh. Raj. CASSOWARE. Charlet. CASSAWAR. Alb.

Les Indiens, EME Aldrov.

Cassitie *Struthionem* ferè adæquat; sed non tantam obtinet altitudinem. Ipsi longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum quatuor pedes explet, & ad extremos unguis quinque pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, infra oculos usque protensus, quatuor pollices & sex lineas longum est; pes duodecim pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices cum sex lineis, extimus quatuor pollices, intimus autem quatuor pollices & sex lineas; digiti enim intimi unguis trium pollicum longitudine pollet. In superiore capitis parte incrementum

Il est presque aussi gros que l'*Autruche*; mais il n'est pas si élevé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est de quatre pieds, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-dessous des yeux, a quatre pouces six lignes de long; son pied douze pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces six lignes, l'extérieur quatre pouces, & l'intérieur quatre pouces six lignes; car l'ongle de ce dernier a jusqu'à trois pouces de long. Sur la partie supérieure de la tête est une excroissance osseuse, garnie d'une matière cornée, qui

forme une espece de casque, & qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers le milieu du sommet de la tête. Ce casque a trois pouces de hauteur, un pouce de largeur à sa base, & seulement trois lignes dans sa partie supérieure. Sa partie antérieure est noirâtre : sa partie postérieure & ses côtés sont d'un jaune de cire. Le tout en est lisse & brillant. La tête, la gorge & la partie du col la plus voisine de la tête sont couvertes d'une peau nue & garnie seulement de quelques petites plumes noires, clair-semées. Cette peau est bleue sur les côtés de la tête : sur la partie postérieure de la tête, la gorge & le col elle est d'un violet tirant sur le cendré : il y a seulement un peu de rouge sur le milieu de la partie supérieure du col, la peau formant en cet endroit des plis ou especes de rides. Sur la partie inférieure du col, vers le milieu de sa longueur, sont situées deux membranes charnues, longues d'un pouce six lignes, larges de neuf lignes, & arrondies par le bout. Ces membranes sont en partie rouges & en partie bleues. Sur le sternon est une callosité, sur laquelle l'Oiseau s'appuie, lorsqu'il est couché. Tout le reste de son corps, sçavoir la

extat osseum, materiâ corneâ coopertum, quodammodo efficiens galeam ab exortu rostri medium versùs capitis verticem protensam. Galea autem trium pollicum altitudinem, unius pollicis in basi; & trium tantum linearum in suprema parte latitudinem obtinet. In anteriore parte nigricat: in posteriore verò; sicut & ad latera, cereo colore imbuitur. In tota superficie lavigata est & splendens. Caput, guttur & partem colli capiti viciniorem cooperit cutis nuda, quibusdam tantum & rarioribus plumulis nigris obsita. Quae cutis est ad latera capitis caerulea, in parte capitis posteriore, gutture & collo ex violaceo ad cinereum vergens: in colli superioris medio aliquid tamen rubri admiscetur; & eo in loco rugis exaratur cutis. In collo inferiore, versùs mediam ipsius longitudinem, palearia extant bina, unum pollicem & sex lineas longa, novem lineas lata, & in extremitate rotundata. Palearia autem ista sunt partim rubra & partim caerulea. Super sternum callositas est quaedam, cui, humi procumbens, insidet hæc Avis. In

universo reliquo corpore, colli scilicet parte corpori viciniore, dorso, uropygio, pectore, ventre, cruribus, lateribusque, pennis vestitur nigris, omnibus decompositis, id est, quarum pinnulæ sunt à se invicem disjunctæ, & nullo modo inter se connexæ. Pleraque pennæ sunt in utroque alveolo binæ : ex quibusdam tamen alveolis unica tantum oritur penna. Omnium autem pennarum scapi sunt plani, splendide nigri in parte inferiore nodis obfiti, ex quibus oritur pinnula ; vulgò maximâ longitudine pollens. In uropygio quædam extant plumæ quatuordecim pollices longæ. Omnes autem hujus Avis pennæ magno perè ad pilorum formam accedunt ; & si à longè conspiciatur hæc Avis, pilis potius quam pennis vestita videtur. Ala, quæ quidem plumis denudata trium pollicum longitudinem non attingit, quinque conflatur remigum scapis pinnulis destitutis, splendide nigris, paululum arcuatis ; & quorum major undecim pollicum longitudine pollet. Caudâ caret hæc Avis. Oculorum irides eleganti imbuuntur Topazii co-

partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont couverts de plumes noires, toutes décomposées, c'est-à-dire que leurs barbes sont séparées les unes des autres, & n'ont entr'elles aucune connexion. La plupart de ces plumes sont placées deux à deux dans chacun des alveoles ; il y en a cependant quelques-uns dont il ne sort qu'une seule plume. Les tiges de toutes ces plumes sont plattes, d'un noir brillant, & garnies en-dessous de nœuds, de chacun desquels part une barbe, qui est ordinairement fort longue. Sur le croupion sont même quelques plumes qui ont jusqu'à quatorze pouces de longueur. Toutes ces plumes ressemblent beaucoup à des poils ; & si on le regarde d'un peu loin, cet Oiseau paroît être couvert plutôt de poils que de plumes. L'aîle, qui dénuée de plumes n'a pas trois pouces de long, est composée de cinq tiges de plumes dégarnies de barbes, d'un noir-brillant, un peu courbées en arc, & dont la plus grande a onze pouces de longueur. Cet Oiseau n'a point de queue. L'iris de ses yeux est d'une belle couleur de Topaze. L'ouverture des oreilles est grande, & entourée de petites plu-

mes noires. Les narines sont placées sur le demi-bec supérieur assez près de son extrémité. Les bords des deux mandibules sont un peu échancrés de chaque côté vers leur bout. Le bec est d'un gris-brun. Les pieds qui sont fort gros, sont d'un gris-jaunâtre ; & les ongles noirs. La partie de la jambe qui est dégarinée de plumes est extrêmement courte. On le trouve aux *Indes Orientales*. Du cabinet de M. de Reaumur.

lore. Aurium foramina ampla, plumulis nigris circumdata. Nares in mandibula superiore prope ipsius extremitatem sitæ sunt. Mandibulæ binæ apice utrinque nonnihil emarginatæ. Rostrum griseo-fuscum. Pedes, qui quidem crassissimi, griseo-flavicantes ; ungues verò nigri. Crurum pars inferior plumis denudata valde brevis est. Habitat in *India Orientali*. Ex museo *Realmuriano*.

SECTION III.

Ceux qui ont quatre doigts, savoir trois devant & un derriere.

CETTE section est composée d'un seul genre, savoir de celui du *Dronte*.

Cet Oiseau a le bec long & fort ; le bout de ses deux mandibules est crochu.

L X V.

Le genre du Dronte. (1).

Son caractère est d'avoir quatre doigts dénués de membranes ; trois devant , un derriere :

(1) *Dronte*, nom que les Habitans de l'Isle *Maurice* donnent à l'espece de ce genre.

SECTIO III.

Eæ quæ digitos habent quatuor, tres scilicet anticos, posticum unum.

UNICO genere, *Raphi* scilicet, constituitur hæc sectio.

Avis ista rostro donatur longo, valido, cujus utriusque mandibulæ apex est aduncus.

L X V.

Genus Raphi. (1).

Hujus character est Digitum quatuor, membranibus destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :

(1) *Raphus*, nomen à *Mochringio* huic generi inditum.

Crura in parte inferiore plu- mis denudata :	La partie inférieure des jambes dénuee de plumes :
Rostrum longum , validum :	Le bec long & fort :
Utriusque mandibulæ apex aduncus :	Le bout des deux mandibules crochu :
Alæ , pro corporis mole , exiguæ , & volatui inuti- les.	Les ailes petites à proportion de la grosseur du corps , & point propres pour le vol.

I. LE DRONTE.

Raphus pennis griseis in toto corpore vestitus ; remigibus ,
rectricibusque flavo-cinereis ; capite cucullato
RAPHUS.

Raphus. *Moehr. Avi. Gen. 57.*

Struthio pedibus tetradactylis , omnibus unguiculatis. Struthio cucul-
latus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 86. sp. 4.*

Gallinaceus Gallus peregrinus. *Clus. Exot. Lib. V. Cap. IV. pag. 99.*
hujus icon pessima pag. 100.

Cygnus cucullatus , seu Gallus Gallinaceus peregrinus Clusii. *Euf.*
Nieremb. pag. 232. hujus icon à Clusio mutuata pag. 231.

Jonst. Avi. pag. 122. hujus icon à Clusio mutuata Tab. 56.

Cygnus cucullatus Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag. 37. N°. 4.*

Cygnus cucullatus Nierembergii , sive Gallus Gallinaceus peregrinus
Clusii. *Willugh. Ornith. pag. 107. hujus icon à Bontio mutuata Tab.*
XXVII, sub titulo , Dodo.

Dronte , aliis Dod-aers. *Bont. Ind. Ori. pag. 70 , in qua hujus icon*
non satis accurata.

Dodo Lusitanorum , Cygnus cucullatus. *Charlet. Exer. pag. 117. N°. XV.*
Charlet. Onomazt. pag. 113. N°. XV.

Les Portugais l'appellent DODO. Jonst. Charlet.

Les Hollandois , WALGH-VOGEL. Clus. Nieremb. Jonst. Willugh.

Les Anglois , DODO. Willugh. Raj. Charlet. MONK-SWAN OF S. MAURI-
CE'S ISLAND. Charlet.

Les Habitans de l'Isle Maurice , DRONTE. Bont.

Crassitie *Cygnum* paulu-
lùm antecellit. Rostrum ha-
bet longissimum & validum ;
cujus utriusque mandibulæ
apex aduncus. Pes quatuor

Il est un peu plus gros qu'un
Cygne. Son bec est très-long &
fort ; & le bout de ses deux man-
dibules est crochu. Son pied a
un peu plus de quatre pouces


de long, & près de quatre pouces de circonférence. Celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a environ trois pouces de long : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière a deux pouces neuf lignes de longueur ; car son ongle est le plus long de tous. Sa tête est grosse, mal faite, & couverte d'une membrane qui représente assez bien un capuchon. Tout son corps est couvert de plumes grises, assez douces au toucher. Ses ailes, qui sont extrêmement courtes, sont composées de quelques plumes d'un jaunecendré. Les plumes de la queue, qui sont frisées, sont de la même couleur. (Selon *Clusius* les plumes de l'aile & les jambes sont noires). Ses yeux sont grands & noirs. Les coins de la bouche s'étendent bien au-delà des yeux ; ce qui rend son ouverture extrêmement grande. Le bec est d'un bleu clair ou blanchâtre, excepté le bout du demi-bec supérieur, qui est jaunâtre, & celui du demi-bec inférieur, qui est noirâtre. Les pieds sont jaunâtres ; & les ongles noirs. On le trouve dans l'Isle Maurice en Afrique.

pollicum longitudinem nonnihil excedit ; & ipsius circumferentia quatuor pollices ferè adæquat. Trium digitorum anticorum medius cum ungue tres circiter pollices longus est : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem duos pollices & novem lineas longus ; ungue enim omnium longissimo donatur. Caput habet crassum, deforme, quâdam coopertum membranâ cucullum referente. In universo corpore mollibus vestitur plumis griseis. Alæ ; quæ quidem valdè breves, quibusdam constant remigibus flavo-cinereis. Caudam componunt rectrices concolores & crispæ. (Secundùm *Clusium* remiges & crura nigri sunt coloris). Oculi magni sunt & nigri. Oris anguli ultra oculos multùm protenduntur ; unde fit rictus valde patulus. Rostrum dilutè cœruleum sive cœruleo - albicans, attamen in mandibulæ superioris extremitate flavescens, in mandibulæ inferioris apice nigricans. Pedes flavescentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Mauritia* ; *Africa Insula*.



Fig. 2.

2. Casoar.






Fig. 1.


Fig. 2.


Echelle de 2. Pieds.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Autruche.

2. Casoar.





ORDO XVI. ORDRE XVI.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis tribus anticis, membranis destitutis; digito postico nullo: cruribus in parte inferiore plumis nudatis: alisque sat magnis, & volatui idoneis præditæ.

Qui ont trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derrière: la partie inférieure des jambes dénuée de plumes: & les aîles assez grandes, & propres pour le vol.

HUJUS Ordinis Avium aliæ rostrum habent conico - incurvum: aliæ rostrum rectum, in apice crassius; inter quas aliæ rostro donantur longissimo: aliæ rostro brevi præditæ sunt. Hujus Ordinis Aves in tres sectiones dividimus: in prima continentur illæ quæ rostrum habent conico - incurvum, ut *Otis*: in secunda eæ quæ rostro donantur recto & longissimo, in apice crassiori, ut *Himantopus*, *Ostralega*: in tertia tandem illæ quæ rostrum habent rectum & breve, in apice crassius, ut *Pluvialis*.

PARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec en cône courbé: & les autres ont le bec droit & renflé vers le bout. De ces derniers les uns ont le bec très-long: & les autres ont le bec court. Les Oiseaux de cet Ordre se divisent en trois sections: dans la première sont ceux qui ont le bec en cône courbé, comme l'*Outarde*: dans la seconde ceux qui ont le bec droit, très-long & renflé vers le bout, comme l'*Echasse*, l'*Huitrier*: & dans la troisième ceux qui ont le bec droit, court & renflé vers le bout, comme le *Pluvier*.

SECTION I.

SECTIO I.

Ceux qui ont le bec en cône courbé.

Eæ quæ rostro donantur conico-incurvo.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de l'*Outarde*.

UNICUM genus, *Otidis* scilicet, hanc sectionem constituit.

LXVI.

LXVI.

Le genre de l'Outarde.

Genus Otidis.

Son caractère est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes ; & point de doigt derrière :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec en cône courbé.

Hujus character est
Digiti tres antichi, membranis destituti; digitus posterior nullus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum conico-incurvum.

** I. L'OUTARDE.

Otis superne nigricante, fulvo & rufescente transversim striata, infernè alba, cum levissima fulvi mixtura; (capite, gutture & collo dilutè cinereis *mas*); rectricibus taniis transversis nigris versùs apicem notatis OTIS.

Otis jugulo utrinque cristato. *Tarda*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 85. sp. 1.*

Otis. *Gesn. Avi. pag. 484.*

Moehr. Avi. Gen. 58.

Otis sive *Tarda*. *Jonst. Avi. pag. 42. hujus duæ icones, una à Gesnero; altera ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.*

Otis seu *Tarda Avis*. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 85. hujus icon non satis accurata pag. 89; & insuper altera icon à Gesnero mutuata pag. 88.*

Otis seu *Tarda Avis Aldrovandi*. *Raj. Syn. Avi. pag. 58. N^o. A. 1.*

- Otis, Tarda Avis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 129. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
- Otis Aristotelis : Recentiorum Tarda vel Bistarda. *Gesn. icon. Avi. pag. 67, in qua hujus icon minus accurata.*
- Otis, Tarda & Bistarda. *Charlet. Exer. pag. 82. N°. VIII.*
Charlet. Onomazt. pag. 73. N°. VIII.
- Otis Græcis ; Tarda Ifidoro ; Bistarda Alberto. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 289.*
- Otis, seu Tarda Ifidori & Aldrovandi ; Bistarda Alberti magni ; Anser Trappa. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 401.*
- Tarda Pyrenaïca, fulva, maculis nigricantibus, marginibus pennarum roseis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. IX. sp. 1.*
- Tarda. *Frisch. hujus icon accurata Tab. 106.*
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 64. sp. 1.
- Tarda simpliciter. *Klein. Avi. pag. 18. N°. 1.*
- Tarda Recentiorum. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 355.*
- Tarda vel Bistarda. *Gesn. Avi. pag. 486, in qua hujus icon minus accurata.*
- Tetrax vel Tarax Nemesiani. *Gesn.*
- Tetraon Longolio. *Schwenck. Charlet. Klein.*
- Erythronaon Olai magni. *Schwenck. Charlet. Klein.*
- Ourarde. *Alb. Tom. III. pag. 16 ; avec des figures mal coloriées, du mâle Pl. 38, & de la femelle Pl. 39.*
Edwards. Tom. II. pag. LXXIII & LXXIV ; avec des figures exactes, du mâle Pl. 73, & de la femelle Pl. 74.
- Otarde. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 101 ; avec une figure exacte Pl. 51.*
- Ostarde. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 235 ; avec une mauvaise figure pag. 236.*
- Ostarde, Houtarde, Bistarde. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 56 a, dans laquelle est la même figure.*
- An hujus speciei junior, Oedicnemo congener ? *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 101. hujus icon non satis accurata pag. 102.*
Charlet. Exer. pag. 83. N°. XI.
Charlet. Onomazt. pag. 74. N°. XI.
- Oedicnemo congener Aldrovandi. *Jonst. Avi. pag. 43.*
- Les Hébreux l'appellent ALHABARI. *Aldrov.*
- Les Grecs, ΟΤΙΣ ; ὄτις ; Bel. *Schwenck. ὄτιςα ; οτιςα. Aldrov. Τίσιςξ ; ὄτιςαξ. Schwenck.*
- Les Italiens, STARDA. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, TRAPP. *Gesn. Aldrov. Rzac. Frisch. TRAPPE. Schwenck. Rzac. ACKER-TRAPP. Gesn. ACKER TRAPPE. Schwenck.*
- Les Flamands, TRAPP-GANSS. *Gesn. Aldrov. TRAPP-GANS. Schwenck.*

Les Illyriens , DROFA. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois , DROP. *Rzac.*

Les Suédois , TRAPP. *Linn.*

Les Anglois , BUSTARD. *Gesn. Willugh. Charlet. Alb. BISTARD. Gesn. Aldrov.*

Les Ecoffois , GUSTARD. *Aldrov.*

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Dindon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces trois lignes de long; sa queue neuf pouces; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, quinze lignes; son pied six pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur un pouce neuf lignes, & l'intérieur un pouce six lignes. Elle a six pieds huit pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un cendré clair. De chaque côté de la mâchoire inférieure partent de longues plumes de la même couleur, dont quelques-unes ont jusqu'à trois pouces de long, & qui forment une espèce de barbe. Le tour des yeux est d'un blanc-rouffâtre. Toute

Crassitie Gallo-pavonem circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes & duos pollices. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & totidem lineas longum est; cauda novem pollices; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes sex pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus unum pollicem cum novem lineis, intimus octodecim lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & octo pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & collum sunt dilutè cinerea. Ex utroque mandibulæ inferioris latere longæ oriuntur pennæ pariter dilutè cineræ, quarum quædam trium pollicum longi-

tudine pollent, quæque quodammodo barbam constituunt. Oculorum ambitus ex albo rufescit. Tota dorsi superficies; pennæ scapulares & superiores alarum tectrices majores & minores corpori finitimæ maculis, tæniisque variegantur nigricantibus, fulvis & rufescentibus, aliis irregularibus, alteris transversis, strictioribus & à se invicem non multùm remotis. Uropygium maculis pariter & tæniis transversis nigricantibus & rufis varium. Superiores caudæ tectrices sunt rufæ, tæniis quibusdam striatæ transversis nigricantibus, inter quas minutæ quædam disseminantur maculæ similiter nigricantes. Pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferioresque caudæ tectrices albescent & aliquid fulvi admixtum habent. Pennæ alas subtus obtegentes sunt penitus candidæ. Tectrices alarum superiores majores & minores à corpore remotiores cinereo-albæ. Ala notha eodem imbuitur colore; hujus tamen extrema penna in latere exteriori & apice fusca est, & rufescente terminatur. Universum corpus sub pennis lanugine rosæâ obducitur.

la surface du dos, les plumes scapulaires, ainsi que les grandes & les petites couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps, sont variées de noirâtre, de fauve & de rouffâtre par taches & bandes, les unes irrégulières, les autres transversales, assez étroites & proches les unes des autres. Le croupion est varié de même de noirâtre & de roux par taches & bandes transversales. Les couvertures du dessus de la queue sont rouffes, & rayées de quelques bandes transversales noirâtres, entre lesquelles sont parsemées quelques petites taches de la même couleur. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de fauve. Les couvertures du dessous des ailes sont tout-à-fait blanches. Les grandes & les petites du dessus les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. L'aile bâtarde est de la même couleur, excepté le côté extérieur & le bout de la plume la plus extérieure, qui sont bruns, le bout étant terminé de rouffâtre. Le duvet sous toutes les plumes du corps est de couleur de rose. L'aile en composée de vingt-six plumes: les neuf premières sont

noirâtres : les sept suivantes , ſçavoir depuis la dixième juſqu'à la ſeizième incluſivement , ſont blanches depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur , le reſte étant noirâtre : la dix-ſeptième & la dix-huitième ſont blanches dans toute leur longueur , & tachetées de noirâtre & de rouſſâtre depuis environ les deux tiers de leur longueur juſqu'à leur extrémité : les trois ſuivantes , ſçavoir depuis la dix-neuvième juſqu'à la vingt-unième incluſivement , ſont blanches à leur origine , mais dans le reſte de leur longueur leur côté extérieur eſt roux & rayé de bandes tranſverſales & en zigzags noirâtres , & leur côté intérieur eſt d'un blanc tacheté de brun : enfin les cinq plus proches du corps ſont rayées tranſverſalement de roux & de noirâtre. Dans quatre des plumes de l'aîle , ſçavoir la troiſième , la quatrième , la cinquième & la ſixième , les barbes extérieures deviennent ſubitement beaucoup plus courtes que les autres , & cela vers l'endroit où finiſſent leurs couvertures. La queue eſt compoſée de vingt plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-blanc à leur origine ; le reſte de leur longueur eſt roux & marqué vers le bout de deux ban-

Viginti ſex remigibus ala conflatur : novem primores nigricant : ſeptem quæ ſequuntur , à decima ſcilicet ad decimam ſextam uſque incluſivè , ab ipſarum exortu ad duas ciciter tertias longitudinis partes uſque candidæ , in reliqua longitudine nigricantes : decima ſeptima & decima octava per totam longitudinem albæ , nigricante & ruſcente à duabus circiter tertiis longitudinis partibus ad apicem uſque maculatæ : tres proximè ſequentes , à decima nona ſcilicet ad vigefimam primam uſque incluſivè , in exortu candidæ , per reliquam autem longitudinem in latere exteriore ruſæ , tæniis tranſverſis & undatis nigricantibus ſtriatæ , in interiore candidæ , fuſcis maculis variæ : quinque tandem corpori finitimæ rufo & nigricante tranſverſim ſtriatæ. Quatuor remigum , tertiæ ſcilicet , quartæ , quintæ & ſextæ , pinnulæ exteriores ſiunt ſubitò cæteris multò breviores eum verſus locum , in quo ipſarum tectrices deſiunt. Caudam componunt viginti rectrices , quarum binæ intermediæ ſunt in exortu cinereo-albæ , in reliqua longitudine ruſæ , verſus api-

cem duabus insignitæ tæniis transversis nigris, inter quas, sicut & supra & infra illas, minutæ disseminantur maculæ similiter nigræ: utrinque proximè sequens in exortu candida, dein rufa, duabus insignita tæniis transversis nigris, quarum una rufum colorem distinguit, altera infra eundem colorem collocatur; binas inter tænias istas nigras quædam disseminantur maculæ concolores; & tandem rectrix albo ad fulvum dilutum inclinante terminatur: tres utrinque sequentes, tertia scilicet, quarta & quinta, sunt in exortu candidæ, dein rufo imbutæ colore, quem colorem sequitur tænia transversa nigra, supra quam tæniam quædam extant maculæ concolores in rufo colore positæ; unaquæque tandem rectrix albo ad fulvum dilutum vergente terminatur: utrinque sexta & septima sunt in exortu candidæ, dein albo-fulvæ, binis tæniis transversis nigricantibus notatæ: tres utrinque extimæ in exortu albæ, dein ex albo ad fulvum dilutissimum inclinantes, & tæniâ transversâ nigricante insignitæ. Oculorum irides eleganter aurantiæ. Rostrum griseo-

des transversales noires, entre lesquelles, ainsi qu'au-dessus & au-dessous desquelles, sont semées çà & là de petites taches de la même couleur: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est blanche à son origine, ensuite rousse & marquée de deux bandes transversales noires, l'une placée sur le roux & l'autre au-dessous de cette couleur; entre ces deux bandes noires sont semées quelques taches de la même couleur; & enfin la plume est terminée d'un blanc tirant sur le fauve clair: les trois suivantes de chaque côté, sçavoir la troisième, la quatrième & la cinquième, sont blanches à leur origine, ensuite rousses, cette couleur étant suivie d'une bande transversale noire, au-dessus de laquelle sont quelques taches de la même couleur placées sur le roux; après quoi chaque plume est terminée d'un blanc tirant sur le fauve clair: la sixième & la septième de chaque côté sont blanches à leur origine, ensuite d'un blanc-fauve, sur lequel sont deux bandes transversales noirâtres: les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches à leur origine, ensuite d'un blanc tirant sur le fauve très-clair, & marqué d'une bande transversale noirâtre. L'i-

ris des yeux est d'un bel orangé. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont cendrés; & les ongles, qui sont convexes en - dessous comme en - dessus, sont gris.

La femelle diffère du mâle par sa grandeur, qui est beaucoup moindre. Elle en diffère encore en ce qu'elle n'a point aux côtés de la mâchoire inférieure ces longues plumes qui forment une barbe au mâle. De plus sa gorge & les côtés de sa tête sont bruns. Les parties supérieures de la tête & du col sont de la même couleur que le dos, lequel n'est pas de couleurs si vives que dans le mâle. La partie inférieure du col est cendrée. Le bord de l'aîle est noir. Du reste elle ressemble parfaitement au mâle.

Elles se nourrissent d'herbes & de graines. On les trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinerei; ungues verò, qui quidem sicut superne ita & infernè convexi, sunt grisei.

Fœmina à mare discrepat magnitudine, quâ ei multo cedit. Ab illo præterea differt in eo quod in utroque maxillæ inferioris latere longis istis careat pennis barbam in mare constituentibus. Guttur insuper & caput ad latera fusca sunt. Partes capitis & colli superiores dorso concolores; dorsum autem coloribus imbuatur non ita quàm in mare vividis. Collum inferius cinereum. Margines alarum nigrae. In reliquis cum mare perfectè convenit.

Herbis & seminibus victitant. Habitat in campestribus locis. *Ex museo Reaumuriano.*

** 2. LA PETITE OUTARDE, APPELLÉE VULGAIREMENT
CANNE-PETIERE.

Voyez Pl. II. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.

Otis superne nigro, fulvo, rufescente & albo eleganter variegata, infernè alba, (ad latera nigro transversim striata; pectore albo-rufescente, taniis nigricantibus vario *fœmina*); (collo nigro, torque albo cincto *mas*); rectricibus taniis transversis

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII* 25
 transversis nigricantibus notatis OTIS MINOR, ANAS
 CAMPESTRIS VULGO DICTA.

Otis capite juguloque lævi. Tetrax. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 85.*
sp. 3.

Tarda nana. Klein. *Avi. pag. 18. N° 2.*

Anas campestris. Jonst. *Avi. pag. 43.*

Charlet. *Exer. pag. 83. N° IX.*

Charlet. *Onomazt. pag. 74. N° IX.*

Anas campestris, Canne petiere Gallorum, feu Tetrax Bellonii. Aldrov.
Avi. Tom. II. pag. 96.

Anas campestris, Canne petiere Gallorum, feu Tetrax Bellonii, Aldrovandi. Willugh. *Ornith. pag. 129.*

Raj. *Syn. Avi. pag. 59. N° 2.*

Orygometra melina, maculis fuscis. Barr. *Ornith. Class. III. Gen. XXXV. sp. 3.*

Stella. Charlet. *Exer. pag. 83. N° X. (fœmina).*

Charlet. *Onomazt. pag. 74. N° X. (fœmina).*

Stella Avis. Jonst. *Avi. pag. 43. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI. (fœmina).*

Stella Avis dicta. Aldrov. *Avi. Tom. II. pag. 98. hujus icon minùs accurata pag. 97. (fœmina).*

Stella Avis Aldrovandi. Willugh. *Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII. (fœmina).*

Canne petiere. Gesn. *Avi. pag. 795.*

Bel. *Hist. nat. des Ois. pag. 237 ; avec une mauvaise figure de la femelle pag. 238.*

Canne petiere, nommée par aucuns, Olive. Bel. *Portr. d'Ois. pag. 56 b, dans laquelle est la même figure.*

Canard de pré de France. Alb. *Tom. III. pag. 17 ; avec une figure mauvaise & mal coloriée de la femelle Pl. 41.*

Petite Outarde. Edwards. *Glanur. pag. 89. Chap. XLI ; avec une figure exacte de la femelle Pl. 251.*

Les Italiens l'appellent FASANELLA. Bel.

Les Anglois FRENCH FIELD DUCK. Alb. LITTLE BUSTARD. Edwards.

Les Barbares, RHAAD, ou SAF-SAF. Edwards.

Cum *Phasiano* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices explet, & ad extremos ungues unum

Tom. V.

Elle est à peu près de la grosseur du *Faisan*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces.

D

Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, onze lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur onze lignes. Elle a deux pieds huit pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes noires, marquées chacune d'une ligne roussâtre qui s'étend selon la longueur de sa tige. Les côtés de la tête & la gorge sont d'un roussâtre très-clair, varié de petites taches longitudinales noirâtres. Le col est noir; cependant au-dessous de la gorge est un collier blanc, qui remonte des deux côtés, en se rétrécissant, jusque vers le derrière de la tête. Au-dessous de ce collier le noir est parsemé de quelques taches roussâtres: ensuite est une bande transversale blanche, au-dessous de laquelle, vers la poitrine, est une autre bande transversale noire. Le dos & le croupion sont jolii-

pedem & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata undecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum octo pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partem capitis superiorem vestiunt pennæ nigræ, lineâ rufescente, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Caput ad latera, & guttur dilutissimè rufescunt, minutisque variegantur maculis longitudinalibus nigricantibus. Collum nigrum est; at tamen infra guttur extat torquis albus, utrinque versus partem capitis posteriorem assurgens, quique, sic procedendo, fit strictior. Infra torquem istum maculis quibusdam rufescentibus aspergitur color niger: deinde sequitur tania transversa can-

didā, quam iterum sequitur altera tania transversa nigra, versus pectus posita. Dorsum & uropygium nigro, fulvo, rufescente & pauco albo eleganter variegantur, coloribus istis per minutissimas tancias undatas dispositis, majusculisque maculis nigris iterum variegatis. Pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur; majores tamen caudæ tectrices superiores sunt penitus candidæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices albescent. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt similiter albæ, sed nigro transversim striatæ. Univerſum corpus sub pennis lanugine roseâ obducitur. Superiores alarum tectrices minimas & medias variegant iisdem coloribus ac isti quibus dorsum ipsum variegatur; in illis tamen color niger majusculas maculas non efformat: tectrices majores à corpore remotiores sunt nigricantes, albo terminatæ; reliquæ majores tectrices, sicut & minimæ alæ articulum carpo humano respondentem cooperientes, candidæ; majores tamen cor-

ment variés de noir, de fauve, de rouffâtre & d'un peu de blanc, & cela par très-petites bandes en zigzags, le tout mêlé d'assez grandes taches noires. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs; cependant les plus grandes couvertures du dessus de la queue sont tout-à-fait blanches. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, & rayées transversalement de noir. Le duvet sous toutes les plumes du corps est de couleur de rose. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont variées des mêmes couleurs que le dos, excepté que le noir n'y est pas répandu par grandes taches: les grandes couvertures les plus éloignées du corps sont noirâtres & terminées de blanc; les autres grandes couvertures, ainsi que les plus petites qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont blanches; cependant des grandes les plus proches du corps sont variées d'un peu de brun le long de leur tige. Le bord de l'aîle au-dessous du pli qui ré-

pond à celui du poignet , est blanc. L'aîle bâtarde est de la même couleur. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les quatre premières sont blanches à leur origine , & noirâtres dans le reste de leur longueur : les six suivantes , sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la dixième inclusivement , sont blanches , & marquées vers leur extrémité d'une large bande transversale noirâtre : les dix qui suivent ces dernières , sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusivement , sont tout-à-fait blanches : la vingt-unième est de la même couleur , mais elle est variée dans son milieu de bandes transversales & en zigzags fauves & noirâtres : enfin les six plus proches du corps sont variées des mêmes couleurs que les plumes scapulaires , mais distribuées par plus larges bandes. Ces dernières plumes , lorsque l'aîle est pliée , vont aussi loin que les plus grandes , & s'étendent , comme elles , un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de dix-huit plumes , dont les quatre du milieu sont fauves , & marquées de larges bandes transversales noirâtres , entre lesquelles sont d'autres petites bandes de la même couleur , qui suivent dif-

pori finitimæ paululùm fusci secundùm ipsarum scapi longitudinem admixtum habent. Alarum margines , infra articulum carpo humano respondentem , albæ. Ala nottha eodem colore imbuta. Alam componunt viginti septem remiges : quatuor primores sunt in exortu candidæ , in reliqua longitudine nigricantes : sex quæ sequuntur , à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè , albæ , latâ taniâ transversâ nigricante versùs ipsarum extremitates insignitæ : decem istis ultimis proximæ , ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè , penitùs candidæ : vigesima prima eodem candore nitens , tæniis tamen transversis & undatis fulvis & nigricantibus in ipsius medio variegata : sex tandem corpori viciniores iisdem coloribus ac scapulares pennæ variegantur , qui tamen colores tænias latiores efformant. Novissimè dictæ rectrices , dum ala complicatur , majorum rectricum extremitates attingunt , & illarum instar , nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Octodecim rectricibus cauda conflatur ;

quatuor intermediae fulvae, latis notatae taniis transversis nigricantibus, quas inter aliae extant exiguae taniae concolores, secundum varias directiones positae: reliquae omnes rectrices candidae, exiguis similiter notatae taniis nigricantibus, secundum varias directiones quoque positae, & latè insuper taniam transversam eodem colore imbutam, versus ipsarum extremitatem sitam, insignitam. Rectrix quatuor intermediis utrinque proxima aliquid quoque fulvi admixtum habet. Rostrum griseo-fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei.

Fœmina coloribus paululum à *mare* differt. Partem capitis superiorem obtegent pennae nigrae & rufescentes longitudinaliter variae. Collum rufescens, quolibet tamen penna in medio secundum scapi longitudinem fusca. Guttur ex albo rufescit. Dorsum, uropygium & scapulares pennae iisdem coloribus ac in *mare* variegantur, sed colores isti majores maculas efficiunt. Pectus est albo-rufescens, taniis nigricantibus, aliis longitudinalibus, alteris trans-

ferentes directiones: toutes les autres plumes sont blanches, marquées de même de petites bandes noirâtres, qui suivent différentes directions, & de plus d'une large bande transversale de la même couleur, placée vers l'extrémité de chacune de ces plumes. La plume qui de chaque côté est la plus proche des quatre du milieu, est aussi mêlée d'un peu de fauve. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris.

La *femelle* diffère un peu du *mâle* par ses couleurs. La partie supérieure de sa tête est couverte de plumes variées longitudinalement de noir & de roussâtre. Le col est de cette dernière couleur, chaque plume étant brune dans son milieu tout le long de sa tige. La gorge est d'un blanc-roussâtre. Le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, sont variées des mêmes couleurs que dans le *mâle*, mais par plus grandes taches. La poitrine est d'un blanc-roussâtre, varié de bandes noirâtres, les unes lon-

gitudinales, les autres transversales. Le ventre & le haut des jambes, ainsi que les couvertures du dessous des ailes, sont blancs. Les côtés, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc rayé transversalement de noirâtre. Les plumes de l'aile & ses couvertures supérieures, qui sont blanches dans le mâle, sont dans la femelle d'un blanc rayé transversalement de noirâtre. Du reste elle ressemble au mâle.

Elles se nourrissent d'herbes & de graines. On les trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

versis, varium. Venter, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices albescent. Latera, tectricesque caudæ superiores & inferiores similiter candidæ, nigricante transversim striatæ. Alarum remiges, sicut & ipsarum superiores tectrices, quæ in mare albescent, in femina albescent quidem, sed nigricante transversim striantur. In reliquis cum mare convenit.

Herbis & feminibus victitant. Habitat in campatribus locis. *Ex museo Reaumuriano.*

3. L'OUTARDE D'ARABIE.

Otis cristata, superne rufescens, nigricante transversim striata, infernè alba; cristâ & tæniâ supra oculos nigris; gutture & collo inferiore cinereis, fusco transversim striatis; rectricibus tæniis transversis nigris versùs apicem notatis....
OTIS ARABICA,

Otis auribus erecto-cristatis. Tarda Arabs. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 85. sp. 2.*

Tarda Mechaensis Arabica. *Klein. Avi. pag. 18. N° 3.*

Outarde d'Arabie. *Edwards. Tom. I. pag. XII; avec une figure très-exacte Pl. 12.*

On l'appelle à Mocha, dans l'Arabie heureuse, LOHONG. *Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la nôtre; mais elle a les jambes & le bec plus longs, & le col plus délié. Son bec de-

Otidem nostratem crassitie circiter æmulatur; sed cruribus & rostro longioribus, colloque graciliori donatur,

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est. Capitis anterior pars albicat. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis nigra, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & longiusculas pertingens pennas similiter nigras, elegantem cristam efficientes. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ teatrices sunt rufescentes, nigricante transversim striatæ. Guttur & collum superius cinerea, lineolis transversis fuscis striata. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ albæ. Quæ caudam subtus obtegunt, teatrixque alarum inferiores eodem albore nitent. Superiores minores & majores corpori finitimæ sunt dorso concolores, quælibet tamen teatrix maculâ albâ lunulatâ terminatur: minores à corpore remotiores, sicut & alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, albæ, quibusdam minutis maculis nigris respersis: majores tandem à corpore remotiores, sicut & alæ nothæ pennæ,

puis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long. La partie antérieure de la tête est blanche. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus les yeux, & va joindre de longues plumes de la même couleur, qui forment une jolie hupe. Le derrière de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouffâtre rayé transversalement de noirâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un cendré rayé de petites lignes transversales brunes. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les petites & les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont de la même couleur que le dos, & terminées chacune par une tache blanche en forme de croissant: les petites les plus éloignées du corps, ainsi que le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont blanches, quelques-unes étant parsemées de petites taches noires: enfin les grandes les plus éloig-

nées du corps & les plumes de l'aile bâtarde sont noires, & terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les suivantes sont variées de noir & de blanc par petites taches : & les plus proches du corps sont d'un rouffâtre rayé transversalement de noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue sont de la même couleur que ces dernières plumes de l'aile : les latérales sont blanches & un peu variées des mêmes couleurs que celles des deux du milieu ; elles sont de plus marquées chacune vers leur bout d'une large bande transversale noire. L'iris des yeux est d'un brun obscur. Le bec est de couleur de corne claire, qui s'obscurcit un peu vers le bout du bec. Les narines sont oblongues, & placées vers l'origine du demi-bec supérieur. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun clair. On la trouve aux environs de *Mocha* dans l'*Arabie heureuse*.

nigræ, albo terminatæ. Remiges alarum majores nigræ : sequentes albo & nigro variæ, albore & nigredine exiguas maculas efformantibus : corpori viciniore rufescentes, nigricante transversim striatæ. Binæ rectrices intermedia novissimè descriptis remigibus concolores : laterales candidæ, iidem coloribus ac binæ intermedia tinguntur, paululum variegatæ, latâ insuper taniâ transversâ nigrâ versum ipsarum extremitatem notatæ. Oculorum irides obscure fuscæ. Rostrum dilutè corneo tinctum colore, versum rostri apicem nonnihil obscuriore. Nares oblongæ, & versum mandibulæ superioris exortum collocatæ. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque dilutè fusci. Habitat circa *Mocham* in *Arabia felice*.






Fig. 2.

2. Petite Outarde ou Canne-petiere, femelle.




Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces.

Desiné et Gravé par Martinet.

1. Petite Outarde ou Canne-petière, mâle. 2. Petite Outarde ou Canne-petière, femelle.



SECTIO II.

SECTION II.

Eæ quæ rostro donantur recto, longissimo, in apice crassiori.

Ceux qui ont le bec droit, très-long & renflé vers le bout.

DUO in illa sectione continentur genera Avium, rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur cylindraceo, ut *Himantopus*: aliæ verò rostro lateraliter plano præditæ sunt, ut *Ostralega*.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec cylindrique, comme l'*Echasse*: & les autres ont le bec applati par les côtés, comme l'*Huitrier*.

LXVII.

LXVII.

Genus Himantopi.

Le genre de l'Echasse. (1)

Hujus character est
 Digiti tres antici, membran-
 nis destituti; digitus pos-
 ticus nullus:

Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:

Rostrum rectum, longissi-
 mum, cylindraceum, in
 apice crassius.

Son caractère est d'avoir
 Trois doigts devant, dénués
 de membranes; & point de
 doigt derriere:

La partie inférieure des jam-
 bes dénuée de plumes:

Le bec droit, très-long, cy-
 lindrique & renflé vers le
 bout.

(1) *Echasse*, nom que j'ai donné aux
 espèces de ce genre à cause de la longueur
 de leurs jambes.

* * I. L'ÉCHASSE.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

*Himantopus candidus; dorso supremo & alis nigro-viridanti-
 bus; occipitio nigro; rectricibus decem intermediis ci-
 Tom. V. E*

nereo-albis, utrinque extimâ ferè penitùs candidâ . . .
HIMANTOPUS.

Himantopus castaneus, rostro nigro, tibiis pedibusque sanguineis.
Barr. Ornith. Class. IV. Gen. II. sp. 2.

Himantopus. *Jonst. Avi. pag. 109. maris & feminae icones ab Aldrovando mutuatae Tab. 52, sub titulo, Hæmantopus.*

Charlet. Exer. pag. 112. N° 3.

Charlet. Onomazt. pag. 107. N° 3.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 316. N° 6. hujus icon minimè accurata Tab. 267.

Himantopus Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 443. icones non satis accurate, maris pag. 445, & feminae pag. 446.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18. hujus duæ icones minùs accurate, una Tab. II. fig. 1, & altera Tab. 13. fig. 2.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 46. hujus icon non satis accurata Tab. 21. Klein. Avi. pag. 22.

Himantopus Plinii, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 219. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 106. N° 9.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. N° 7.

Himantopus Maderaspatanus, è nigro albente, cruribus rubris. *Raj. Syn. Avi. pag. 193. N° 1. hujus icon non satis accurata Tab. 1. fig. 3.*

Hæmatopus. *Gesn. Avi. pag. 547, in qua hujus icon non satis accurata. Gesn. icon. Avi. pag. 137, in qua eadem icon.*

Charadrius supra niger, subtrus albus, rostro nigro, capite longiore, pedibus rubris longissimis. Himantopus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 10.*

Grand Chevalier d'Italie. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 53 a, dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Les Grecs l'appellent Ιμάντιον. Bel.

Les Italiens, MERLO AQUAIOLO GRANDE. Bel.

Les Allemands, FROEMBDER VOGEL. Gesn.

Les Flamands, MATHOEN. Klein.

Les Anglois, LONGLEGS. Sloane. Raj.

Les Anglois de la Jamaïque, RED LEGGED CRANE. Raj.

Il n'est pas si gros qu'un *Biset*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des on-

Columbæ Liviæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad ex-

remos unguis unum pedem sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices & quinque lineas; pes quatuor pollices & sex lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus quindecim cum semi lineas, intimus quatuordecim lineas. Extimus digitus cum medio membranulâ, ad primum usque articulum protensâ; connectitur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum & quatuor linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput posterius nigrum est: nigredo autem, quæ per occipitium ducta, ab oculo ad oculum extenditur. Capitis anterior pars, guttur, collum, dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, tectrices caudæ inferiores & minores superiores candore nitent. Majo-

gles d'un pied six pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces cinq lignes; son pied quatre pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur quinze lignes & demie, & l'intérieur quatorze lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane; qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux pouces quatre lignes au-delà du bout de la queue. La partie postérieure de la tête est noire: cette couleur s'étend depuis un œil jusqu'à l'autre, en passant par l'occiput. La partie antérieure de la tête, la gorge, le col, la partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessus sont d'un beau blanc. Les grandes couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, & les

couvertures du dessus & du dessous des ailes sont d'un noir qui a un certain lustre de verd. Les plumes de l'aîle sont noires, ayant aussi un lustre de verd, mais seulement en-dessus du côté extérieur. Les moyennes plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes d'un gris-blanc; la plus extérieure de chaque côté est cependant presque tout-à-fait blanche. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

res caudæ tectrices superiores sunt cinereo-albæ. Dorsæ suprema pars, pennæ scapulares, alarumque tectrices superiores & inferiores nigrae, quodam virore resurgentes. Remiges sunt nigrae; cum quodam virore admixto, sed tantum superne in latere exteriori. Minores remiges corpori finitimæ longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad caudam extremam pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-albæ; utrinque tamen extrema ferè penitus candida. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis nudata, pedesque rubri; ungues verò nigricantes. Maris littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

2. L'ÉCHASSE DU MEXIQUE.

Himantopus candidus; alis albo & nigro variis; capite superiore nigro; rectricibus candidis HIMANTOPUS MEXICANUS.

Comaltecatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 19. Cap. XXII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 177.

Les Mexiquains l'appellent COMALTECATL. Fern.

Il est plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces,

Crassitie præcedentem antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices æ

quat, & ad extremos unguis unum pedem novem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices & sex lineas; pes quatuor pollices & septem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas: laterales paulò sunt breviores. Capitis pars superior est nigra. Reliquum caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ candidæ. Tectrices caudæ superiores & inferiores concolores. Alæ superne & inferne albo & nigro variegantur. Cauda duodecim constat rectricibus candidis. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes rubescentes; unguis verò nigricantes. Hyeme habitat in *Mexico*.

& jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, a aussi trois pouces six lignes; son pied quatre pouces sept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes: les latéraux sont un peu plus courts. La partie supérieure de la tête est noire. Le reste de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont blancs. Les ailes sont en-dessus & en-dessous variées de blanc & de noir. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rougeâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve pendant l'hiver au *Mexique*.

*Le Genre de l'Huitrier.**Genus Ostralegæ.*

Son caractère est d'avoir
Trois doigts devant , dénués
de membranes ; & point de
doigt derrière :

La partie inférieure des jambes
dénuée de plumes :

Le bec droit , très-long , ap-
plati par les côtés , & renflé
vers le bout.

Hujus character est
Digiti tres antici , membra-
nis destituti ; digitus pos-
ticus nullus :

Crura in parte inferiore plu-
mis denudata :

Rostrum rectum , longissi-
mum , lateraliter planum ,
in apice crassius.

** 1. L'HUITRIER, APPELLÉ VULGAIREMENT
PIE DE MER.

Voyez Pl. III. Fig. 2.

Ostralega superne nigra , infernè & in uropygio alba ; capite
& collo nigris ; minutâ maculâ infra oculos candidâ ; rec-
trixibus in exortu albis , apice nigris OSTRALEGA,
PICA MARINA VULGO DICTA.

Ostralega. Klein. *Avi.* pag. 23.

Hæmatopus. Ostralegus. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 81. sp. 1.*

Hæmatopus. Gesn. *Avi.* pag. 546.

Bell. Obs. pag. 18.

Charlet. Exer. pag. III. N^o. XI.

Charlet. Onomazt. pag. 105. N^o. XI.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Faun. Suec. Linn. N^o. 161.

Moehr. Avi. Gen. 89.

Hæmatopus Bellonii. Aldrov. *Avi. Tom. III. pag. 447 , in qua hujus
icon à Bellonio mutuata.*

Jonst. Avi. pag. 106.

Raj. Syn. Avi. pag. 105. N^o. A. 7.

Hæmatopus Bellonii ; Pica marina Gallorum & Anglorum. *Willugh,
Ornith. pag. 220. hujus icon pessima Tab. LV.*

- Himantopus corpore gracili & adducto, rostro pedibusque rubentibus.
Barr. Ornith. Class. IV. Gen. II. sp. 3.
- Pica marina. *Charlet. Exer. pag. 76. N^o. 4.*
Charlet. Onomast. pag. 68. N^o. 4.
Charlet. Exer. pag. 114. N^o. XVII.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 57. sp. 1.
- Preneur d'Huitres. *Catesb. Tom. I. pag. 85; avec une figure assez exacte*
Pl. 85.
- Pie de mer. *Alb. Tom. I. pag. 68; avec une figure mauvaise & mal coloriée*
Pl. 78.
- Pie, ou Beccasse de mer. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 203, dans laquelle*
il y a une mauvaise figure.
- Pie de mer, Beccasse de mer. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 46 a, dans laquelle*
est la même figure.
- Oiseau appelé Hæmatopus marinus. *Feuillée. Journ. des Obs. phys.*
pag. 289. (ed. 1725).
Les Grecs l'appellent Αἷματοπούς, Bel.
Les Gothlandois, MARSPITT. Linn.
Les Oëlandois, STRÅNDEKJURA. Linn.
Les Anglois, SEA-PIE. Willugh. Raj. Charlet. Alb. RED-SHANK. Charlet.
OYSTER CATCHER. Catesb.

Crassitie *Cornicem* adæquat, superatve. Ipsi^{us} longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sexdecim pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & novem lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sesquilineam longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas, extimus quindecim lineas,

Il est pour le moins aussi gros qu'une *Cornéille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne & demie de long; sa queue quatre pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'extérieur quinze lignes, & l'intérieur treize lignes. Le doigt extérieur

est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & même un peu au-delà. Il a deux pieds sept pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un beau noir; il y a cependant quelques plumes blanches mêlées à la partie supérieure du dos & parmi les scapulaires. Au-dessous de chaque œil est une petite tache blanche. Il y a au-dessous de la gorge une bande transversale variée de blanc & de noir, qui s'étend de chaque côté du col sans en faire le tour, & forme une espèce de collier. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des ailes sont noires: les moyennes sont de la même couleur, & terminées de blanc: les grandes les plus proches du corps sont tout-à-fait blanches, si l'on en excepte le côté extérieur qui est noirâtre vers l'origine de la plume

intimus tredecim lineas. Extremus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum; & etiam nonnihil ultrâ, productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum septem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, guttur, collum, pars dorsi suprema & scapulares pennæ nigri sunt coloris; quædam tamen pennæ candidæ in dorso supremo & inter scapulares immiscentur. Infra utrumque oculum minuta adest macula candida. Infra guttur tænia extat transversa albo & nigro variegata, in utroque colli latere protensa, collum tamen non penitus ambiens, & torquem quodammodo efficiens. Dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices minimæ sunt nigræ: mediæ concolores, albo terminatæ: majores corpori finitimæ penitus candidæ, excepto tamen latere

latere exteriori, in quo versus ipsarum exortum tantum nigricant : majores tandem à corpore remotiores penitus nigrae. Remiges majores nigricantes ; omnes autem (primâ exceptâ , pauco albo notatâ) sunt in latere interiore maximâ parte candidæ , fusco marginatæ ; omnes quoque longâ notantur maculâ albâ , super scapum versus ipsarum extremitatem posita : quæ macula eò magis in latere exteriori protenditur , quò remix fit corpori vicinior : minorum remigum primores albæ , nigricante terminatæ , qui color nigricans eò minus spatium occupat , quò remix fit corpori finitima : sequentes candidæ , sed ex istis quædam , illæ scilicet quæ corpori magis appropinquant , maculâ insigniuntur nigricante , in latere exteriori versus ipsarum extremitatem positâ : corpori tandem viciniore nigrae sunt & immaculatæ. Ultimæ istæ majorum remigum longitudinem ferè adæquant , & dum ala complicatur , non nihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus albis , nigro terminatis ; color autem niger in illis eò minus spatium oc-

seulement : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait noires. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres , & toutes (excepté la première , qui n'a que fort peu de blanc) ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche & bordée de brun ; toutes ont aussi une longue tache blanche , placée sur leur tige vers leur extrémité : cette tache s'étend d'autant plus sur le côté extérieur , que la plume est plus proche du corps : les premières des moyennes sont blanches & terminées de noirâtre , cette dernière couleur occupant d'autant moins d'espace , que la plume est plus proche du corps : les suivantes sont blanches , quelques - unes de celles - là , sçavoir celles qui sont les plus près du corps , étant marquées d'une tache noirâtre , placée sur leur côté intérieur vers leur extrémité : enfin les plus proches du corps sont noires & sans taches. Ces dernières sont presque aussi longues que les plus grandes plumes de l'aîle , & s'étendent , lorsque l'aîle est pliée ; un peu au - delà de la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches & terminées de noir ; cette dernière couleur occupe d'autant

moins d'espace, que la plume est plus extérieure; car elle couvre la moitié de la longueur des deux du milieu, au lieu qu'elle n'occupe que le quart de la longueur de la plus extérieure de chaque côté. L'iris des yeux est jaune : les paupieres sont rouges. Le bec est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont d'un rouge de sang; & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer, où il mange beaucoup d'*Huitres*; ce qui lui a fait donner le nom d'*Huitrier*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

cupat, quò rectrix exterior fit; duarum enim intermediarum mediam longitudinem obtegit, dum utrinque extimæ quartam tantum longitudinis partem occupat. Oculorum irides luteæ : palpebræ rubræ. Rostrum pariter rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque sanguinei coloris; ungues verò nigricantes. Maris littora frequentat, ibique maximam *Ostrearum* copiam devorat; unde *Ostralegæ* nomen. *Ex museo Realmuriano.*

SECTION III.

Ceux qui ont le bec droit, court & renflé vers le bout.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui du *Pluvier*.

LXIX.

Le genre du Pluvier.

Son caractère est d'avoir Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

SECTIO III.

Eæ quæ rostro donantur recto, brevi, in apice crassiori.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Pluvialis*.

LXIX.

Genus Pluvialis.


Hujus character est Digiti tres antichi, membranis destituti; digitus posterior nullus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :



Fig. 1.

2. Huitrier.





1. Echasse.

2. Huitrier.

Desmés et Gravé par Martinet.



Rostrum rectum, breve, in Le bec droit, court, & renflé
apice crassius. vers le bout.

** I. LE PLUVIER DORÉ.

Voyez Pl. IV. Fig. 1.

Pluvialis superne nigricans ; maculis flavescens varia , in-
fernè alba ; collo inferiore & pectore griseis , maculis flaves-
centibus variegatis ; rectricibus nigricantibus , albo-flavi-
cante transversim striatis PLUVIALIS AUREA.

Pluvialis cinereus , luteis & albis maculis. *Barr. Ornith. Class. IV.*
Gen VII. sp. 1.

Pluvialis. *Gesn. Avi. pag. 714. hujus icon non satis accurata pag. 715.*

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 528. maris icon non satis accurata pag. 531.

Pluvialis viridis. *Willugh. Ornith. pag. 229. hujus icon minus accurata*
Tab. LVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 111. N^o. A. 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. N^o. 9.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 318. N^o. X. hujus icon pessima Tab. 269
fig. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 2.

Pluvialis viridis , seu Pardalis. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 54. hujus*
icon minimè accurata Tab. 25.

Pluvialis viridis Gesneri ; Pardalus tertius Schwenckfeldii ; Vivago Bo-
dini ; Gallina novalis media. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 415.*

Pluvialis flavescens. *Jonst. Avi. pag. 113.*

Pluvialis flavo-virefcens. *Charlet. Exer. pag. 113. N^o. 2.*

Charlet. Onomazt. pag. 109. N^o. 2.

Pardalus tertius. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 317.*

Gavia viridis. *Klein. Avi. pag. 19. N^o. 2.*

Charadrius nigro lutescenteque variegato , pectore concolore. *Faun.*
Suec. Linn. N^o. 157.

Charadrius pedibus cinereis , corpore nigro viridique maculato , sub-
tus albido. Pluvialis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 8.*

Charadrius. *Moehr. Avi. Gen. 90.*

Gorriones o Pardales de Oviedo. *Raj. Sloane.*

Pluvier verd. *Bel. Hist. nat. des Oisf. pag. 260.*

Pluvier verd. *Alb. Tom. I. pag. 66 ; avec une figure mal coloriée Pl. 75.*

Les Catalans l'appellent DORADA. Barr.

Les Italiens , PIVIERO. Marfil.

Les Boulonnois, PIVIER. *Aldrov. Jonst.*

Les Allemands, PULVIER. *Gesn. Aldrov.* PULVER ; PULROSZ. *Gesn. Aldrov. Jonst.* SEE TAUBE ; GROSSER BRACH - VOGEL. *Schwenck.*

GREUNER KEUWIT. *Rzac.*

Les Silésiens, BRACH-VOGEL. *Schwenck.*

Les Polonois, PTAK DESSZOWY. *Rzac.*

Les Suédois, AOKERHOENS. *Linn.*

Les Dalécarliens, AOKERHOENA, ou AOKERHOENS. *Linn.*

Les Lapons, HUTTI. *Linn.*

Les Anglois, GREEN PLOVER. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* WHISTLING PLOVER. *Charlet.*

Les Anglois de la Jamaïque, GREY PLOVER. *Sloane.*

Il est de la grosseur d'une Tourterelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long ; sa queue trois pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, sept lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur dix lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes & demie. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied six pouces huit lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le

Cum *Turture* crassitie convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos unguis decem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est ; cauda tres pollices ; pars crurum plumis denudata septem lineas ; pes unum pollicem cum sex lineis ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas, extimus decem cum semi lineas, intimus novem cum semi lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis sex pollicum & octo linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam ex-

tremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium pen- nis vestiuntur nigricantibus, maculis flavescantibus ad margines variegatis. Scapulares similiter nigricant, & iisdem maculis variegantur. Superiores caudæ tectrices sunt nigricante & flavescante transversim striatæ. Basim rostri circumdant plumulæ griseæ, maculis fuscis variegatæ. Oculorum ambitus albicat. Genæ, sicut & collum ad latera, fusco & sordidè flavescante variegantur. Guttur candidans, minutis maculis griseo-fuscis varium. Pennæ collum inferius vestientes sunt in medio griseo-fuscæ, ad margines dilutiùs griseæ, & minutis maculis sordidè flavescantibus variæ. Quæ pectus obtegunt, iisdem variegantur coloribus, sed paulò magis, præsertim ad pectoris latera, flavescunt. Venter & crurum suprema pars albet; attamen crurum pars suprema paucò fusco & flavicante exteriùs tantùm variegatur. Inferiores caudæ tectrices pariter albicant; sed ex istis extimæ sunt in latere exteriore tantùm nigricante & flavescante transversim striatæ. Fusco &

dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de noirâtre & de jaunâtre. La bête du bec est entourée de petites plumes grises, variées de taches brunes. Le tour des yeux est blanc. Les joues & les côtés du col sont variés de brun & de jaunâtre sale. La gorge est blanchâtre, & variée de petites taches d'un gris-brun. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-brun dans leur milieu, d'un gris plus clair sur leurs bords, & variées de petites taches d'un jaunâtre terni. Celles qui couvrent la poitrine, sont variées des mêmes couleurs, mais il y a un peu plus de jaunâtre, sur-tout vers les côtés de la poitrine. Le ventre & le haut des jambes sont blancs; cependant le haut des jambes est varié d'un peu de brun & de jaunâtre du côté extérieur seulement. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement blanches; mais celles qui sont les plus extérieures, sont rayées transversalement de noirâtre & de jaunâtre, & cela du côté extérieur seulement. Les

côtés sont variés de brun & de jaunâtre. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches; celles qui sont vers les bords, sont variées de gris-brun; & de ces dernières les plus grandes sont d'un cendré clair. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches jaunâtres: les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées de blanc par le bout seulement. Les plumes de l'aile sont en-dessous d'un cendré clair, & en-dessus elles sont d'un brun brillant & comme doré, & ont leur tige blanche vers leur extrémité: les moyennes sont de plus bordées de blanc par le bout; cependant de celles-la les plus proches du corps sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres, rayées de bandes transversales d'un blanc-jaunâtre, posées obliquement sur chacun de leurs côtés,

flavicante latera variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt candidæ; quæ versùs margines locum obtinent, griseo - fusco variegatæ; & ex istis majores sunt dilutè cinereæ. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, nigricantes, maculis flavescensibus ad margines variegatæ: majores à corpore remotiores fuscæ, albo in apice tantùm simbriatæ. Remiges sunt subtus dilutè cinereæ, superne verò splendidè fuscæ & quasi auro perlustratæ, ipsarum scapis versùs extremitatem candidis: minores sunt insuper albo in apice marginatæ; ex minoribus tamen corpori viciniores sunt nigricantes, & maculis flavescensibus ad margines variæ. Quæ novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Remix prima reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, tenuis striatæ transversis albo-flavicantibus, in utroque latere obliquè positæ, & simul efficientibus angulum, cujus apex rectricis

scapo infidet. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides obscure rubræ. Rostrum , pars crurum plumis nudata , pedes , unguesque nigricantes. In campestribus locis habitat , & juxta aquas quoque versatur. *Ex museo Realmuriano.*

& formant ensemble un angle, dont le sommet est sur la tige de la plume. La prunelle des yeux est noire : leur iris est d'un rouge obscur. Le bec , la partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve dans les champs & aux bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LE PETIT PLUVIER DORÉ.

Pluvialis superne nigricans , maculis flavescens varia , infernè alba ; rectricibus nigricantibus , albo-flavicante ad margines maculatis PLUVIALIS AUREA MINOR.

Pluvialis altera species. *Gesn. Avi. pag. 716 , in qua hujus icon non satis accurata.*

Pluvialis , seu Pardalus minor ; Gallina novalis minor Schwenckfeldii. *Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 415.*

Pardalus quartus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 318.*

Les Allemands l'appellent KLEINER BRACH-VOGEL. Schwenck. Rzac.

Magnitudine & crassitie nonnihil præcedenti cedit. Rostrum habet ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices nigricant , & flavescens variegantur maculis. Guttur , collum inferius , pectus , venter , latera , crurum pars suprema , tectrices

Il est un peu moins grand & moins gros que le précédent. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un noirâtre varié de taches jaunâtres. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , le haut des jambes , les couver-

tures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les ailes sont fort longues. Leurs grandes plumes sont moitié brunes & moitié blanches selon leur longueur : les moyennes sont tout-à-fait brunes. La queue est composée de douze plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches d'un blanc-jaunâtre. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont d'un jaunâtre obscur; & les ongles noirs. On le trouve dans les champs & aux bords des eaux.

caudæ inferiores & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Alæ longæ sunt. Ipsarum majores remiges sunt fuscæ, attamen mediotenùs secundùm longitudinem candidæ: minores penitus fuscæ. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, albo-flavicante ad margines maculatæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque obscurè lutescentes; ungues verò nigri. In campestribus locis & juxta aquas degit.

** 3. LE PLUVIER DORÉ DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. VI. Fig. 1.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavescens varia, infernè alba; collo inferiore & pectore dilutè griseis, marginibus pennarum flavescens; rectricibus fuscis, albo-flavicante ad margines maculatis PLUVIALIS DOMINICENSIS AUREA.

Il est à peu près de la grosseur du nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue

Pluvialem auream nostratam crassitie circiter æmuletur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices cum linea una. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque

usque unum pollicem longum est ; cauda duos pollices & octo lineas ; pars crurum plumis denudata undecim lineas ; pes unum pollicem cum sex lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas , extimus decem lineas , intimus octo cum semi lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis octo pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad decem linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores , dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigricantes , maculis flavescensibus ad margines variegatæ. Superiores caudæ tectrices sunt fuscæ , flavicante transversim striatæ. Basim rostri ambiunt plumulæ albo - rufescentes. Guttur ex albo quoque rufescit. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ dilutè griseæ , marginibus flavescensibus præditæ. Venter , latera , crurum suprema pars , inferioresque caudæ tectrices albicant ;

deux pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes , onze lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , treize lignes , l'extérieur dix lignes , & l'intérieur huit lignes & demie. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane , qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied huit pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à dix lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col , le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres , variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont brunes , & rayées transversalement de jaunâtre. La bête du bec est entourée de petites plumes d'un blanc-roussâtre. La gorge est de la même couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes d'un gris clair , bordées de jaunâtre. Le ventre , le haut des jambes , les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs ; les côtés sont cependant variés d'un peu de gris. Les couvertures du dessous des ailes

font blanches; celles qui sont vers les bords, sont variées de gris-brun; & de ces dernières les plus grandes sont d'un cendré clair. Les plumes scapulaires, les petites & les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes du dos: les suivantes, grandes & petites, sont d'un gris-brun, variées sur leurs bords de taches blanchâtres: les petites & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, mais les grandes sont bordées de blanchâtre par le bout. Les plumes de l'aile sont d'un cendré clair en-dessous, brunes en-dessus, & ont leur tige blanche vers leur extrémité: les moyennes sont de plus bordées de blanchâtre par le bout; cependant de celles-là les plus proches du corps sont d'un brun foncé, & variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusque vers les trois quarts de la longueur de la queue. Les deux premières des plumes de l'aile sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes brunes, variées sur leurs bords de taches d'un blanc-jaunâtre. Le bec est noir. La par-

attamen latera pauco variegantur griseo. Pennæ alas subtus cooperientes alben; quæ versùs margines locum tenent, griseo-fusco variegantur; & ex istis majores sunt dilutè cineræ. Scapulares, superiores alarum tectrices majores & minores corpori finitimæ pennis dorsum vestientibus concolores: quæ sequuntur, majores scilicet & minores, griseo-fusca, maculis candicantibus ad margines variegatæ: minores & majores à corpore remotiores saturatè fusca, majoribus tamen albido in apice fimbriatis. Alarum remiges sunt subtus dilutè cineræ, superne fusca, ipsarum scapis versùs extremitatem candidis: minores sunt insuper candicante in apice marginatæ; ex minoribus tamen corpori finitimæ sunt saturatè fusca, maculis flavescantibus ad margines variegatæ. Quæ nuper descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protendantur. Binæ primores remiges reliquarum omnium longitudinem excedunt. Cauda duodecim constat rectricibus fuscis, albo-flavicante

ad margines maculatis. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *Museum Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

tie des jambes qui est dégar- nie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

4. LE PLUVIER DORÉ DE LA BAYE DE HUDSON.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavo-aurantiis varia, infernè nigra; tæniâ in syncipite albâ, supra oculos & secundùm colli latera protensâ, collum inferius ambiente; rectricibus fusco & nigro transversim striatis . . . PLUVIALIS AUREA FRETÏ HUDSONIS.

Pluvialis nigro-flavus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 1.*

Charadrius nigro-lutescente variegatus, pectore nigro. *Faun. Suec. Linn. N^o. 156.*

Charadrius pectore nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis. Charadrius apricarius. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 7.*

Pluvier moucheté. *Edwards. Tom. III. pag. CXL; avec une figure exacte Pl. 140.*

Les Anglois l'appellent SPOTTED-PLOVER. *Edwards.*

Les Anglois de la Baye de Hudson, HAWK'S-EYE. *Edwards.*

Les Suédois, AOKERHOENS. *Linn.*

Les Oelandois, ALWARGRIM ou ALFWARGRIM. *Linn.*

Les Smolandois, MYRPYTTA. *Linn.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pars

Il est à peu près de la longueur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dé-

garnie de plumes, six lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches d'un jaune brillant & tirant sur l'orangé. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La base du demi-bec supérieur est entourée d'une petite ligne de plumes noires, au-dessus de laquelle est une bande blanche, qui s'étend de chaque côté, passe par-dessus les yeux, & se courbant ensuite, descend tout le long des côtés du col, va en entourer la partie inférieure immédiatement au-dessus de la poitrine, & forme une espèce de collier. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont noirs. Les couvertures du dessous de la queue sont de la

crurum plumis denudata sex lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem, extimus decem lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Pennæ partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestientes sunt nigricantes, maculis ex splendide luteo ad aurantium colorem vergentibus ad margines variâ. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Basim mandibulæ superioris circumdat lineola plumulis nigris conflata, supra quam tænia extat alba, utrinque extensa, supra oculos ducta, indeque reflexa, secundum colli latera protenditur, collum inferius supra pectus ambit, & torquem quodammodo efformat. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera & crurum pars suprema nigri sunt coloris. Inferiores caudæ tectrices simili nigro imbutæ, maculis candidis variegatæ. Pennæ alas subtus obtegentes cinereo-fuscæ.

Alarum margines, ab articulo carpo humano respondente ad alas extremas, vestiunt plumulæ nigricantes, albo fimbriatæ. Teætrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniore, nigricantes, maculis ex splendide luteo ad aurantium colorem inclinantibus ad margines variæ: majores à corpore remotiores nigricantes, paucò candido in apice marginatæ. Remiges majores obscurè nigræ, nigro nonnihil dilutiore fimbriatæ: minores fusco & nigro transversim striatæ. Ex minoribus corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*, & in Septentrionali *Suetiæ* regione.

même couleur, & variées de taches blanches. Celles du dessous des ailes sont d'un cendré-brun. Le bord de l'aile, depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à son extrémité, est couvert de petites plumes noirâtres, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches d'un jaune brillant & tirant sur l'orangé: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées d'un peu de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aile sont d'un noir sombre, bordées d'une couleur un peu plus claire: les moyennes sont rayées transversalement de brun & de noir. De celles-là les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Le bec, la partie des jambes qui est garnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson* & dans le Nord de la *Suède*.

** 5. LE PETIT PLUVIER OU LE GUIGNARD.

Voyez le mâle Pl. IV. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè rufescens; capite superiore fuliginoso, rufescente vario; taniâ ponè oculos albo-rufescente; (ventre supremo fuliginoso *mas*); imo ventre albo; reſtricibus griseis, apice fuscis, quatuor utrinque extimis albo terminatis PLUVIALIS MINOR SIVE MORINELLUS.

Morinellus. Charlet. Exer. pag. III. N^o. I.

Charlet. Onomazt. pag. 106. N^o. I.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 3. (*Mas*).

Morinellus Avis Anglica. Gesn. Avi. pag. 615, in qua hujus icon minimè accurata.

Morinellus Anglorum. Gesn. icon. Avi. pag. 131, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 540, in qua hujus icon minimè accurata.

Willugh. Ornith. pag. 230. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LV; & insuper altera icon minimè accurata Tab. LVII.

Raj. Syn. Avi. pag. III. N^o. A. 4.

Charadrius pectore ferrugineo: lineâ albâ transversâ collum pectusque distinguente. Faun. Suec. Linn. N^o. 158. (*Mas*).

Charadrius abdomine rufescente, pectore cinereo, vertice fusco. Faun. Suec. Linn. N^o. 160. (*Fœmina*).

Charadrius Lapponicus. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 5. (*Fœmina*).

Charadrius pectore ferrugineo, fascia superciliorum pectorisque lineari alba, pedibus nigris. Morinellus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 6.

Gavia Morinellus simpliciter. Klein. Avi. pag. 21. N^o. 5.

Dotralle des Anglois. Alb. Tom. II. pag. 40; avec des figures passables, du mâle Pl. 61, & de la femelle Pl. 62.

Les Anglois l'appellent DOTTERELL. Gesn. Aldrov. Raj. DOTTEREL.

Willugh. Charlet. DOTRELL. Willugh. DOTTERIL. Alb.

Les Lapons, LAHUL. Linn.

Il n'est pas si gros que le Pluvier doré. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pou-

Pluviali aureæ crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex li-

neas æquat, & ad extremos unguis octo pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem cum semi lineas longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quinque cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo lineas, intimus septem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Synciput obtegunt pennæ griseæ, in utroque latere albedo marginatæ. Quæ partem capitis superiorem & occipitium vestiunt, sunt fuliginosæ, in utroque latere rufescente fimbriatæ. In utroque capitis latere tænia extat albo-rufescens, ab oculo infra occipitium usque protensa. Pars colli superior, sicut & dorsi suprema, scapularesque pennæ sunt griseo-fuscæ; marginibus penarum rufescentibus. Pennæ

ces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur sept lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a seize pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert de plumes grises, bordées des deux côtés de blanchâtre. Celles qui couvrent le dessus de la tête & l'occiput, sont de couleur de suie, & bordées des deux côtés de roussâtre. De chaque côté de la tête est une bande d'un blanc-roussâtre, qui s'étend depuis l'œil jusqu'au-dessous de l'occiput. Les parties supérieures du col & du dos, & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée de roussâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le

croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont grises, & bordées pareillement de roussâtre. Les côtés de la tête sont d'un blanc-roussâtre, chaque plume étant marquée d'une petite ligne brune, qui s'étend selon la longueur de sa tige. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col est d'un gris mêlé d'un peu de roussâtre. La poitrine & les côtés sont d'un roussâtre, qui devient de plus en plus foncé en approchant du ventre. Le haut du ventre est de couleur de suie. Le bas-ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont de la même couleur. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, & bordées de roussâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont grises. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les vingt premières sont d'un gris-blanc en-dessous ; mais en-dessus les six premières sont d'un gris tirant sur le roussâtre, & la tige de la première est blanche : les quatre suivantes, sçavoir depuis la septième jusqu'à la dixième inclusivement, sont grises, & bordées d'un peu de roussâtre

verò dorsum infimum & uropygium vestientes, sicut & superiores caudæ tectrices, sunt griseæ, ipsarum marginibus similiter rufescentibus. Caput ad latera ex albo rufescit, qualibet ramentum penna lineolâ insignitur fuscâ, secundum ipsius scapi longitudinem ductâ. Guttur candidat. Pars colli inferior est grisea, pauco rufescente mixta. Pectus & latera rufescunt ; color autem rufescens, versùs ventrem procedendo, magis magisque fit saturior. Venter supremus fuliginoso imbitur colore. Venter imus & crurum suprema pars albicant. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes similiter albicantes. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseofuscæ, rufescente marginatæ : majores à corpore remotiores griseæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : viginti primores sunt subtus cinereo-albæ ; superne verò sex primores ex griseo ad rufescentem vergentes colorem, prioris scapo candido : quatuor proximè sequentes, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, griseæ,

griseæ, pauco rufescente in apice marginatæ : decem quæ sequuntur, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, griseæ, per totam circumferentiam albo fimbriatæ : quatuor corpori viciniore griseo-fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Quæ novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediæ griseæ, attamen versùs apicem fuscæ : quatuor utrinque extremæ concolores, sed albo terminatæ, albore scilicet eò majus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : binæ insuper utrinque extremæ oris quoque exterioribus albis præditæ sunt. Rostrum, unguisque nigri ; pars crurum plumis denudata & pedes fusci.

Fœmina à mare discrepat ventre supremo nequaquam fuliginoso. In reliquis cum illo satis perfectè convenit.

In campestribus locis habitant, & juxta aquas quandoque degunt. Ex museo Realmuriano.

Tom, V.

par le bout : les dix qui suivent, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont grises, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, & bordées de rouffâtre. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont grises, excepté vers le bout, où elles sont brunes : les quatre plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur, & terminées de blanc, cette couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : de plus les deux plus extérieures de chaque côté sont aussi bordées extérieurement de blanc. Le bec & les ongles sont noirs ; la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point le haut du ventre de couleur de suie. Du reste elle lui ressemble assez bien.

On les trouve dans les champs, & quelquefois aux bords des eaux. Du cabinet de M. de Reaumur.

H

6. LE GUIGNARD D'ANGLETERRE.

Pluvialis superne griseo-fusca, marginibus pennarum flavescens, infernè albo-fulvescens; capite superiore albo, flavescente & griseo-fusco vario; tæniâ supra oculos candidâ; rectricibus binis intermediis griseo-fuscis, lateralibus albis MORINELLUS ANGLICANUS.

Gavia Morinella altera. Klein. Avi. pag. 21. N^o. 7.

Dotralle de la Province de Lincoln. Alb. Tom. II. pag. 40; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 63.

Les Anglois l'appellent DOTREL. Alb.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces. Son bec a près d'un pouce de long. Il a environ un pied cinq pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est joliment variée de blanc, de jaunâtre & de gris-brun. De chaque côté de la tête est une bande blanche; qui passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La partie supérieure du col est d'un gris-brun. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue, ainsi que l'aile bâtarde, sont de la même couleur, chaque plume étant bordée de jaunâtre. La

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem circiter pollices æquat. Rostrium habet unum ferè pollicem longum. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Capitis pars superior albo, flavescente & griseo-fusco eleganter variegatur. In utroque capitis latere tænia extat candida, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque producta. Collum superius est griseo-fuscum. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, ala notha & superiores caudæ tectrices sunt

quoque griseo-fuscæ, marginibus pennarum flavescens. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant & aliquid fulvescentis admixtum habent. Remiges majores sunt nigra; prior tamen in latere exterior alba est: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae sunt griseo-fuscæ: laterales omnes albæ. Oculorum pupilla nigra; ipsorum irides candidantes. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes; ungues verò nigricantes. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Habitat in *Anglia* in *Comitatu Lincolnia*.

gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de fauve. Les grandes plumes de l'aile sont noires, excepté le côté extérieur de la première, qui est blanc: les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernières les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun: toutes les latérales sont blanches. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est blanchâtre. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres; & les ongles noirâtres. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Angleterre* dans le *Comté de Lincoln*.

** 7. LE PLUVIER A COLLIER.

Voyez Pl. V. Fig. 1.

Pluvialis superne griseo-fusca, infernè alba; tæniâ supra oculos albo-rufescente; torque duplici, supremo albo, infimo nigricante; reëtricihus octo intermediis griseo-fuscis, versùs apicem nigricantibus, apice albis, binis utrinque extimis candidis, extimâ exteriùs griseo-fusco, proximè sequenti interiùs nigricante maculatâ PLUVIALIS TORQUATA.

An Charadrius fuscus, fronte collarique dorsali abdomineque albis, reëtricihus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris. Charadrius Alexandrinus? *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 3.*

An Charadrius fasciâ pectorali nigrâ, superciliis albis, reëtricihus apice albis fasciâ nigrâ, pedibus cœruleis. Charadrius Ægyptius? *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 5.*

Il est un peu plus gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes & demie de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur six lignes & demie. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par

Crassitie *Turdum Iliacum* paululùm antecellit. Ipfius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices & cinq lineas. Rostrum ab ipfius apice ad oris angulos ufque septem cum femi lineas longum est; cauda duos pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata sex cum femi lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo lineas, intimus sex cum femi lineas. Extimus digitus cum

medio connectitur membrana ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Capitis pars superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ teatrices griseo-fusco imbuuntur colore. Synciput ex albo ad rufescentem colorem nonnihil inclinât: rufescens autem color utrinque supra oculos protenditur. Caput ad latera griseo-fuscum quidem, sed quàm in capite superiore saturatiùs. Guttur candidum. Partem colli capiti finitimam cingit torquis pariter albus, infra quem alius extat torquis nigricans, priore majorem obtinens latitudinem, & pectori dorsoque supremis paululùm insidens. Pectus, venter, latera, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes albi sunt coloris. Crurum superiora pars est in latere exteriori grisea, in interiori candida. Teatrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniore, sunt dorso concolores, qui

une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a quatorze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. Le synciput est d'un blanc tirant un peu sur le rouffâtre: cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Les côtés de la tête sont d'un gris-brun plus foncé que celui du dessus de la tête. La gorge est blanche. La partie du col qui est la plus voisine de la tête est entourée d'un collier de la même couleur, au-dessous duquel en est un autre noirâtre & plus large que le premier, qui porte un peu sur le haut de la poitrine & du dos. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Le haut des jambes est gris du côté extérieur, & blanc du côté intérieur. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos, quelques-unes étant bordées de blanc: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un

brun-noirâtre. Les grandes plumes de l'aile font de cette dernière couleur, ayant cependant la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; de plus les trois premières ont vers les deux tiers de leur longueur leur tige blanche; & les six suivantes, sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la neuvième inclusivement, ont dans le même endroit une longue tache blanche, qui s'étend sur leur côté extérieur: les moyennes plumes de l'aile font blanches & terminées obliquement de brun-noirâtre; cependant les quatre plus proches du corps font de la même couleur que le dos; & les deux suivantes sont entièrement blanches. Ces six plumes se terminent en pointe; mais les quatre plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu font d'abord d'un gris-brun, ensuite noirâtres vers leur extrémité, & terminées de blanc sale: les trois qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, mais elles sont terminées de blanc: les deux plus extérieures

busdam tamen albo marginatis: majores à corpore remotiores ex fusco nigricant. Remiges alarum majores similiter fusco-nigricantes; attamen in latere interiore maximâ parte albâ; trium insuper priorum scapi versus duas tertias longitudinis partes alben; & sex remiges proximè sequentes, à quarta scilicet ad nonam usque inclusivè, eodem in loco longiusculâ insigniuntur maculâ candidâ, in latere exteriorè protensâ: minores remiges candidâ, fusco-nigricante obliquè terminatâ; quatuor tamen corpori finitimâ eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur; & binæ proximè sequentes penitus albicant. Quæ sex novissimè descriptæ remiges in acumen desinunt; quatuor verò corpori viciniores sunt longissimâ, & dum ala complicatur, ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Remix prima reliquarum omnium longitudinem excedit. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ primum griseo-fuscâ, dein versus extremitatem nigricantes, sordidè albo terminatâ;

tres utrinque proximè sequentes concolores, apicibus tamen albis præditæ: binæ utrinque extimæ penitùs candidæ; extima tamen versùs ipsius extremitatem maculâ insignitur griseo-fuscâ, in latere exteriori collocatâ; & proximè sequens minutis quibusdam notatur maculis nigricantibus, in latere interiore positis. Rostrum, unguisque nigri sunt coloris; pars crurum plumis denudata, pedesque rubri. Maris littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

de chaque côté sont entièrement blanches; cependant la plus extérieure est marquée vers son extrémité d'une tache de gris-brun, placée sur son côté extérieur; & la suivante est marquée de quelques petites taches noirâtres, placées sur son côté intérieur. Le bec & les ongles sont noirs; la partie des jambes qui est dépourvue de plumes, & les pieds sont rouges. On le trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 8. LE PETIT PLOUVIER A COLLIER.

Voyez Pl. V. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, infernè alba; tæniâ in syncipite transversâ candidâ, nigro circumdatâ; fasciâ per oculos nigrâ; torque duplici, supremo albo, infimo nigro; reëtrici-bus octo intermediis griseo-fuscis, versùs apicem nigricantibus, tribus utrinque lateralibus apice albis, sequenti in exortu & apice albâ, in medio fusco-nigricante, utrinque extimâ candidâ, interiùs fusco-nigricante maculatâ
PLUVIALIS TORQUATA MINOR.

Charadrius pectore nigro, fronte nigricante lineolâ albâ, vertice fusco. *Faun. Suec. Linn. N°.* 159.

Charadrius pectore nigro, fronte nigricante fasciolâ albâ, vertice fusco, pedibus luteis. *Hiaticula. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 2.*

Charadrius. *Charlet. Exer. pag. 114. N°.* XV.

Charlet. Onomazt. pag. 109. N°. XV.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Charadrius, sive *Hiaticula. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 536. hujus icon non satis accurata pag. 537.*

- Charadrius, Gazæ Hiaticula. *Jonst. Avi. pag. 114. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53, sub titulo, Charadrios.*
- Charadrius five Hiaticula. *Willugh. Ornith. pag. 230. hujus icon minus accurata Tab. LVII.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 112. N^o. A. 6.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 150. N^o. 13.*
- Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 319. N^o. XIII. hujus icon pessima Tab. 269: fig. 2.*
- Charadrius, seu Hiaticula Willughby; Icterus; Galgulus aliorum. *Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 370.*
- Hiaticula. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 4.*
- Gavia littoralis. *Klein. Avi. pag. 21. N^o. 6.*
- Matuitui Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 199, in qua hujus icon pessima.*
- Jonst. Avi. pag. 136. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.*
- Alouette de mer. *Alb. Tom. I. pag. 70; avec une figure passable Pl. 80.*
- An Pluvier, ou Pluvialis miniatis cruribus? *Feuillée. Journ. des Obsf. physf. pag. 410. (ed. 1725).*
- Les Grecs l'appellent Χαράδριος. Aldrov.*
- Les Polonois, ZOLTACZEK. Rzac.*
- Les Suédois, STRANDPIPARE. Linn.*
- Les Lapons, PAGO. Linn.*
- Les Anglois, SEA-LARK. Willugh. Raj. Sloane. Sibbald. Alb.*
- Les Brasiliens, MATUITUI. Marcgr. Jonst.*

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept lignes de long, sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur sept lignes & demie;

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sex pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas, extimus septem cum semi

femi lineas, intimus sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Basim mandibulæ superioris ambit tania nigra, quæ deinde majorem obtinens latitudinem, in utroque capitis latere per oculos ducta, ab oris angulis ad aures usque protenditur, & taniam insuper transversam simili nigro imbutam in parte superiore capitis efformat. Niger autem color latam circumdat taniam transversam candidam, ab interiore cantho unius oculi ad alterius canthum interiorem extensam, & per synciput ductam. Reliquum caput superius est griseo-fuscum. Guttur & colli suprema pars albicant; quæ albedo quodammodo torquem efficit, infra quem alius extat latiusculus torquis niger. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt griseo-fuscæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albore nitent. Superiores alarum tectrices minimæ & me-

& l'intérieur six lignes. Il a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La base du demi-bec supérieur est entourée d'une bande noire, qui devient ensuite plus large, s'étend de chaque côté de la tête depuis les coins de la bouche jusqu'aux oreilles, en passant par les yeux, & forme de plus sur la partie supérieure de la tête une bande transversale de la même couleur: ce noir entoure une large bande transversale blanche, qui s'étend depuis l'angle intérieur d'un œil jusqu'à l'angle intérieur de l'autre, & passe par le synciput. Le reste de la partie supérieure de la tête est d'un gris-brun. La gorge & le haut du col sont blancs; ce qui forme une espèce de collier, au-dessous duquel est un autre collier noir passablement large. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun: les grandes les plus proches du corps sont

de la même couleur, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, quelques-unes d'entr'elles étant bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-six plumes : les dix premières sont d'un brun d'autant plus foncé, que la plume est plus éloignée du corps ; & une grande partie de leur côté intérieur est blanchâtre : de celles-là les quatre premières ont leur tige blanche depuis environ les deux tiers de leur longueur jusque vers leur bout ; les six autres ont dans le même endroit une tache blanche, placée du côté extérieur, & qui devient d'autant plus grande, que la plume se rapproche plus du corps : les neuf suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont blanches à leur origine & dans une grande partie de leur côté intérieur ; le reste est d'un gris-brun & bordé de blanc ; cette bordure est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : la vingtième & la vingt-unième sont blanches, & ont seulement une tache d'un gris-brun, placée du côté intérieur, & qui est beaucoup plus grande sur la vingt-unième plume que sur la précédente : les cinq plus proches

dix sunt griseo-fuscæ : majores corpori viciniore concolores, albo terminatæ : majores à corpore remotiores nigricantes ; ex istis tamen quædam albo in apice marginantur. Viginti sex remigibus ala conflatur : decem primores fusco imbutæ eò saturatiore, quò remix fit à corpore remotior, & in latere interiore maximâ parte candicantes : inter istas quatuor primores scapis donantur à duabus circiter tertiis ipsarum longitudinis partibus versùs extremitatem usque albis ; sex reliquæ eodem in loco maculâ insigniuntur candidâ, in latere exteriori positâ, quæ macula eò major fit, quò remix est corpori vicinior : novem sequentes remiges, ab undecima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt in exortu & maxima lateris interioris parte candidæ, in reliqua longitudine griseo-fuscæ, marginibus albis præditæ ; quæ margines eò fiunt latiores, quò remix fit corpori finitima : vigesima & vigesima prima candidæ ; maculâ tantùm notatæ griseo-fuscâ, interiùs collocatâ, & multò quidem majore in vigesima prima remige

quàm in præcedente : quinque corpori viciniore dorso concolores. Quæ ultimæ longissimæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt griseo-fusco imbutæ ; qui color, versùs rectricis apicem procedendo, nigricat : tres utrinque proximè sequentes eodem colore tinctæ, sed apice albæ : quinta in exortu alba, dein fusco-nigricans, albo terminata, & in latere exteriori albo insuper fimbriata : utrinque extrema in tota longitudine candida, minutâ tantùm insignita maculâ fusco-nigricante, versùs duas tertias longitudinis partes in latere interiori positâ. Rectrix autem ista novissimè descripta reliquis paululùm longitudine cedit ; aliæ verò omnes æqualem circiter obtinent longitudinem. Oculorum irides avellanæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs extremitatem usque eleganter aurantium, ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes similiter eleganter aurantii ; ungues verò nigri. Trium digitorum an-

du corps sont de la même couleur que le dos. Ces dernières sont très-longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun qui devient noirâtre en approchant du bout de la plume : les trois suivantes de chaque côté sont de la même couleur, & terminées de blanc : la cinquième est blanche à son origine, ensuite d'un brun-noirâtre, & terminée de blanc ; elle est aussi bordée de blanc du côté extérieur : la plus extérieure de chaque côté est blanche dans toute sa longueur, & a seulement une petite tache d'un brun-noirâtre, placée sur le côté intérieur vers les deux tiers de sa longueur. Cette dernière plume est un peu plus courte que les autres, qui sont à peu près d'égale longueur entr'elles. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un bel orangé depuis son origine jusque vers son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un bel orangé ; & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite

membrane, qui s'étend depuis son origine jusqu'à la première articulation. On le trouve aux bords de la mer, dans les rochers desquels il fait son nid. Ses œufs sont verdâtres, tachetés de brun, son extrémité obtuse étant tout-à-fait brune. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ticorum medius cum extremo digito connectitur membranulâ ab ipsius exortu ad primum usque articulum extensâ. Maris littora frequentat; ibique in rupibus nidificat. Ova ponit viridescentiâ, fusco maculata, extremitate quidem obtusâ penitus fuscâ. *Ex museo Realmuriano.*

9. LE PLUVIER A COLLIER DE VIRGINIE.

Pluvialis superne griseo-fusca, infernè alba; taniâ in sincipite candidâ, per oculos protensâ; maculâ in vertice & taniâ infra oculos nigris; torque duplici, supremo albo, infimo nigro; uropygio rufo; rectricibus in exortu rufis, versùs apicem nigris, apice rufescentibus . . . PLUVIALIS VIRGINIANA TORQUATA.

Charadrius fasciis pectoris colli frontis genarumque nigris, caudâ luteâ fasciâ nigrâ, pedibus pallidis. Charadrius vociferus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 4.*

Gavia brachyptera, vocifera. *Klein. Avi. pag. 21. N°. 8.*

Pluvier criard. *Catesb. Tom. 1. pag. 71; avec une figure très-exacte Pl. 71.*

Les Anglois l'appellent CHATTERING PLOVER. *Catesb.*

Les Habitans de Virginie, KILL-DEER. *Catesb.*

Il est un peu plus gros que le *Guignard*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est

Morinellum nonnihil crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices & totidem circiter lineas explet, & ad extremos unguis octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars

crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. In syncipite lata adest tænia candida, in utroque capitis latere protensa, & per oculos ducta. Supra quam tæniam majuscula extat macula nigra, in capitis vertice posita. Reliquum caput superius est griseo-fuscum. In utroque capitis latere tænia extat nigra, ab exortu rostri orta, infra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Guttur albat: quæ albedo utrinque protenditur, collum cingit, & quodammodo torquem efficit, infra quem alius adest latiusculus torquis niger. Dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices griseo-fusco imbuuntur colore. Uropygium & tectrices caudæ superiores sunt rusæ. Pectus, ventrem, crurum supremam

dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Sur le synciput est une large bande blanche, qui s'étend de chaque côté de la tête, & passe par les yeux. Au-dessus de cette bande sur le sommet de la tête est une grande tache noire. Le reste du dessus de la tête est d'un gris-brun. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part de l'origine du bec, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge est blanche: cette couleur s'étend de chaque côté, fait le tour du col, & forme une espèce de collier, au-dessous duquel est un autre collier noir passablement large. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun. Le croupion est roux, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. La poitrine, le ventre, le haut des

jambes ; les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Sur le haut de la poitrine est une large bande transverse noire. Les grandes plumes de l'aile sont brunes : les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernières les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes rouffes depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, ensuite noires vers leur bout & terminées de rouffâtre. Les paupières sont rouges. Le bec est noir. La partie des jambes, qui est dé-garnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune très-clair ; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Virginie* & à la *Caroline*.

partem & latera vestiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ rectrices concolores. Summum pectus latâ insignitur taniâ transversâ nigrâ. Remiges alarum majores sunt fuscæ : minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertinent. Cauda duodecim conflatur rectricibus ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque rufis, dein versùs apicem nigris, apice rufescentibus. Palpebræ rubræ sunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque dilutissimè lutei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Virginia* & *Carolina*.

** 10. LE PLUVIER A COLLIER DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. VI. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, marginibus pennarum rufescentibus, infernè alba ; taniâ in sincipite candidâ, supra oculos protensâ ; maculâ in vertice nigrâ ; torque duplici, supremo albo, infimo nigro ; uropygio rufo ; rectricibus binis intermediis griseo-fuscis, apice rufescentibus, binis utrinque proximis griseo-fuscis, versùs apicem nigris, apice rufescentibus, tribus utrinque extimis rufis, versùs apicem

nigris, apice albis, extimâ in exortu albâ, nigricante transversim friata . . . PLUVIALIS DOMINICENSIS TORQUATA.

Crassitie *Pluvialem torquatam nostratem* circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas explet, & ad extremos unguis octo pollices & lineam unam. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo cum semi lineas; pes quindécim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Partem capitis superiorem & dorsum vestiunt pennæ griseo-fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Scapulares concolores. Uropygium & superiores caudæ tectrices rufi sunt coloris. In syncipite,

Il est à peu près de la grosseur de *notre Pluvier à collier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée de rouffâtre. Le croupion est roux, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du bec, est une bande transversale blanche, qui s'é-

tend de chaque côté au-dessus des yeux. Sur le sommet de la tête, au-dessus de la bande blanche, est une tache noire. La gorge est blanche : cette couleur s'étend de chaque côté, entoure le col, & forme une espèce de collier, au-dessous duquel est une bande noire, qui entoure de même le col, & forme un second collier. Ce dernier collier est beaucoup plus large sur la partie inférieure du col, que sur sa partie supérieure. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Sur la poitrine est une large bande transversale variée de noir & de blanc ; c'est-à-dire qu'en cet endroit les plumes sont blanches à leur origine, ensuite noires, & bordées de blanc par le bout. Les petites couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont d'un gris-brun : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur, & bordées de roussâtre : enfin les petites & les grandes les plus éloignées du corps sont noires, & bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les cinq premières sont noires, & ont

immediatè supra rostri exortum, tania extat transversa candida, utrinque supra oculos protensa. In capitis vertice, supra taniam candidam, macula adest nigra. Guttur albicat : albedo autem in utroque latere extenditur, collum ambit, & quodammodo torquem efficit, infra quem tania extat nigra, collum similiter cingens, & torquem alterum efformans : qui novissimus torquis multò majorem in parte colli inferiore quàm in superiore latitudinem obtinet. Pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes eodem albore nitent. In pectore latiuscula extat tania transversa albo & nigro varia ; eo scilicet in loco pennæ sunt in exortu albæ ; deinde nigræ, apice albo fimbriatæ. Tectrices alarum superiores minimæ corpori viciniore griseo-fuscæ : mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ colore, sed rufescente marginatæ : minores tandem, majoresque à corpore remotiores nigræ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti

viginti quatuor remiges : la plus grande partie de leur
 quinque primores sunt ni- côté intérieur blanche selon
 græ, attamen in latere inte- leur longueur ; elles sont de
 riore secundum ipsarum lon- plus marquées d'une tache blan-
 gitudinem maximâ parte che, placée sur leur tige vers
 candidæ, & maculâ insuper leur extrémité, laquelle tache
 insignitæ candidâ, super sca- s'étend d'autant plus sur le côté
 pum versùs ipsarum extre- extérieur, que la plume s'ap-
 mitatem collocatâ ; quæ ma- proche plus du corps : les cinq
 cula eò magis in latere ex- suivantes, sçavoir depuis la
 teriore extenditur, quò re- sixième jusqu'à la dixième in-
 mix fit corpori vicinior : clusivement, sont noires,
 quinque proximè sequentes, ayant de même une grande par-
 à sexta scilicet ad decimam tie de leur côté intérieur blan-
 usque inclusivè, nigræ, & che ; elles sont aussi de cette
 præcedentium instar, in la- couleur dans le milieu de leur
 tere interiore maximâ parte côté extérieur : les huit qui sui-
 candidæ, candidoque imbu- vent, sçavoir depuis l'onzième
 tæ in lateris exterioris media jusqu'à la dix-huitième inclusi-
 parte : octo quæ sequuntur, vement, sont blanches depuis
 ab undecima scilicet ad dec- leur origine jusque vers la moi-
 cimam octavam usque inclu- tié de leur longueur, le reste
 sivè, ab ipsarum exortu me- étant noir & bordé de blanc ;
 diam versùs longitudinem dans ces plumes le noir occupe
 usque albæ, in reliqua lon- d'autant moins d'espace, qu'el-
 gitudine nigræ, albo margi- les sont plus proches du corps :
 nata ; in illis autem color de plus la plûpart de ces plumes,
 niger eò minus spatium oc- sçavoir depuis la troisième jus-
 cupat, quò corpori vicinio- qu'à la dix-huitième inclusive-
 res fiunt : pleræque insuper ment, sont bordées de blanc
 istæ remiges, à tertia scilicet par le bout : la dix-neuvième
 ad decimam octavam usque est tout-à-fait blanche : la ving-
 inclusivè, albo sunt in apice tième est de la même couleur,
 fimbriatæ : decima nona pe- excepté du côté extérieur, vers
 nitùs candida : vigesima eo- son origine, où elle est d'un gris-
 dem colore tincta, attamen brun : la vingt-unième est blan-
 in latere exteriori versùs ip- che à son origine & à son bout,
 sius exortum griseo-fusca : & d'un gris-brun dans son mi-

lieu ; cette dernière couleur coupant obliquement la plume : enfin les trois plus proches du corps sont d'un gris-brun. Ces trois dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Les deux premières plumes de l'aile sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun & terminées de rouffâtre : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont d'abord d'un gris-brun, ensuite noires vers leur bout, & terminées de rouffâtre : les trois plus extérieures de chaque côté sont d'abord rouffes, ensuite noires vers leur bout, & terminées de blanc ; la plus extérieure cependant est depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur blanche, & rayée transversalement de noirâtre. Le bec est d'un cendré-bleuâtre, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes ; & les pieds sont aussi d'un cendré-bleuâtre ; & les ongles sont noirs. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

vigesima prima in exortu & apice candida, in medio griseo-fusca, griseo-fusco colore remigem obliquè dividente : tres tandem corpori finitimæ griseo-fuscæ. Tres istæ novissimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Binæ primores remiges sunt omnium longissimæ. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ griseo-fuscæ, apice rufescentes : binæ utrinque proximè sequentes primùm griseo-fuscæ, dein versùs apicem nigræ, rufescente terminatæ : tres utrinque extimæ primùm rufæ, dein versùs apicem nigræ, apice albæ ; attamen extima ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque albæ, nigricante transversim striata. Rostrum cinereo-cœrulescens, excepto apice nigro. Pars crurum plumis denu data & pedes quoque cinereo-cœrulescentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Chervain*.

II. LE PLUVIER A COLLIER DE LA JAMAÏQUE.

Pluvialis superne obscurè fusca, infernè alba; pectore nigris maculis vario; torque albo; rectricibus albidis, rufo & nigricante variegatis PLUVIALIS JAMAICENSIS TORQUATA.

Pluvialis viridis ex fusco & albo varia, caudâ longiore. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 318. N^o. XI. hujus icon pessima Tab. 263. fig. 3.*

Pluvialis ex fusco & albo varia, caudâ longiore. *Raj. Syn. Avi. pag. 190. N^o. 10.*

Tringa subcinerea ventre albido, collo annulo albo nigro marginato cincto. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 477.*

Les Anglois de la Jamaïque l'appellent GREATEST SNIPE. Sloane. Raj. LARGER GREY SNIPE WITH A WHITE NECK. Browne.

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo circiter pollices explet, & ad extremos unguis septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda tres pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem cum semi lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pol-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a seize pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées,

s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun obscur. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. La poitrine est variée de blanc & de noir. La partie du col la plus voisine de la tête est entourée d'un collier blanc. Les plumes de l'aile sont d'un brun obscur. La queue est composée de douze plumes blanchâtres, variées de roux & de noirâtre. Les paupieres sont orangées. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont blancs, toutes les articulations étant cependant noirâtres; & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Jamaïque* sur le bord des rivières.

licum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt obscurè fuscæ. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, crurum pars suprema & tectrices caudæ inferiores albicant. Pectus albo & nigro variegatur. Partem colli corpori finitimam circumdat torquis albus. Alarum remiges tingit color obscurè fuscus. Cauda duodecim confiat rectricibus albidis, rufo & nigricante variegatis. Palpebræ aurantiæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes albicantes, omnibus tamen articulis nigricantibus; ungues verò nigri. Habitat in *Jamaica*, ibique juxta flumina degit.

** 12. LE GRAND PLUVIER, APPELLÉ VULGAIREMENT
COURLY DE TERRE.

Voyez Pl. VII. Fig. 1.

Pluvialis superne griseo-fulva, pennis in medio fuscis, circa margines fulvis, infernè fulva, medio pennarum in collo inferiore & supremo pectore fusco; taniâ supra & infra oculos albo-fulvescente; lineolâ infra oculos fuscâ; rec-

tribus sex intermediis griseis, fasciis fuscis circumferentia parallelis, tribus utrinque extimis candidis, binis utrinque extimæ proximis nigricante transversim striatis, lateribus nigricante terminatis . . . PLUVIALIS MAJOR, OEDICNEMUS VULGO DICTA.

Oedicnemus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 98. hujus icones minimè accuratæ pag. 99 & 100.*

Jonst. Avi. pag. 43. hujus duæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab. XXVI, quarum altera sub titulo, Charadrios.

Willugh. Ornith. pag. 227. hujus icon minimè accurata Tab. LVIII; & insuper altera icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXXVII.

Raj. Syn. Avi. pag. 108. N^o. A. 4.

Charlet. Exer. pag. 83. N^o. XI.

Charlet. Onomazt. pag. 74. N^o. XI.

Charadrius. Gesn. Avi. pag. 256, in qua hujus icon minimè accurata.

Charadrius Aristotelis. Gesn. icon. Avi. pag. 125, in qua eadem icon.

Charadrius brevicaudus, rufescens, maculatus. Barr. Ornith. Class. IV.

Gen. X. sp. 1.

Charadrius griseus, remigibus primoribus duabus nigris medio albis, rostro aucto, pedibus cinereis. Oedicnemus. Linn. Systh. Nat. ed.

10. Gen. 79. sp. 9.

Gavia rostro virescente, conico, acuto. Klein. Avi. pag. 20. N^o. 4.

Arquatæ congener, seu minor. Charlet. Exer. pag. 111.

Charlet. Onomazt. pag. 106.

Fedoxæ tertia species. Willugh. Ornith. pag. 216.

Fedoa nostra tertia. Raj. Syn. Avi. pag. 105. N^o. A. 6.

Ostardeau ou Oedicnemus. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 239, dans laquelle il y a une figure peu exacte.

Ostardeau. Bel. Portr. d'Ois. pag. 57 a, dans laquelle est la même figure.

Outarde ou Ostarde & Bitarde. Alb. Tom. I. pag. 61; avec une mauvaise figure Pl. 69.

Les Grecs l'appellent Ο'διννυμος. Bel.

Les Italiens, CORUZ. Gesn. Aldrov.

Les Romains, CARLOTTE. Willugh.

Les Allemands, en quelques endroits, TRIEL ou GRIET. Gesn. Aldrov.

Les Anglois, STONE CURLEW. Willugh. Raj. Charlet. Alb.

Les Habitans de la Province de Cornouaille, STONE CURLEW. Willugh. Raj.

Craffitie Columbam Romanam antecellit. Ipsius longi- Il est plus gros qu'un Pigeon Romain. Sa longueur depuis le

bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes & demie de long; sa queue cinq pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce six lignes; son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur onze lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds deux pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, le dessus du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & cela selon la longueur de leur rige, & d'un gris-fauve sur les deux côtés, le tout étant bordé de fauve. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve, qui s'étend au-dessus des yeux,

tudo à rostri apice ad caudæ extremitatem quindecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues sexdecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & decem cum semi lineas longum est; cauda quinque pollices cum lineis binis; pars crurum plumis denudata unum pollicem & sex lineas; pes duos pollices & novem lineas; trium digitorum anticcrurum medius cum ungue sexdecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum totidem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ, in utroque latere griseo-fulvæ, marginibus fulvis præditæ. Scapulares & superiores caudæ teatrices concolores. In utroque capitis latere tæ-

nia extat ex albo ad fulvescentem colorem nonnihil inclinans, supra oculos ducta, infra quos altera adest tania eodem colore imbuta. Novissimam taniam istam inter & oculum lineola extat fusca. Guttur ex albo nonnihil ad fulvum vergit. Partem colli inferiorem & pectus supremum obtegunt pennæ ad latera fulvæ, in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ. Quæ latera cooperiunt, ex albo paululum ad fulvum inclinant, & strictâ insigniuntur lineâ fuscâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ. Pectus infimum, venter & crurum suprema pars albi sunt coloris. Inferiores caudæ tectrices sunt fulvæ. Pennæ alas subtus obtegentes candidæ, ex istis autem ultimis quædam strictâ quoque notantur lineâ fuscâ, secundum ipsarum scapi longitudinem protensâ; & majores à corpore remotiores cinereo-fusco terminantur. Tectrices alarum superiores minimæ pennis dorsum vestientibus concolores: mediæ cinereo albæ, lineâ fuscâ, secundum scapi longitudinem ductâ, insignitæ, & strictissimâ margine fulvâ præditæ: majores corpori finitimæ

au-dessous desquels est une autre bande de la même couleur. Entre cette dernière bande & l'œil est une petite ligne brune. La gorge est d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont couverts de plumes fauves sur leurs côtés, & brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent les côtés, sont d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve, & marquées chacune d'une étroite ligne brune, qui s'étend tout le long de la tige. Le bas de la poitrine, le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont fauves. Celles du dessous des ailes sont blanches; quelques-unes de ces dernières sont aussi marquées d'une étroite ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige; & les grandes les plus éloignées du corps sont terminées de cendré-brun. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que les plumes du dos: les moyennes sont d'un gris-blanc, marquées d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & bordées très-étroitement de fauve: les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-blanc, & terminées obliquement de

noirâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait noirâtres. La première des plumes de l'aile est noirâtre à son origine & à son extrémité, & blanche dans son milieu : les cinq suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixième inclusivement, sont noirâtres, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; de plus la seconde est marquée vers les trois quarts de sa longueur d'une large bande transversale blanche; & la troisième est aussi marquée dans le même endroit d'une petite tache blanche, placée auprès de sa tige sur son côté extérieur : les trois qui suivent, sçavoir depuis la septième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, le reste est noirâtre, & terminé d'un peu de blanc : toutes les autres sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur; il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui sont grises & bordées de blanc, la bordure de celle qui est la plus proche du corps, tirant un peu sur le fauve. Ces trois dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus

cinereo - albæ ; nigricante obliquè terminatæ : majores tandem à corpore remotiores penitus nigricantes. Remix prima in exortu & apice nigricat, in ipsius medio est candida : quinque proximè sequentes, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, sunt nigricantes, & in latere interiore maximâ parte candidæ; secunda insuper versùs tres quartas ipsius longitudinis partes latâ notatur tæniâ transversâ albâ; & tertia eodem in loco minutâ quoque insignitur maculâ candidâ, prope ipsius scapum in latere exteriori positâ : tres quæ sequuntur, à septima scilicet ad nonam usque inclusivè, ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque albæ, in reliqua longitudine nigricantes, pauco albo terminatæ : reliquæ omnes remiges in latere exteriori & apice nigricantes, in latere interiore candidæ; ex istis tamen excipiendæ sunt tres corpori viciniore griseæ, marginibus albis præditæ, remigis corpori finitimæ margine paululùm ad fulvum vergente colorem. Tres istæ remiges novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ,

& dum ala complicatur, longuës plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises, variées de bandes brunes, paralleles à leur circonférence, & terminées de blanchâtre, sur lequel est aussi une bande brune parallele à la circonférence de l'extrémité de la plume : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, avec cette différence qu'elles sont terminées de noirâtre, & que les bandes brunes paroissent fort peu sur le côté extérieur : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches & terminées de noirâtre, cette dernière couleur occupant plus d'espace sur le côté extérieur que sur l'intérieur ; de plus les deux plus proches de la plus extérieure de chaque côté sont rayées de bandes transversales noirâtres. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux & les paupieres sont jaunes. Au-dessous de chaque œil est un espace nud d'un jaune verdâtre. Le bec est de cette dernière couleur depuis son origine jusqu'au-delà

des narines, & noir depuis les narines jusqu'à son extrémité. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre; & les ongles noirs. On le trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

que luteo - viridescens, à naribus ad apicem usque nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque luteo-viridescens; unguis verò nigri. In campestribus locis habitat. *Ex museo Reaumuriano.*

13. LE GRAND PLUVIER DE BENGALE.

Pluvialis superne splendide fusca, nigro resperfa, inferne nigra; capite superiore, gutture & collo nigris; genis dilute castaneis; rectricibus splendide fuscis, punctulis & taniis transversis nigris notatis . . . PLUVIALIS BENGALENSIS MAJOR.

Outarde des Indes. *Edwards. Glanur. pag. 87. Chap. XL; avec une figure exacte Pl. 250.*

Les Anglois l'appellent, INDIAN BUSTARD. Edwards.

Les Habitans de Bengale CHURGE. Edwards.

Il est assez menu à proportion de sa grandeur. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a environ deux pouces trois lignes de long; sa queue cinq pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dé garnie de plumes, environ deux pouces; son pied cinq pouces trois lignes; & celui du milieu des trois doigts

Pro ratione magnitudinis corpore gracili donatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & undecim circiter pollices explet, & ad extremos unguis duos pedes totidem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres circiter lineas longum est; cauda quinque pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata duos circiter pollices; pes quinque pollices cum tribus li-

neis ; & trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas : laterales multò sunt breviores. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partem capitis superiorem, guttur & collum vestiunt pennæ nigræ, longiusculæ, strictæ. Caput ad latera sive genæ sunt dilutè castanæ. Dorsum, uropygium, superioresque caudæ tectrices splendè fuscæ, nigro resperæ : & ex pennis dorsum vestientibus quælibet insuper majusculâ maculâ nigrâ in medio insignitur. Qui color fuscus nigro variegatus in utroque colli inferioris latere protenditur, illud immediatè supra pectus ambit, ibique tæniam transversam efficit. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus cooperientes nigri sunt coloris. Superiores alarum tectrices sunt penitus candidæ ; minimæ tamen, istæ scilicet quæ versùs articulum carpo humano respondentem sunt positæ, nigro marginantur. Remiges majores sunt in latere exteriori albæ, ad apicem obscurè cineræ : mediæ candidæ, in tota su-

antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le dessus de la tête, la gorge & le col sont couverts de plumes noires, assez longues & étroites. Les côtés de la tête ou les joues sont d'un marron clair. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun brillant, tout parsemé de noir : de plus les plumes du dos ont chacune dans leur milieu une grande tache noire. Ce brun varié de noir s'étend de chaque côté de la partie inférieure du col, l'entoure immédiatement au-dessus de la poitrine, & forme là une bande transversale. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont noirs. Les couvertures du dessus des aîles sont tout-à-fait blanches, excepté les plus petites, placées vers le pli qui répond à celui du poignet, qui sont bordées de noir. Les plus grandes plumes de l'aîle sont blanches du côté extérieur, & terminées d'un cendré obscur : les moyennes sont d'un blanc tout parsemé de noir, & varié de larges bandes transversales de la même

couleur : enfin les plus proches du corps sont d'un grisâtre tout parsemé de petites taches noires. La queue est composée de douze plumes du même brun que le dos, parsemé pareillement de petits points noirs, & varié de bandes transversales de la même couleur. Les yeux sont grands : leur iris est de couleur de noisette ; & les paupieres sont cendrées. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes ; & les pieds sont blanchâtres ; & les ongles sont bruns. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

perficie nigro respersæ, latissime tæniis transversis similiter nigris variegatæ : corpori tandem viciniore ad griseum accedentes, minutis maculis nigris in universa ipsarum superficie disseminatis. Caudam componunt duodecim rectrices, dorso instar, splendide fusca, punctulis nigris pariter aspersæ, & tæniis transversis concoloribus variæ. Oculi sunt magni : ipsorum irides avellaneæ ; palpebræ verò cinereæ. Pars crurum plumis denudata, pedesque candicantes ; ungues verò fusci. Habitat in *Bengalensi* Regno.

14. LE PLUVIER HUPÉ DE PERSE.

Pluvialis cristata, superne castaneo-fusca, infernè nigra ; pectore ad violaceum inclinante ; imo ventre albo ; capite superiore & cristâ nigro-viridantibus ; genis, occipitio & collo ad latera candidis ; rectricibus albis, apice nigris
PLUVIALIS PERSICA CRISTATA.

Charadrius gulâ pileo pectoreque nigris ; occipitio cristato, dorso testaceo, pedibus nigris. Charadrius cristatus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 1.*

Garia, s. Vanellus Indicus. *Klein. Avi. pag. 22. N^o. 10.*

Pluvier des Indes à la gorge noire. *Edwards. Tom. 1. pag. XLVII ; avec une figure exacte Pl. 47.*

Il est un peu plus gros que le *Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix

Crassitie *Vanellum* paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam decem cir-

citer pollices æquat, & ad extremos unguis undecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes duos pollices & tres lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas, extimus tredecim lineas, intimus undecim lineas. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Capitis superior pars pennis vestitur nigro-viridantibus; quæ pennæ sunt longiusculæ; harum enim quædam unius pollicis longitudine pollent, elegantemque cristam efformant. Genæ, occipitium & collum ad latera albicant. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt castaneofuscæ. Guttur & collum inferius nigri coloris. Pectus ex nigro ad violaceum inclinat. Ventrem supremum tingit color niger. Venterimus, pennæ caudam subtus cooperientes & crurum suprema pars alben. Superiores alarum tectrices, majores scilicet & minores, corpori finitimæ sunt dorso conco-

pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes, l'extérieur treize lignes, & l'intérieur onze lignes. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un noir mêlé d'un lustre de verd: ces plumes sont assez longues, quelques-unes ayant jusqu'à un pouce de long, & formant une joli hupe. Les joues, l'occiput & les côtés du col sont blancs. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron rembruni. La gorge & la partie inférieure du col sont noires. La poitrine est d'un noir tirant sur le violet. Le haut du ventre est noir. Le bas-ventre, les couvertures du dessous de la queue & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessus des ailes, grandes & petites; les plus proches du corps sont

de la même couleur que le dos ; les plus éloignées du corps sont aussi d'un marron rembruni, & terminées de blanc. Le bord de l'aile depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à son extrémité est varié de blanc & de noir. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont d'un marron rembruni. De ces dernières les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur, & noires à leur extrémité. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun foncé. On le trouve dans le Royaume de *Perse*.

lores ; à corpore remotiores similiter castaneo-fuscæ, sed albo terminatæ. Alarum margines ab articulo carpo humano respondente ad ipsarum extremitates usque albo & nigro variegatæ. Remiges majores nigræ : minores castaneo - fuscæ. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque albæ, apice nigræ. Rostrum quoque nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque saturatè fuscæ. Habitat in *Perfiæ* Regno.

** 15. LE PLUVIER ARMÉ DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. VII. Fig. 2.

Pluvialis cristata, superne grisea, infernè albo-fulva; capite; cristâ, gutture & maculâ ferri equini æmulâ in medio ventre nigris; retractoribus albo-fulvis, nigro terminatis, binis utrinque extimis albo-fulvo in apice marginatis, alis armatis PLUVIALIS SENEGALENSIS ARMATA.

An Charadrius remigibus pectore abdomine pedibusque atris, retractoribus dimidiato-albis, humeris spinosis. Charadrius spinosus? *Linn.* *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 11.*

Cum *Pluviale aurea* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & septem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus undecim lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis undecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quatuor linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. In utriusque alæ summitate, id est, versùs articulum carpo humano respondentem calcar extat substantiæ cornu æmulæ, sex cum semi lineas longum, acutissimum & nigrum. Partem capitis superiorem & guttur tingit elegantissimus

Il est à peu près de la grosseur du *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue trois pouces sept lignes; la partie de ses jambes qui est dé garnie de plumes, un pouce; son pied deux pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes; l'extérieur onze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied onze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatre lignes au-delà du bout de la queue. Sur le haut de chaque aile, savoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est un épron d'une substance semblable à de la corne, long de six lignes & demie; très-pointu & noir. La partie supérieure de la tête & la gorge sont d'un très-beau noir; cette couleur descend un peu sur la partie inférieure du col. Les plumes qui couvrent l'occiput, dont

quelques-unes ont jusqu'à un pouce neuf lignes de long, sont fort étroites, & forment une jolie hupe. La partie supérieure du col, le dos & le croupion sont gris. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les côtés de la tête au-dessous des yeux, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des ailes sont d'un blanc-fauve. Le milieu du ventre est marqué d'une assez grande tache noire, en forme de fer à cheval, dont la convexité est tournée vers la poitrine. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont noires : les moyennes sont grises : les grandes les plus proches du corps sont d'un blanc-fauve ; & les plus éloignées du corps sont noires. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les neuf premières sont noires : les dix qui suivent, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont d'un blanc-fauve à leur origine, & noires à leur extrémité, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume, & le noir oc-

color niger ; qui color supra collum inferius paululum protenditur. Pennæ occipitium obtegentes, quarum quædam unius pollicis & novem linearum longitudinem obtinent, sunt strictissimæ, elegantemque cristam efficiunt. Pars colli superior, dorsum, uropygium & scapulares pennæ sunt griseæ. Caput ad latera, idque infra oculos, collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ caudam superne & inferne cooperientes, inferioresque alarum teatrices ex albo ad fulvum vergunt. Medius venter majusculâ insignitur maculâ nigrâ, ferri equini æmulâ, cujus convexitas pectus spectat. Superiores alarum teatrices minimæ, istæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, sunt nigrae : mediae griseæ : majores corpori finitimæ albo-fulvæ ; à corpore autem remotiores nigrae. Viginti quinque remigibus ala conflatur : novem primores sunt nigrae : decem proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam primam usque inclusivè, sunt in exortu albo-fulvæ, in extremitate nigrae ; duobus

bus istis coloribus unamquamque remigem oblique dividuntibus, nigroque colore eò minus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior: vigesima & vigesima prima albo-fulvæ: quatuor corpori finitimæ griseæ. Quæ novissimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus albo-fulvis, nigro terminatis: color autem niger tertiam circiter duarum intermediarum longitudinis partem tingit; in lateralibus verò eò minus spatium occupat, quò rectrix fit exterior: binæ insuper utrinque extimæ sunt albo-fulvo in apice marginatæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

cupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps : la vingtième & la vingt-unième sont d'un blanc-fauve : les quatre plus proches du corps sont grises. Ces dernières sont longues & pointues ; & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque'aussi loin que les plus longues plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un blanc-fauve, & terminées de noir : cette dernière couleur occupe environ le tiers de la longueur des deux du milieu ; & dans les latérales elle occupe d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure ; les deux plus extérieures de chaque côté sont de plus bordées de blanc-fauve par le bout. Le bec, la partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.








Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces.

Petit Pluvier ou Guignard.






Fig. 1.

Fig. 2.


6
5
4
3
2
1
Echelle de 6. Pouces.

Desiné et Gravé par Martinet.

1. Pluvier doré.


2 Petit Pluvier ou Guignard..





2. *Petit Pluvier à collier.*





1. Pluvier à collier. 2. Petit Pluvier à collier.





Illustration of a crane or heron standing in a field.



2. *Pluvier à collier de S. Dominique*.






Fig. 1.


Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Echelle de 3. pouces pour la 2^e Figure.

1. Pluvier doré de S. Domingue.

2. Pluvier à collier de S. Domingue.





2. Pluvier armé du Sénégal.






Fig. 1.

Fig. 2.


Echelle de 6. Pices.

Designé et Gravé par Martinet.

1. Grand Pluvier ou Courby de terre.

2. Pluvier armé du Sénégal.





ORDO XVII. ORDRE XVII.

A V E S

LES OISEAUX

Digitis quatuor, membranis destitutis, tribus scilicet anticis, uno postico: cruribus in parte inferiore plumis denudatis: alisque sat magnis, & volatui idoneis præditæ.

Qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière: la partie inférieure des jambes dénuée de plumes: & les ailes assez grandes, & propres pour le vol.

INTER hujus Ordinis Aves aliæ rostro donantur recto, apice crassiori: aliæ rostro subrecto, fursùm modicè tendente, & horizontaliter paululùm compresso: aliæ rostro superne convexo, & apice lateraliter compresso: aliæ rostro recto, lateraliter compresso: aliæ rostro gracili: aliæ rostro deorsum arcuato: aliæ rostro recto, horizontaliter plano; apice ampliato, subrotundo, spatuliformi: aliæ rostro crasso & longo: aliæ rostro crasso, brevi; mandibulâ superiore cochleariformi, apice unguiculatâ: aliæ rostro brevi, recto, apice conico: aliæ

PARMI les Oiseaux de cet Ordre les uns ont le bec droit & renflé vers le bout: d'autres ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement: d'autres ont le bec convexe en-dessus, & comprimé par les côtés vers le bout: d'autres ont le bec droit, & comprimé par les côtés: d'autres ont le bec menu: d'autres ont le bec courbé en arc en en-bas: d'autres ont le bec droit, plat horizontalement; & son bout plus large & arrondi en forme de spatule: d'autres ont le bec gros & long: d'autres ont le bec gros, court; la mandibule supérieure ayant la forme d'une cuillière,

& étant onguiculée à son bout : d'autres ont le bec court , droit & conique vers le bout : d'autres ont le bec en cône courbé : d'autres enfin ont le bec en cône applati par les cotés. Je divise les Oiseaux de cet Ordre en douze sections : dans la première sont ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout , comme le *Vanneau* , le *Jacana* : dans la seconde ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit , & un peu comprimé horizontalement , comme le *Coulon-chaud* : dans la troisième ceux qui ont le bec convexe en - dessus , & comprimé par les côtés vers le bout , comme la *Perdrix-dermer* : dans la quatrième ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés ; tous ceux-là ont le corps applati par les côtés , comme le *Rale* : dans la cinquième ceux qui ont le bec menu , comme le *Beccafseau* , la *Barge* , la *Beccasse* : dans la sixième ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas , comme le *Courly* : dans la septième ceux qui ont le bec droit , plat horizontalement , & son bout plus large & arrondi en forme de spatule , comme la *Spatule* : dans la huitième ceux qui ont le bec gros & long , comme la *Cigogne* ,

rostro conico-incurvo : aliam tandem rostro conico , lateraliter compresso. Hujus Ordinis Aves in duodecim sectiones dividuntur : prima continet eas quæ rostro donantur recto , apice crassiori , ut *Vanellus* , *Jacana* : secunda eas quæ rostrum habent subrectum , sursum modicè tendens , & horizontaliter paululum compressum , ut *Arenaria* : tertia illas quæ rostrum habent superne convexum , apice lateraliter compressum , ut *Glareola* : quarta eas quæ rostrum habent rectum , lateraliter compressum ; quæ omnes corpore donantur quoque lateraliter compresso , ut *Rallus* : quinta illas quæ rostrum habent gracile , ut *Tringa* , *Limosa* , *Scolopax* : sexta illas quæ rostrum habent deorsum arcuatum , ut *Numenius* : septima eas quæ rostrum habent rectum , horizontaliter planum ; ipsius apice ampliato , subrotundo , spathæformi , ut *Platya* : octava illas quæ rostro donantur crasso & longo , ut *Ciconia* , *Ardea* , *Scopus* : nona eas quæ rostrum habent crassum & breve ; ipsius mandibulâ superiore cochleariformi , apice unguiculatâ ,

ut *Cochlearius* : decima illas quæ rostrum habent breve & rectum ; ipsius apice conico ; istæ autem in capite ornantur corollâ plumis , Graminis radicum æmulis , conflatâ , ut *Balearica* : undecima eas quæ rostrum habent conico-incurvum ; ut *Cariama* , *Anhima* : duodecima tandem illas quæ rostro donantur conico , lateraliter compresso ; quæ omnes calvitio in fronte præditæ sunt , ut *Porphyrio*.

le *Héron* , l'*Ombrette* : dans la neuvième ceux qui ont le bec gros. & court ; la mandibule supérieure en forme de cuillière , & onguiculée à son bout , comme la *Cuillière* : dans la dixième ceux qui ont le bec court , droit & conique vers le bout ; ceux-là ont la tête ornée d'une hupe composée de plumes ressemblantes à des racines de Chiendent ; comme l'*Oiseau-royal* : dans l'onzième ceux qui ont le bec en cône courbé , comme le *Cariama* , le *Kamichy* : & enfin dans la douzième ceux qui ont le bec en cône aplati par les côtés ; tous ceux-là ont le front chauve , comme la *Poule-sultane*.

SECTIO I.

SECTION I.

Eæ quæ rostrum habent rectum , in apice crassius.

Ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout.

SECTIO ista duobus constat generibus Avium , unguiculorum longitudine à se invicem discrepantium. Aliæ enim unguiculis donantur brevissimis , ut *Vanellus* : aliæ unguiculis gaudent longissimis , ut *Jacana*.

CETTE section contient deux genres d'Oiseaux , qui se distinguent entr'eux par la longueur de leurs ongles. Les uns ont les ongles très-courts , comme le *Vanneau* : les autres ont les ongles très-longs , comme le *Jacana*.

Le genre du Vanneau.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts dénués de mem-
 branes ; trois devant , un
 derrière :
 La partie inférieure des jambes
 dénuée de plumes :
 Le bec droit & renflé vers le
 bout :
 Les ongles très-courts.

Genus Vanelli.

Hujus character est
 Digiti quatuor , membranis
 destituti ; tres scilicet an-
 tici , posticus unus :
 Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata :
 Rostrum rectum , in apice
 crassius :
 Unguiculi brevissimi.

** I. LE VANNEAU.

Voyez Pl. VIII. Fig. 1.

Vanellus cristatus, superne viridi-aureus, infernè albus; ca-
 pite superiore nigro-viridante; cristâ nigrâ; taniâ infra
 oculos nigricante; gutture albo; collo inferiore nigro-
 viridante, pennis in apice albo fimbriatis; reëtricibus de-
 cem intermediis primâ medietate candidis, alterâ nigris,
 apice albido marginatis, utrinque extima candida, ma-
 culâ nigrâ interiùs insignita . . . VANELLUS.

Vanellus torquatus, pectore albo, dorso & alis virescentibus. *Barr.*
Ornith. Class. IV. Gen VI.

Vanellus. Gesn. Avi. pag. 763. hujus icon satis accurata pag. 764.

Schwenok. Avi. Sil. pag. 365.

*Jonst. Avi. pag. 113. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53 ;
 & insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. XXVII, sub titulo,
 Capella.*

Charlet. Exer. pag. 113. N°. XIII.

Charlet. Onomazt. pag. 108. N°. XIII.

Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 4.

Moehr. Avi. Gen. 92.

Vanellus Alberto magno; Pavo agrestis Gesnero, & Bellonio. *Rzac.*
Hist. nat. Pol. pag. 296.

Vanellus Aldrovandi; *Gavia cinerea* Eberi & Peuceri; *Capella Gazæ*;
Pavo agrestis Gesneri. Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 425.

- Capella. *Charlet. Exer. pag. 113.*
Charlet. Onomazt. pag. 109.
- Capella Avis. *Gesn. Avi. pag. 109.*
- Capella, feu Vanellus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 523. hujus icon satis accurata pag. 526.*
Willugh. Ornith. pag. 228. hujus icon satis accurata Tab. LVII.
Raj. Syn. Avi. pag. 110. N^o. A. 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
- Capella, feu Capra. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 273.*
- Capra. *Gesn. Avi. pag. 240.*
- Capra vel Capella. *Gesn. icon. Avi. pag. 99, in qua hujus icon satis accurata.*
- Tringa cristâ dependente, pectore nigro. *Faun. Suec. Linn. N^o. 148.*
- Tringa pedibus rubris, cristâ dependente, pectore nigro. *Vanellus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 2.*
- Gavia vulgaris. *Klein. Avi. pag. 19. N^o. 1.*
- Parcus; Parra Plinii. *Schwenck.*
- Kyvitta, *Schwenckfeldii.*
- Dixhuit Gallorum. *Bell. Obs. pag. 17.*
- Vanneau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 209; avec une figure très-peu exacte pag. 210.*
- Vaneau, nommé par aucuns Dixhuit, & par d'autres Papechieu. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 47 a, dans laquelle est la même figure.*
- Vaneau. *Alb. Tom. I. pag. 65; avec une figure mal coloriée Pl. 74.*
- Les Grecs l'appellent A'iz. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Bell. Jonst. Charlet. Ταὶς ἀγριοί. Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck.*
- Les Turcs, GULGURUK. *Gesn. Aldrov.*
- Les Portugais, BYBE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Catalans, PIGRA. *Barr.*
- Les Italiens, PAONCELLO; PAONCHELLO. *Bel. Gesn. PAONZELLO. Aldrov.*
- Les Italiens aux environs de Padouë, PAVONZINO. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Vénitiens, PAON. *Gesn. Aldrov.*
- Les Boulonnois, FILIGETTA. *Aldrov.*
- Les Allemands, GYVIIT; GYBYTZ; ZWEIFEL; KYUUTZ. *Gesn. Aldrov. PIWIP. Charlet. KUVITZ. Gesn. KIWIT; HIMMEL-ZIEGE. Rzac. GRUNER; BLAW-GRUNER. Aldrov.*
- Les Suisses, GYFITZ. *Gesn. Aldrov. Schwenck. GYBITZ; GYWITT. Schwenck. KIBITZ. Rzac.*
- Les Hollandois, KIVIBIE. *Aldrov.*
- Les Illyriens, CZLEYKA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Polonois, CZAYKA; KOZIELEK; BARANEK. *Rzac.*
- Les Suédois, WIPA; KOWIPA. *Linn.*
- Les Anglois, LAP-WING. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. & quelques-uns, LAP-WING PLOVER. Alb. BASTARD PLOVER. Willugh.*

Raj. Charlet. Sibbald.
Les Anglois Septentrionaux, TEWIT. Raj.

Il est à peu près de la grosseur d'un Pigeon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de douze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue quatre pouces cinq lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, six lignes & demie; son pied un pouce neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière seulement trois lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds quatre pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir qui a un certain lustre de verd. De l'occiput sortent des plumes noires très-longues & étroites, qui forment une jolie hupe: quelques-unes de ces plumes ont jusqu'à trois

Columbam crassitie circum æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duodecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguës undecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & quinque lineas; pars crurum plumis nudata sex cum semi lineas; pes unum pollicem & novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; posticus autem tres tantum cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & quatuor pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertinent. Capitis superior pars nigra est cum aliquo virore mixta. Ab occipite pennæ oriuntur nigræ, longissimæ, strictæ,

strictæ, elegantem cristam efficientes : ex istis autem pennis quædam trium pollicum & totidem linearum longitudinem obtinent. Caput ad latera tingit color albo-rufescens : quem colorem supra oculos & versùs occipitium variegant lineolæ longitudinales nigricantes. In utraque gena majuscula extat macula nigricans, à qua tænia oritur concolor, infra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Pars colli superior est cinerea, aliquâ viriditate perlustrata. Dorsum & uropygium tingit elegans virid-aureus color. Pennæ scapulares concolores ; plerarumque tamen minorum extremitates elegantissimo cupri puri colore perlustrantur, majores verò sunt in apice albido marginatæ. Guttur albicat. Collum inferius ad pectus usque nigro imbutur colore, cum aliquo virore mixto, plerisque pennis in apice albo marginatis. Pectus, venter, latera & crurum suprema pars albicant. Pennæ caudam superne cooperientes sunt spadiceæ : quæ eam infernè obtegunt, eodem imbutæ colore, sed dilutiore, & quælibet penna

pouces trois lignes de long. Les côtés de la tête sont d'un blanc-rouffâtre : cette couleur est variée au-dessus des yeux & vers l'occiput de petites lignes longitudinales noirâtres. Sur chaque joue est une grande tache noirâtre, de laquelle part une bande de la même couleur, qui passe par-dessous les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La partie supérieure du col est d'un cendré orné d'un certain lustre de verd. Le dos & le croupion sont d'un beau verd doré. Les plumes scapulaires sont de la même couleur ; mais l'extrémité de la plûpart des petites est d'une belle couleur de cuivre de rosette ; & les grandes sont bordées de blanchâtre par le bout. La gorge est blanche. La partie inférieure du col jusqu'à la poitrine est d'un noir orné d'un certain lustre de verd, la plûpart des plumes étant terminées par une petite bordure blanche. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un rouge - bai : celles du dessous sont de la même couleur, mais plus claire, & chaque plume est bordée de blanchâtre par le bout. Les couvertures du dessous des aîles les plus proches du corps

font blanches : les plus éloignées du corps font noires. Les petites & les moyennes ouvertures du dessus des ailes font d'un noir-vert, changeant en violet sombre : les grandes les plus proches du corps font du même verd-doré que le dos, & plusieurs font bordées de blanchâtre par le bout : enfin les grandes les plus éloignées du corps, ainsi que l'aile bâtarde, font d'un beau noir. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les quatre premières font noires & terminées de gris-blanc, cette couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : les six suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la dixième inclusivement, font entièrement noires : les douze qui suivent, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-deuxième inclusivement, font blanches à leur origine, & noires dans le reste de leur longueur, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps : les cinq plus proches du corps ont aussi un peu de blanc à leur origine ; le reste de leur longueur est d'un verd-doré en-dessus & cendré en-dessous. Ces dernières font longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est

in apice albedo marginatur. Tectrices alarum inferiores corpori viciniores sunt candidæ, à corpore remotiores nigra. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ nigro-viridantes, violaceo obscuro variantes : majores corpori finitimæ eodem imbuuntur viridi-aureo ac dorsum ipsum tingitur, & ex istis plures albedo in apice marginantur : majores tandem à corpore remotiores, sicut & ala notha, sunt splendide nigra. Viginti septem remigibus ala conflatur : quatuor primores nigra, cinereo-albo terminata, qui cinereo-albus color eò majus spatium occupat, quo remix fit exterior : sex quæ sequuntur, à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè, penitus nigra : duodecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam secundam usque inclusivè, in exortu albæ, in reliqua longitudine nigra, albedine eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : quinque corpori finitimæ sunt quoque in exortu candidæ, in reliqua longitudine superne viridi-aureæ, infernè cineræ. Quæ novissimè dictæ longæ sunt & acu-

ta, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Tertia & quarta reliquas omnes longitudine superant. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum decem intermediæ ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, in reliqua longitudine splendè nigræ, apice albido marginatæ: utrinque extrema per totam longitudinem candida, attamen in latere interiore majusculâ maculâ nigrâ versùs ipsius extremitatem insignita. Oculorum irides avellanæ. Rostrum, unguis que nigri. Pars crurum plumis denudata & pedesusco-rubescentes.

Fœmina à mare differt magnitudine quâ ei paulò cedit, & coloribus in parte corporis superiore non ita vividis. Ab illo quoque discrepat cristâ multò breviori. In reliquis cum illo perfectè convenit.

Insectis victitant. In campestribus locis & juxta aquas degunt. *Ex museo Reaumuriano.*

pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La troisième & la quatrième sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes: les dix du milieu sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, le reste est d'un noir brillant, & bordé de blanchâtre par le bout: la plus extérieure de chaque côté est blanche dans toute sa longueur, excepté une grande tache noire qu'elle a sur le côté intérieur vers son extrémité. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec & les ongles sont noirs. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont d'un brun-rougâtre.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle est un peu plus petite, & que les couleurs du dessus de son corps sont moins vives. Elle en diffère encore en ce que sa huppe est beaucoup plus courte. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

Ils se nourrissent d'*Insectes*. On les trouve dans les champs & sur les bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE VANNEAU GRIS.

Voyez Pl. IX. Fig. 1.

Vanellus superne griseo-fuscus, marginibus pennarum albidis, infernè albo & fusco-nigricante varius; gutture & imo ventre albis; reëtricibus candidis, fusco transversim striatis . . .
VANELLUS GRISEUS.

Pardalus. *Gesn. Avi. pag. 639.*

Pardalus secundus. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 316.*

Pluvialis cinerea, seu Pardalus Aristotelis. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 533. hujus icon non satis accurata pag. 534.*

Pluvialis cinerea. *Jonst. Avi. pag. 114. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53.*

Raj. Syn. Avi. pag. III. N^o. A. 3.

Charlet. Exer. pag. 113. N^o. 1.

Charlet. Onomazt. pag. 109. N^o. 1.

Rzac. Aud. Hist. nat. Pol. pag. 415.

Pluvialis cinerea flavescens. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.*

Pluvialis cinerea, Squatarola Venetiis dicta. *Willugh. Ornith. pag. 229. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVII.*

Marfil. Danub. Tom. V. pag. 56. hujus icon non satis accurata Tab. 26. (rostrum longius).

Pluvialis totus cinereus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. VII. sp. 2.*

Gavia, s. Pluvialis cinerea. *Klein. Avi. pag. 20. N^o. 3.*

Tringa nigro-fusca, subtus alba, rostro nigro, pedibus virescentibus; *Faun. Suec. Linn. N^o. 155.*

Tringa Augusti mensis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 11.*

Tringa rostro nigro, pedibus virescentibus, corpore griseo, subtus albedo. Squatarola. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 13.*

Numenius pullus subtus albidus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.*

Vanellus fuscus: Kyvitta fusca. Merula novalium. *Schwenckfeldii.*

Pluvier gris. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 262; avec une mauvaise figure pag. 263.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 63 b, dans laquelle est la même figure.

Alb. Tom. I. pag. 67; avec une figure mal coloriée Pl. 76.

Les Grecs l'appellent Πάρδαλος. *Gesn. Aldrov.*

Les Boulonnois, PIVIER MONTANO. *Aldrov.*

Les Vénitiens, SQUATAROLA. *Willugh. Sibbald. Marfil. Klein.*

Les Allemands, GRAVER KEUWIT. *Rzac. GRAWER GYFITZ; GROSSER*

BRACH-VOGEL; BRACH AMSEL. *Schwenck.*

Les Polonois, PTAK DESSZOWY POPIELATY. *Rzac.*

Les Anglois, GREY PLOVER. *Willugh. Raj. Charlet. Alb. Browne.* STONE-PLOVER. *Charlet.*

Les Anglois de la Jamaïque, WAG-TAIL. *Browne.*

Crassitie Pluvialem auream circiter æmulatur. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri
ad caudæ extremitatem de-
cem pollices & sex lineas
æquat, & ad extremos un-
gues undecim pollices & li-
neas binas. Rostrum ab ipsius
apice ad oris angulos quin-
decim lineas longum est;
cauda duos pollices cum de-
cem lineis; pars crurum plu-
mis denudata decem cum
femi lineas; pes unum pol-
licem & sex lineas; trium
digitorum anticorum medius
cum ungue tredecim cum
femi lineas, extimus unde-
cim cum femi lineas, inti-
mus decem lineas; posticus
autem solummodo sesquili-
neam. Trium digitorum an-
ticorum medius cum extimo
digito connectitur membra-
nulâ ad primum usque arti-
culum extensâ. Alis expan-
sis, extremitates majorum
remigum unius pedis & de-
cem pollicum intervallo dif-
tant, alæ verò complicatæ
ad quatuor usque lineas ultra
caudam extremam proten-
duntur. Caput, partem colli

Il est à peu près de la gros-
seur du *Pluvier doré*. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est
de dix pouces six lignes, & jus-
qu'à celui des ongles d'onze
pouces deux lignes. Son bec
depuis sa pointe jusqu'aux coins
de la bouche a quinze lignes
de long; sa queue deux pouces
dix lignes; la partie de ses
jambes qui est dégarnie de plu-
mes, dix lignes & demie; son
pied un pouce six lignes; celui
du milieu des trois doigts an-
térieurs, joint avec l'ongle,
treize lignes & demie, l'exté-
rieur onze lignes & demie,
l'intérieur dix lignes; & celui
de derrière une ligne & demie
seulement. Celui du milieu des
trois doigts antérieurs est réuni
avec le doigt extérieur par une
petite membrane, qui s'étend
jusqu'à la première articulation.
Il a un pied dix pouces de vol;
& ses aîles, lorsqu'elles sont
pliées, s'étendent jusqu'à qua-
tre lignes au-delà du bout de
la queue. La tête, la partie
supérieure du col, le dos & le
croupion sont couverts de plu-
mes d'un gris-brun, bordées de

blanchâtre. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge est blanche. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont variés de blanc & de brun-noirâtre. Le bas-ventre & le haut des jambes sont tout-à-fait blancs, ainsi que les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, & marquées sur leurs bords de taches blanches : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanc par le bout. L'aile bâtarde est d'un brun foncé. Les plumes de l'aile (excepté les trois plus proches du corps) sont d'un brun-noirâtre d'autant moins foncé, que la plume est plus proche du corps, & ont depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche : toutes, excepté les deux premières, sont de plus marquées d'une petite tache blanche, placée auprès de leur tige sur le côté extérieur vers les deux tiers de

superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ griseo-fuscæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares & superiores caudæ teatrices concolores. Guttur albicat. Pars colli inferior, pectus, venter supremus & latera albo & fusco-nigricante variegantur. Venter imus, crurum suprema pars, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes penitus albescent. Teatrices alarum superiores minores sunt pennis dorsum vestientibus concolores : majores corpori finitimæ griseo-fuscæ, maculis candidis supra ipsarum margines insignitæ : majores tandem à corpore remotiores fusco-nigricantes, albo in apice marginatæ. Ala notha est saturatè fusca. Alarum remiges (tribus corpori vicinioribus exceptis) tingit color fusco-nigricans eò minus saturatus, quò remix sit corpori finitima; attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque sunt in latere interiore maximâ parte candidæ : omnes insuper, duabus primis exceptis, minutâ insigniuntur maculâ candidâ, prope scapum in latere exteriori versùs duas tertias lon-

gitudinis partes positâ : tres remiges corpori viciniore sunt per totam longitudinem griseo - fuscæ. Quæ tres novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ , & dum ala complicatur , majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ , fusco transversim striatæ : laterales autem in latere interiore eò minùs insigniuntur tæniis fuscis , quò exteriore fiunt ; & utrinque extrema unicâ tantùm tæniâ fuscâ in latere exteriore notatur. Rostrum , pars crurum plumis denudata , pedes , unguisque nigricant. Juxta maris littora degit. *Ex musæo Realmuriano.*

leur longueur : les trois plumes les plus proches du corps sont d'un gris-brun dans toute leur longueur. Ces trois dernières plumes sont longues & pointues , & s'étendent , lorsque l'aîle est pliée , presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches , rayées transversalement de brun : les latérales ont du côté intérieur d'autant moins de bandes brunes , qu'elles sont plus extérieures ; & la plus extérieure de chaque côté n'a même qu'une de ces bandes sur son côté extérieur. Le bec , la partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. LE VANNEAU VARIÉ.

Voyez Pl. IX. Fig. 2.

Vanellus superne fuscus , albido variegatus , infernè albus ; collo inferiore maculis longitudinalibus griseo-fuscis vario ; rectricibus decem intermediis albis , fusco transversim striatis , utrinque extrema alba , tæniâ longitudinali fuscâ exteriùs notata VANELLUS VARIUS.

Pardali Bellonii congener. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 530 , in qua hujus icon non satis accurata.*

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Ipsius lon-

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur de-

puis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces onze lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, dix lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes, l'intérieur dix lignes; & celui de derrière une ligne & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied onze pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un brun varié de blanchâtre, de façon que chaque plume est brune, marquée sur ses bords de petites taches rondes blanchâtres, & bordée de la même couleur par le bout. Celles qui couvrent le croupion sont pareillement brunes, bordées & variées de même de taches, mais

ginitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos unguis undecim pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim lineas, intimus decem lineas; posticus autem sesquilineam tantum. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, pars colli superior, dorsum & scapulares pennæ sunt fuscæ, albido variegatæ; ita ut unaquæque penna sit fusca, supra margines minutis maculis rotundis albidis insignita, & eodem colore in apice marginata. Quæ uropygium obtegunt, sunt quoque fuscæ, marginibus

marginibus & maculis, non quidem albidis, sed flavicantibus, similiter præditæ. Superiores caudæ tectrices albicant, paucoque griseo & flavicante ad apicem variegantur. Guttur candidum. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem griseo-fuscæ, & ad margines candidæ. Pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, sunt peninis dorsum vestientibus concolores: majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Ala nottha nigricat. Remiges alarum majores sunt quoque nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versus tres quartas longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ; ex istis quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt insuper albo in apice marginatæ: proximè sequentes in latere interiore albæ, in latere exteriori griseo-fuscæ, albo fimbriatæ: sex corpori finitimæ fuscæ, maculis

qui, au lieu d'être blanchâtres; sont jaunâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & variées à leur bout d'un peu de gris & de jaunâtre. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-brun dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanches sur leurs bords. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. L'aîle bâtarde est noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur, & ont depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont de plus bordées de blanc par le bout: les suivantes sont blanches du côté intérieur, d'un gris-brun & bordées de blanc du côté extérieur: les six plus proches du corps

font brunes, & variées sur leurs bords de taches blanchâtres. Ces dernières sont longues & pointues, & lorsque l'aile est pliée, il ne s'en faut que de quinze lignes qu'elles ne s'étendent aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont blanches, & rayées transversalement de brun ; le blanc tire un peu sur le jaunâtre sur les deux plumes du milieu & sur le côté extérieur des latérales : ces dernières ont du côté intérieur d'autant moins de bandes brunes, qu'elles sont plus extérieures : la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée seulement sur son côté extérieur d'une bande longitudinale brune. Le bec, la partie des jambes qui est dépourvue de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

candicantibus ad margines variegata. Quæ nuper descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates, exceptâ tantùm quindecim linearum distantia, pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem excedit. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum decem intermediæ albæ, fusco transversim striatæ ; quæ albedo in rectricibus binis intermediis & in lateralium exteriori latere ad flavicantem colorem paululùm inclinat : laterales autem eò minùs interiùs insigniuntur tæniis fuscis, quò exteriores fiunt : utrinque extrema alba, tæniâ tantùm longitudinali fuscâ in latere exteriori notata. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

** 4. LE VANNEAU DE SUISSE.

Voyez Pl. X. Fig. 1.

Vanellus nigricans, superne maculis transversis albis varius ; sincipite albido ; capite & collo superioribus fuscis, marginibus pennarum allidis ; imo ventre albo ; rectricibus candidis, fusco-nigricante transversim striatis, utrinque

extimâ interiùs penitùs candidâ . . . VANELLUS
HELVETICUS.

Cum *Vanello nostrate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis undecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas; extremus undecim cum semi lineas, intimus decem cum semi lineas; posticus autem solummodo sesquilineam. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & decem pollicum; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Synciput candidat. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ fuscæ, candidante marginatæ: versùs colli latera procedendo, pennæ ferè

Il est à peu près de la grosseur du nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derrière une ligne & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est blanchâtre. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes brunes, bordées de blanchâtre: en approchant des côtés du col les plumes sont presque entièrement blanches, & sont seule-

ment marquées dans leur milieu d'une petite tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont noirâtres, & marquées sur les deux côtés de taches transversales blanches. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont grises, & marquées de même sur les deux côtés de taches transversales blanches. Les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés sont noirâtres : cependant les côtés de la poitrine sont variés d'un peu de blanc. Le bas-ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Celles du dessous des ailes sont pareillement blanches, si l'on en excepte les grandes les plus proches du corps, qui sont noirâtres. Les plus petites couvertures du dessous des ailes sont brunes & bordées de blanc : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, & marquées des deux côtés de grandes taches blanches : les grandes les plus éloig-

penitùs albicant, & in ipsarum medio minutâ tantùm notantur maculâ fuscâ, secundùm scapi longitudinem ductâ. Quæ partem dorsi supremam obtegunt, sicut & scapulares, sunt nigricantes; in utroque latere maculis transversis albis insignitæ. Quæ verò dorsum infimum & uropygium cooperiunt, sunt griseæ, & in utroque latere maculis transversis albis similiter notatæ. Caput ad latera, idque infra oculos, guttur, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter supremus & latera nigricant: pectus tamen ad latera paucò variegatur candido. Venter imus & crurum suprema pars albicant. Pennæ caudam superne & infernè tegentes eodem candore nitent. Inferiores alarum tectrices sunt similiter candidæ, exceptis tamen majoribus corpori finitimis nigricantibus. Tectrices alarum superiores minimæ fuscæ, albo fimbriatæ: mediæ, sicut & majores corpori viciniore, fuscæ, in utroque latere majusculis maculis albis notatæ: majores à corpore remotiores fusco-nigricantes, albido in apice marginatæ. Alam componunt viginti sep-

remigés : decem primores sunt fusco-nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidâ ; ex istis quinque primores scapo donantur à tribus circiter quartis ipsarum longitudinis partibus versùs extremitatem usque candido ; reliquæ quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, eodem in loco maculâ insigniuntur candidâ, in latere exteriorè collocatâ ; quæ macula eò major est, quò remix fit corpori vicinior : undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, fuscæ, in latere exteriorè & apice albo marginatæ, & insuper in latere interiore maximâ parte candidæ : sex tandem corpori finitimæ fuscæ, in utroque latere majusculis maculis transversis sordidè albis insignitæ. Quæ novissimè dictæ remigés longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat reatricibus candidis : binæ intermedix à quarta circiter longitudinis parte ad ipsa-

nées du corps sont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanche par le bout. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les dix premières sont d'un brun-noirâtre, & ont depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche ; de celles-là les cinq premières ont leur tige blanche depuis environ les trois quarts de leur longueur jusque vers leur bout ; les cinq autres, savoir depuis la sixième jusqu'à la dixième inclusivement, sont marquées dans le même endroit d'une tache blanche, placée sur leur côté extérieur, & qui est d'autant plus grande, que la plume est plus proche du corps : les onze suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont brunes, & bordées de blanc extérieurement & par le bout ; elles ont de plus la plus grande partie de leur côté intérieur blanche : enfin les six plus proches du corps sont brunes, & marquées sur les deux côtés de grandes taches transversales d'un blanc sale. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est

composée de douze plumes blanches : les deux du milieu sont rayées transversalement de brun-noirâtre depuis environ le quart de leur longueur jusqu'à leur extrémité : les latérales sont rayées de même du côté extérieur ; mais leur côté intérieur n'est marqué de ces bandes transversales que vers le bout de la plume : de plus chacune de ces plumes a d'autant moins de bandes transversales, qu'elle est plus extérieure ; de sorte que la plus extérieure de chaque côté n'en a que deux du côté extérieur, & point du tout du côté intérieur : celle qui la suit immédiatement, en a trois du côté extérieur, & une seulement du côté intérieur ; & ainsi des suivantes. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en Suisse, d'où il a été envoyé à M. de Reaumur par M. Gannebin.

rum extremitatem usque sunt fusco-nigricante transversim striata : laterales in latere exteriori similiter striata, in latere autem interiore tæniis istis transversis versus ipsarum extremitatem tantum notata : rectrices vero laterales eò minus tæniis insigniuntur transversis, quò exteriores fiunt ; ita ut utrinque extrema in latere exteriori binis tantum sit notata tæniis, in interiore nullâ : proximè sequens in latere exteriori tribus, in interiore unicâ tantum tæniâ notetur ; & sic de cæteris. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in Helvetia, unde in museum Reaumurianum missus à D. Gannebin.

5. LE GRAND VANNEAU DE BOLOGNE.

Vanellus superne niger, infernè candicans ; capite & collo superiore castaneis ; collo inferiore & pectore maculis ferrugineis vario ; reatricibus nigris . . . VANELLUS BONONIENSIS MAJOR.

Ginocchiella vulgò. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 538. hujus icon minimè accurata pag. 539.

Les Boulannois l'appellent GINOCCHIELLA. Aldrov.

Magnitudine & crassitie *Vanellum nostratem* multum antecellit. Caput & collum superius castaneo imbuuntur colore. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ rectrices sunt nigræ. Guttur, collum inferius & pectus candicant, & maculis variegantur ferrugineis. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ rectrices candicant quidem, sed maculis destituuntur. Remiges sunt nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum in exortu flavicans, in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque ex flavo ad ochræ colorem vergentes; ungues verò nigri. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

Il est beaucoup plus grand & plus gros que notre *Vanneau*. La tête & la partie supérieure du col sont de couleur de marron. Le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont blanchâtres, & variées de taches ferrugineuses. Le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres & sans taches. Les plumes de l'aile sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est jaunâtre à son origine, & noir à son bout. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune tirant sur la couleur d'ochre, & les ongles sont noirs. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

** 6. LE VANNEAU ARMÉ DU SÉNÉGAL.

Voyez Pl. X. Fig. 2.

Vanellus griseo-fuscus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; syncipite candido; gutture nigro; imo ventre sordidè albo; rectricibus primâ medietate sordidè albis, alterâ nigris, sordidè albo-rufescente terminatis; membranâ utrinque rostrum inter & oculum luteâ, deorsum dependente; alis armatis . . . VANELLUS SENEGALENSIS ARMATUS.

Il est à peu près de la grosseur de notre *Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue trois pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière deux lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quinze lignes au-delà du bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un beau jaune, longue d'onze lignes sur quatre de largeur, qui n'est attachée à la tête que par un de ses côtés, & qui pend en en-bas, en se terminant en pointe. Le

Cum *Vanello nostrate* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem æquat, & ad extremos unguis quatuordecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda tres pollices & lineas binas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas, extremus duodecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posticus autem binas solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & trium pollicum; alæ verò complicatæ ad quindecim usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculus, membrana extat gracilis, eleganter lutea, undecim li-
neas

neus longa, quatuor lata, in uno tantum latere capiti adnexa, deorsum dependens, & in acumen desinens. Synciput tingit candidus color. Guttur nigrum est. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fuscæ. Pars colli inferior, pectus, venter supremus, latera & crurum pars suprema eodem imbuuntur colore, sed multò dilutiore. Venter imus, tectrices caudæ superiores & inferiores, pennæ alas subtus obtegentes & superiores alarum tectrices majores corpori finitimæ sordidè albicant: majores à corpore remotiores sunt nigræ. Viginti octo remigibus ala conflatur: decem primores nigræ, attamen in latere interiore versus ipsarum exortum tantum sordidè albæ: decem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in exortu sordidè albæ, versus extremitatem nigræ; sordidè albus autem color eò majus spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior: vigesima prima grisea, nigricante terminata: reliquæ omnes

synciput est blanc. La gorge est noire. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés sont de la même couleur, mais beaucoup plus claire. Le bas-ventre, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les grandes du dessus les plus proches du corps sont d'un blanc sale: les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aile est composée de vingt-huit plumes: les dix premières sont noires, excepté leur côté intérieur qui est d'un blanc sale vers l'origine de la plume seulement: les dix suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un blanc sale à leur origine, & noires vers le bout; le blanc sale s'étend d'autant plus loin que la plume est plus proche du corps: la vingtunième est grise & terminée de noirâtre: toutes les autres sont d'un gris-brun d'autant plus foncé, que la plume est plus proche du corps. De ces dernières les plus proches du corps sont longues & pointues;

& s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un blanc sale depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est noir, & terminé de blanc sale & rouffâtre. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron long de deux lignes & demie, & qui se termine en une pointe très-aiguë: il est noir & d'une substance pareille à de la corne. Le bec est d'un verd-jaunâtre, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

gricant. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Adanson*.

** 7. LE VANNEAU ARMÉ DE LA LOUISIANE.

Voyez *Pl. VIII. Fig. 2.*

Vanellus superne griseo-fuscus, infernè albo-fulvescens; capite superiore nigro; rectricibus albo-fulvescentibus, nigro terminatis, albo-fulvescente in apice marginatis; membranâ utrinque rostrum inter & oculum luteo-aurantiâ;

colore imbutæ griseo-fuscò eò saturatiore, quò remix fit corpori finitima. Ex istis novissimè dictis corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque sordidè albæ, in reliqua longitudine nigra, sordidè albo-rufescente terminatæ. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpò humano respondentem, calcar extat binas cum semî lineas longum, in aciem acutissimum desinens, nigrum, substantiæ cornæ æmulum. Rostrum viridi-flavicans, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata & pedes sunt quoque viridiflavicantes; ungues verò nigricantes.

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis tredecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum quinque lineis; pes duos pollices & novem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posticus autem binas tantum cum semi lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In utroque capitis latere, ros-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; sa queue trois pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, un pouce cinq lignes; son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière deux lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds quatre pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un jaune-orangé, longue de quatorze lignes sur

onze de largeur , dont une partie s'étend au-dessus des yeux , tandis que l'autre pend en enbas , en se terminant en pointe. Le dessus de la tête est noir. La partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , les côtés , le haut des jambes , les couvertures du dessous des ailes , celles du dessous de la queue & les grandes du dessus sont d'un blanc tirant un peu sur le fauve. Les petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est d'un gris-brun. L'aîle est composée de vingt-six plumes : les trois premières sont noires , & terminées de gris - brun foncé , cette couleur occupant d'autant plus d'espace , que la plume est plus extérieure : les sept suivantes , sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la dixième inclusivement , sont tout-à-fait noires : les onze qui suivent , sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-unième inclusivement , sont grises à leur origine , &

trum inter & oculum , membrana extat gracilis , luteo-aurantia , quatuordecim lineas longa , undecim lata ; cujus pars una supra oculum protenditur , dum altera deorsum dependet , & in acumen desinit. Caput superius tingit color niger. Pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , tectricesque caudæ superiores minores sunt griseofuscæ. Guttur , collum inferius , pectus , venter , latera ; crurum suprema pars , pennæ alas subtus obtegentes ; & tectrices caudæ inferiores , sicut & superiores majores ex albo nonnihil ad fulvum vergunt. Superiores alarum tectrices , sicut & majores corpori finitimæ ; eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt nigræ. Ala notha griseofusca. Alam componunt viginti sex remiges : tres primores sunt nigræ , griseofusco saturato terminatæ , qui color griseofuscus eò majus spatium occupat , quò remix exterior fit : septem proximè sequentes , à quarta scilicet ad decimam usque inclusivè , penitus nigræ : undecim quæ sequuntur , ab

undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt in exortu griseæ, nigro terminatæ, colore griseo eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior; ita ut undecima sit solummodo in exortu grisea, in reliqua verò longitudine nigra; in sequentibus autem color niger sensim atque sensim minus spatium occupat, ita ut vigesima prima sit tantum in extremitate nigra: quinque corpori finitimæ sunt dorso concolores. Quinque istæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Ex remigibus tertia & quarta sunt omnium longissimæ. Cauda duodecim constat rectricibus ex albo nonnihil ad fulvescentem vergentibus colorem, nigro terminatis, & albo-fulvescente in apice marginatis. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat quatuor cum semi lineas longum, in basi duarum cum semi linearum lätitudinem obtinens, in aciem acutissimum desinens, flavum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum aurantio

terminées de noir, le gris occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que l'onzième n'a de gris qu'à son origine, & est noire dans tout le reste de sa longueur; ensuite le noir diminue peu à peu dans les suivantes, de façon que la vingtunième n'a de noir qu'à son extrémité: les cinq plus proches du corps sont de la même couleur que le dos. Ces cinq dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Les troisième & quatrième plumes de l'aîle sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve, terminées de noir, & bordées par le bout de blanc-fauve. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espee d'épron long de quatre lignes & demie; large de deux lignes & demie à sa bâte & qui se termine en une pointé très-aiguë: il est jaune, & d'une substance pareille à de la corne. Le bec est orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge foncé; & les ongles noirâtres. On le

trouve à la *Louifiane*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conferve dans son cabinet.

imbuitur colore. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt saturatè rubri; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ludovicia*, unde in museum *D. Aubry* missus est.

** 8. LE VANNEAU ARMÉ DE S. DOMINGUE.

Vanellus dilutè fulvus, infernè ad roseum colorem inclinans; rectricibus dilutè fulvis, lateralibus interiùs ad roseum colorem vergentibus; membranâ utrinque rostrum inter & oculum luteâ, supra oculum ductâ & deorsum dependente; alis armatis *VANELLUS DOMINICENSIS ARMATUS.*

Il est à peu près de la grosseur de notre *Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces cinq lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derrière une ligne & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs

Vanellum nostratem crassitie circiter æquat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices; trium digitorum anteriorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extremus unum pollicem, intimus decem cum semi lineas; posticus autem sesquilineam tantùm. Trium digitorum

anticorum medius cum extremo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatâ caudam ferè extremam attingunt. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, membrana extat gracilis, eleganter lutea, tredecim lineas longa, undecim circiter lata, cujus pars una supra oculum protenditur, dum altera deorsum dependet, & in acumen definit. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ dilutè fulvæ. Scapulares & superiores caudæ teatrices eodem colore tinguntur. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, pars crurum suprema, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes ex dilutissimo fulvo ad roseum colorem nonnihil inclinant. Teatrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur: majores à corpore remotiores fulvo tinguntur nonnihil saturatio-

est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un beau jaune, longue de treize lignes sur environ onze de largeur, dont une partie s'étend au-dessus des yeux, tandis que l'autre pend en en-bas, en se terminant en pointe. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un fauve clair. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont aussi d'un fauve très-clair & tirant tant soit peu sur le couleur de rose. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un fauve un peu plus foncé. Les grandes plumes de l'aile sont d'un fauve rembruni, ayant la plus grande par-

tie de leur côté intérieur d'un fauve plus clair : les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernières les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un fauve clair : les latérales sont de la même couleur du côté extérieur, & d'un fauve très-clair tirant sur le couleur de rose du côté intérieur. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron long de trois lignes & demie, & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune & d'une substance pareille à de la corne. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *S. Domingue* à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.


re. Remiges majores sunt fulvæ, ad fuscum paululum vergentes, attamen in latere interiore maximâ parte fulvo dilutiore tinctæ : minores dorso concolores. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ dilutè fulvæ : laterales in latere exteriori concolores, in interiore verò ex dilutissimo fulvo ad roseum colorem nonnihil vergentes. In parte alarum anteriorè, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat tres cum semi lineas longum, in aciem acutissimum desinens, flavum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque flavi. Habitat in variis *Americæ* regionibus. Ex *Dominicensi Insula* in museum *Realmurianum* missus est à *D. Chervain*.



Fig. 2.

2. Vanneau armé de la Louisiane.







Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Vanneau.

2. Vanneau armé de la Louisiane.

1870





2. Vanneau varié.






Fig. 1.

Fig. 2.


6
5
4
3
2
1
Echelle de 6. Pouce.

Donné et Gravé par Martinet.

1. Vanneau gris.

2. Vanneau varié.





2. Vanneau armé du Sénégal .







Fig. 2.

Fig. 1.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Vanneau de Suisse.

2. Vanneau armé du Sénégal.



LXXI.

LXXI.

Genus Jacanæ.

Le genre du Jacana.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:
 Rostrum rectum, in apice
 crassius:
 Unguiculi longissimi.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un
 derriere:
 La partie inférieure des jam-
 bes dénuée de plumes:
 Le bec droit & renflé vers le
 bout:
 Les ongles très-longs.

I. LE JACANA.

Jacana nigro-viridans; capite anteriore membranâ dilutè
 cœruleâ obducto; capite, collo & pectore splendidè violaceo
 colore variantibus; rectricibus caudæ inferioribus albis;
 rectricibus nigro-viridantibus JACANA.

Jacana. *Pison. Hist. Nat. pag. 90, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
 Jacana Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 190, in qua hujus icon minùs
 accurata.*

Jonst. Avi. pag. 130. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.
 Gallinula Brasiliensis, Jacana dicta. *Willugh. Ornith. pag. 237. hujus
 icon à Marcgravio mutuata Tab. LIX.*

Gallinula Brasiliensibus Jacana dicta Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.
 115. N^o. 8.*

*Les Flamands l'appellent WATER-HOEN. Pison. WATER-HUN. Marcgr.
 Jonst.*

Les Brasiliens, JACANA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Crassitie *Columbam* adæ-
 quat; sed collo & pedibus
 donatur multò longioribus.
 Rostrum habet ab ipsius api-
 ce ad oris angulos usque
 unum pollicem & ampliùs
 longum. Pars crurum plu-

Il est de la grosseur d'un *Pi-
 geon*; mais il a le col & les pieds
 beaucoup plus longs. Son bec
 depuis sa pointe jusqu'aux coins
 de la bouche a plus d'un pouce
 de long; la partie de ses jambes
 qui est dégarnie de plumes, en-

viron dix-huit lignes ; son pied environ deux pouces trois lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est extrêmement long. Tous les ongles des doigts antérieurs sont longs d'un demi-pouce. Le devant de la tête est couvert par une membrane ronde d'un bleu clair ou de couleur de Turquoise. La tête, la gorge, le col & la poitrine sont d'un noir-vert, changeant en un violet éclatant. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus de la queue, le ventre, les côtés & le haut des jambes sont d'un noir-vert. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les plumes de l'aile sont aussi d'un noir changeant en verd. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est d'une belle couleur d'écarlate depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son bout il est d'un jaune tirant un peu sur le verd. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre ; & les ongles tout-à-fait jaunes. On le trouve au

mis denudata octodecim circiter lineas longa est ; pes duos pollices cum tribus circiter lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus longissimus. Ungues autem omnes digitorum anticorum semipollicis longitudinem obtinent. Caput anterius membrana quâdam obducitur rotundâ dilutè cœruleâ sive Turcoidis colore imbutâ. Caput, guttur, collum & pectus ex nigro viridescunt, & splendide violaceo colore variant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superiores caudæ rectrices, venter, latera & pars crurum suprema sunt nigro-viridantes. Rectrices caudæ inferiores albæ. Alarum remiges ex nigro quoque viridescunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum ab ipsius exortu ad medietatem usque egregii est miniatî coloris, à medietate ad apicem flavi, cui aliquid viriditatis admixtum est. Pars crurum plumis denudata ; pedesque flavo-viridescentes ; ungues verò lutei. Ha-

bitat in palustribus *Brafiliaë* *Bréfil* dans les marais.
locis.

2. LE JACANA ARMÉ OU LE CHIRURGIEN.

Jacana nigro-*viridans* ; alis ad fuscum *vergentibus* , armatis ;
*rectricibus nigro-*viridantibus** JACANA ARMATA.

Jacanaë alia species , *Brafilienfibus* *Aguapecaca* dicta. *Marcgr. Hist. Br.*
pag. 191.

Jonst. Avi. pag. 130.

Gallinula Brafilienfis *Aguapecaca* dicta. *Willugh. Ornith. pag. 237.*

Raj. Syn. Avi. pag. 115. N^o. 9.

Gallina aquatica , minor , *alticrura* , alis *cornutis*. *Barr. Hist. Fr. Eq.*
pag. 132.

Porphyrio Americanus , *alticrus* , alis *cornutis*. *Barr. Ornith. Class. III.*
Gen. XXXIV. sp. 5.

Les François de la Guiane l'appellent *POULE-D'EAU*. *Barr.*

Les Indiens de la Guiane , *KAPOUA*. *Barr.*

Les Brafilienfibus , *AGUAPECACCA*. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Magnitudine & crassitie
cum præcedente convenit.
Totum corpus pennis vesti-
tur nigro-*viridantibus*. Alæ
tamen ad fuscum *vergunt*.
Caudam componunt duode-
cim *rectrices nigro-*viridan-**
tes. In parte alarum ante-
riore , scilicet *versus articu-*
lum *carpo humano respon-*
dentem , *calcar extat rec-*
tum , *acutissimum* , *flavum* ,
substantiæ corneæ æmulum ,
quo se defendit. Habitat in
palustribus *Brafiliaë* locis.

Il est de la grandeur & de
la grosseur du précédent. Tout
son corps est couvert de plu-
mes d'un noir-vert. Ses ailes
tirent cependant sur le brun. La
queue est composée de douze
plumes d'un noir-vert. Sur la
partie antérieure de l'aile , sça-
voir vers le pli qui répond à
celui du poignet , est une espece
d'épron droit , très-pointu , jaune
& d'une substance semblable à
de la corne , au moyen duquel
il se défend. On le trouve dans
les marais du *Bréfil*.

3. LE CHIRURGIEN NOIR.

Jacana superne nigra, infernè fusca; capite anteriore membranâ rufâ obducto; remigibus viridibus, apice fuscis; reatricibus nigris; alis armatis . . . JACANA ARMATA NIGRA.

Jacanae tertia species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 191.*

Jonst. Avi. pag. 131.

Gallinula Brasiliensis tertia Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 237.*

Raj. Syn. Avi. pag. 115. N^o. 10.

Il est de la grandeur & de la grosseur des précédens. La partie antérieure de la tête est couverte par une membrane rousse. La tête, la gorge, le col, le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les plumes qui couvrent la poitrine, le ventre, les côtés & le haut des jambes, ainsi que les couvertures du dessous de la queue & celles du dessus des aîles, sont brunes. Les plumes de l'aîle sont vertes, excepté leur extrémité, qui est brune. La queue est composée de douze plumes noires. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espee d'épron droit, très-pointu, jaune & d'une substance semblable à de la corne. Le bec est d'un jaune de safran. La partie des jambes

Magnitudine & crassitie præcedentes æmulatur. Capitis pars anterior membranâ quâdam obducitur rufâ. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices nigri sunt coloris. Pectus, ventrem, latera & crurum supremam partem vestiunt pennæ fuscæ. Quæ caudam subtus obtegunt, superioresque alarum tectrices concolores. Remiges sunt virides, attamen in extremitate fuscæ. Cauda duodecim conflatur reatricibus nigris. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat rectum, acutissimum, flavum, substantiæ cornæ æmulum. Rostrum croceo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque ci-

nerci. Habitat in palustribus *Brasilie* locis. qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont cendrés. On le trouve au *Bresil* dans les marais.

** 4. LE CHIRURGIEN BRUN.

Voyez Pl. XI. Fig. 1.

Jacana superne castaneo-purpurea, infernè ex nigro ad violaceum inclinans; syncipite membranâ bipartitâ rubro-aurantiâ obducto; capite, gutture & collo ex nigro ad violaceum vergentibus; remigibus viridi-olivaceis, in extremitate fusco marginatis; rectricibus binis intermediis fuscis, castaneo-purpureo mixtis, lateralibus castaneo-purpureis, omnibus apice nigro-violaceis; alis armatis
JACANA ARMATA FUSCA.

Jacana quarta species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 195.*

Jonst. Avi. pag. 131.

Gallinula Brasiliensis quarta *Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 237.*

Raj. Syn. Avi. pag. 115. N°. II.

Avis cornuta. Euf. Nieremb. pag. 214.

Anser Chilensis, seu Caput nocturnum. Charlet. Exerc. pag. 119. N°. I.

Charlet. Onomast. pag. 115. N°. I.

Yohualcuachili, seu Caput Chilli nocturnum. Fern. Hist. Nov. Hisp.

pag. 50. Cap. CLXXXI.

Yohualquachili seu Caput Chilli nocturnum. Raj. Syn. Avi. pag. 178.

N°. 5.

Jochualcuachili, seu Caput nocturnum. Jonst. Avi. pag. 126.

Les Anglois l'appellent SPUR-WING'D GOOSE OF AMERICA. Charlet.

Les Mexiquains, YOHUALCUACHILI. Nieremb. Fern.

Morinello paululum crafitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & undecim lineas.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Guignard*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces onze lignes. Son bec de-

puis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce huit lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces huit lignes, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces cinq lignes & demie; & celui de derrière deux pouces trois lignes; car son ongle a jusqu'à seize lignes & demie de long, & est tout-à-fait droit. Il a seize pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert par une membrane d'un rouge-orangé, qui a cinq lignes de largeur & six lignes de hauteur, & est arrondie & divisée en deux lobes dans sa partie supérieure. De chaque côté de la tête est une autre petite membrane de la même couleur, arrondie, d'environ deux lignes de large, & qui pend à côté du coin de la bouche. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un noir tirant sur le violet. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les cou-

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum octo lineis; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & octo lineas, extimus duos pollices cum sex lineis, intimus duos pollices & quinque cum semi lineas; posticus tandem duos pollices & tres lineas; ungue enim armatur sexdecim cum semi lineas longo, & planè recto. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum & decem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Synciput membranâ quâdam obducitur rubro-aurantiâ, quinque linearum latitudinem & sex linearum altitudinem obtinente, in parte suprema rotundatâ & bipartitâ. In utroque capitis latere altera extat membranula concolor, rotundata, binas circiter lineas lata, & prope oris angulum dependens. Caput, guttur, collum, pectus, venter, inferioresque caudæ

teétrices ex nigro ad violaceum inclinant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ teétrices sunt eleganter castaneo-purpureæ. Latera & teétrices alarum inferiores minores idem tingit color, sed saturatior : teétrices alarum inferiores majores sunt fuscæ. Crurum pars suprema nigricat. Superiores alarum teétrices minimæ & mediæ eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores corpori finitimæ fuscæ ; à corpore remotiores nigræ. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ castaneo-purpureo & nigricante variæ. Viginti tribus remigibus ala conflatur : novemdecim primores sunt dilutè viridi-olivacæ ; ex istis autem septem primores fusco terminatæ, & quartâ circiter longitudinis parte eodem colore in apice marginatæ ; quæ margo fusca per totam prioris remigis longitudinem in latere exteriori protenditur : duodecim quæ sequuntur, ab octava scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, margine fuscâ in apice tantùm præditæ sunt : quatuor corpori

vertures du dessus de la queue sont d'un beau marron-pourpré. Les côtés & les petites couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur, mais plus foncée : les grandes couvertures du dessous des ailes sont brunes. Le haut des jambes est noirâtre. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus proches du corps sont brunes ; & les plus éloignées du corps sont noires. Le bord de l'aile, vers le pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes variées de marron-pourpré & de noirâtre. L'aile est composée de vingt-trois plumes : les dix-neuf premières sont d'un verd-d'olive clair ; & de celles-là les sept premières sont terminées & bordées de brun par le bout dans environ le quart de leur longueur ; cette bordure brune s'étend aussi dans toute la longueur du côté extérieur de la première plume : les douze suivantes, sçavoir depuis la huitième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont seulement bordées de brun par le bout : les quatre plus proches du corps, sçavoir depuis la vingtième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, sont d'un

marron-pourpré; & la vingtième est variée sur son côté extérieur d'un peu de verd-d'olive. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun mêlé de marron-pourpré, & terminées de noir-violet : les latérales sont d'un marron-pourpré, & terminées pareillement de noir-violet. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Sur la partie antérieure de l'aîle, savoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron large à sa bâte de deux lignes & demie, long de quatre lignes & demie, & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune, un peu tourné en-dedans, & d'une substance pareille à de la corne. Le bec est d'un bel orangé. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un cendré-verdâtre. On le trouve au *Brazil*, au *Mexique*, & à *S. Do-*

viciniores, à vigesima scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, sunt castaneo-purpureæ; vigesima autem in latere exteriori pauco variegatur viridi-olivaceo. Quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ; & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ fuscæ, castaneo-purpureo mixtæ, apice nigro-violaceæ: laterales castaneo-purpureæ, similiter nigro-violaceo terminatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt; laterales autem omnes sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevioram. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat duas cum semi lineas in basi latum, quatuor cum semi lineas longum, in aciem acutissimum desinens, flavum, paululùm introrsum versum, substantiæ cornæ æmulum. Rostrum elegantè aurantium. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque cinereo-virescentes. Habitat in *Bra-*

silia,

Jilia, Mexico & Domini-
centi Insula, unde in *musæum*
Realmurianum missa à *D. Chervain*.
Chervain.

5. LE CHIRURGIEN VARIÉ.

Jacana superne castaneo-purpurea, infernè alba; sincipite membranâ tripartitâ rubro-aurantiâ obducto; tæniâ supra oculos candidâ; fasciâ nigrâ à rostro per oculos & secundum colli latera productâ; remigibus viridibus, in extremitate nigro marginatis; rectricibus castaneo purpureis; alis armatis JACANA ARMATA VARIA.

Fulica fronte carunculata, corpore variegato, humeris spinosis, digitis simplicibus, ungue postico longissimo. *Fulica spinosa*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 82. sp. 4.*

Rallus digitis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculeiformi, anomalo. *Klein. Avi. pag. 104. N^o. 7.*

Poule-d'eau aux ailes épronnées. *Edwards. Tom. I. pag. XLVIII; avec une figure exacte Pl. 48.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem novem circiter pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda unum pollicem cum decem lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue duos pollices cum novem lineis, extimus duos pollices & quatuor lineas, intimus

Tom. V.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes; quinze lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces trois lig-

R

nes ; & celui de derriere un pouce onze lignes ; car son ongle a jusqu'à quatorze lignes & demie de long, & est tout-à-fait droit. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert par une membrane d'un rouge-orangé, qui a cinq lignes de largeur & six lignes de hauteur, & est arrondie & divisée en trois lobes dans sa partie supérieure. Le dessus de la tête est brun, & varié de quelques taches d'un brun plus obscur. La partie supérieure du col est d'un brun foncé. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron-pourpre. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui passe par-dessus les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. Au-dessous de celle-là en est une noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par les yeux, & descend ensuite, en se courbant, tout le long des côtés du col. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs : cette couleur est variée de quelques taches rougeâtres, placées sur les côtés du ventre & le haut des jambes. Les

duos pollices & tres lineas ; posticus autem unum pollicem cum undecim lineis ; ungue enim donatur quatuordecim cum semi lineas longo, & planè recto. Alæ complicatæ ad caudam extremam pertingunt. Synciput membranâ quâdam obducitur rubro-aurantiâ, quinque linearum latitudine & sex linearum altitudine polente, in parte suprema rotundatâ & tripartitâ. Caput superius fuscum est, quibusdamque maculis fusco obscuriore imbutis variegatum. Pars colli superior saturatè fusca. Dorsum, uropygium & superiores caudæ teatrices sunt castaneo-purpureæ. In utroque capitis latere tænia extat candida, supra oculos ducta, & versùs occipitum usque protensa. Infra tæniam istam altera adest fascia nigra, prope rostri exortum orta, per oculos ducta, & deinde reflexa deorsum descendit, & secundùm colli latera protenditur. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars suprema & pennæ caudam subtus cooperientes albicant. Albedinem autem variegant maculæ quædam rubescentes, ad ventris latera,

inque crurum parte suprema collocatæ. Pennæ alas infernè vestientes sunt fusco-rubescentes. Scapulares dilutè fuscæ. Tectrices alarum superiores minimæ castaneo-purpureæ : mediæ fuscæ : majores verò nigræ. Alarum remiges (quatuor corpori vicinioribus exceptis) eleganter virides , nigro in extremitate marginatæ ; quæ margo nigra per totam primoris remigis longitudinem in latere exteriori protenditur : quatuor corpori finitimæ fuscæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ , & dum ala complicatur , majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus castaneo-purpureis cauda conflatur. In parte alarum anteriore , scilicet versùs articulum carpo humano respondentem , calcar quoddam extat crassiusculum , in aciem acutissimum desinens , flavum , paululùm introrsum versum , substantiæ cornæ æmulum. Rostrum flavo-aurantium. Pars crurum plumis denudata , pedes , unguesque cinereo-cærulescentes. Habitat circa *Carthagenam novam in America Meridionali.*

couvertures du dessous des ailes sont d'un brun-rougeâtre. Les plumes scapulaires sont d'un brun clair. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un marron - pourpré : les moyennes sont brunes : & les grandes sont noires. Les plumes de l'aile (excepté les quatre plus proches du corps) sont d'un beau verd , & bordées de noir par le bout : cette bordure noire s'étend aussi dans toute la longueur du côté extérieur de la première plume : les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces dernières sont longues & pointues , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré. Sur la partie antérieure de l'aile , sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet , est une espèce d'épron assez gros & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune , un peu tourné en-dedans , & d'une substance semblable à de la corne. Le bec est d'un jaune-orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les ongles sont d'un cendré-bleuâtre. On le trouve aux environs de *Carthagene* dans l'*Amérique Méridionale.*

SECTION II.

Ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui du *Coulon-chaud*.

LXXII.

Le genre du Coulon-chaud.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière:

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

SECTIO II.

Eæ quæ rostrum habent subrectum, sursum modicè tendens, & horizontaliter paululùm compressum.

UNICO genere, *Arenariæ* scilicet, constituitur hæc sectio.

LXXII.

Genus Arenariæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:

Crura in parte inferiore plumis denudata:

Rostrum subrectum, sursum modicè tendens, horizontaliter paululùm compressum.

** I. LE COULON-CHAUD.

Arenaria superne nigro, fusco & ferrugineo varia, infernè alla; genis & collo inferiore nigris; collo superiore & uropygio candidis; rectricibus binis intermediis in exortu albis, in reliqua longitudine fuscis, in apice albo marginatis, quatuor utrinque proximis primâ medietate candidis, alterâ fuscis, albo terminatis, utrinque extrema candida, maculâ fuscâ interiùs notata **ARENARIA.**

Tringa nigro, albo, ferrugineoque variegata, pectore abdomineque albo. *Faun. Succ. Linn. N° 154.*

Tringa pedibus rubris, corpore nigro albo ferrugineoque vario, pectore abdomineque albo. Interpres. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78.*

sp. 4.

Tringa maritima. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 10.*

Morinellus marinus D. Brown. *Willugh. Ornith. pag. 231. hujus icon minus accurata Tab. LVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 112. N°. A. 5.

Cinclus. *Moehr. Avi. Gen. 95.*

Gavia, quæ *Pluvialis Arenaria* nostra, *Raji. Klein. Avi. pag. 21. N°. 9.*

Tourne Pierre de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXL1; avec une figure assez exacte Pl. 141.*

Les Gothlandois l'appellent TOLCK. *Linn.*

Les Anglois, TURN-STONE; SEA-DOTTEREL. *Raj. SEA-DOTTREL; SEA-DOTTRELL.* *Willugh. TURN-STONE FROM HUDSON'S-BAY. Edwards.*

Craffitie *Merulam* circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus decem lineas, intimus novem lineas; posticus autem quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum ala-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes quatre lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes; & celui de derrière quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a quinze pouces six lignes de vol;

& ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à l'about de la queue. Immédiatement au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur est une petite bande noire, qui s'étend de chaque côté jusqu'aux yeux. Au-dessous de cette bande de l'espace contenu entre la narine & l'œil est blanc. Le sommet de la tête est couvert de petites plumes noires, bordées de blanc. Le synciput, les côtés de la tête derrière les yeux, la gorge & le dessus du col sont blancs; cette couleur s'étend de chaque côté jusque vers l'origine de l'aile. Les joues ou les côtés de la tête au-dessous des yeux, la partie inférieure & les côtés du col sont noirs. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de noir, de brun & de ferrugineux. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessus de la queue sont noires; il faut cependant en excepter les plus longues, qui sont blanches. Les petites & les moyennes du dessus des ailes sont variées de gris-brun, de noirâtre & de ferrugineux

rum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Immediatè supra mandibulæ superioris exortum exigua extant tania nigra, utrinque ad oculos usque producta. Infra quam taniam spatium narem inter & oculum contentum albicat. Summum caput obtegunt plumulæ nigrae, albo fimbriatæ. Synciput, caput ad latera, idque ponè oculos, guttur & collum superius sunt candida; qui candor utrinque versùs alarum exortum usque protenditur. Genæ sive capitis latera infra oculos, collum inferiùs & ad latera nigri sunt coloris. Dorsum supra pars & scapulares pennæ nigro, fusco & ferrugineo variegantur. Dorsum inferum, uropygium, pectus, ventrem, latera, crurumque partem supremam vestiunt pennæ albæ. Quæ caudam infernè cooperiunt, alarumque tectrices inferiores concolores. Superiores caudæ tectrices nigrae, exceptis tamen longioribus candidis. Tectrices alarum superiores minimæ & mediæ griseo-fusco, nigri-

cante & ferrugineo diluto variegantur : majores corpori finitimæ sunt in latere interiore & apice candidæ, in latere exteriori saturatè fuscæ, albo marginatæ : majores tandem à corpore remotiores saturatè fuscæ ; ex istis autem intimæ apicibus albis præditæ sunt. Alam componunt viginti quatuor remiges : decem primores subtus candicant, superne verò sunt fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ, & scapo albo præditæ ; ex istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in exortu candidæ, deinde fuscæ, albo in apice marginatæ ; quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò remix fit corpori vicinior : sex quæ sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsarum extremitatem positâ, notatæ ; quæ macula eò major est, quò remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ. Quatuor istæ no-

clair : les grandes les plus proches du corps sont blanches du côté intérieur & à leur bout ; leur côté extérieur est d'un brun foncé, & bordé de blanc : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé ; & de celles-là les plus intérieures sont terminées de blanc. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premières sont blanchâtres en-dessous ; mais en-dessus elles sont brunes, & la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-blanc, & leur tige blanche ; cinq de celles-là, savoir depuis la fixième jusqu'à la dixième inclusivement, sont bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont blanches à leur origine, ensuite brunes, & bordées de blanc par le bout ; cette bordure blanche est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : les six qui suivent, savoir depuis la quinzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache brune, placée sur leur côté extérieur vers leur extrémité ; cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus éloignée du corps : enfin les quatre plus

proches du corps sont brunes. Ces quatre dernières sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont blanches à leur origine, ensuite d'un brun foncé dans le reste de leur longueur, & bordées de blanc par le bout : les quatre qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est d'un brun foncé, & terminée de blanc, le brun occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée seulement d'une assez grande tache brune, placée sur son côté intérieur vers le bout. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont orangés ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

vissimæ remiges longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus, quarum binæ intermediae sunt in exortu albæ, dein in reliqua longitudine saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ : quatuor utrinque proximè sequentes ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, alterâ medietate saturatè fuscæ, albo terminatæ ; fusco tamen colore eò minus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : utrinque extrema candida, majusculâ tantùm notata maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsius apicem positâ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque aurantii ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex museo Reaumuriano.*

** 2. LE COULON-CHAUD CENDRÉ.

Voyez Pl. XI. Fig. 2.

Arenaria superne cinereo-fusca, marginibus pennarum albidis, infernè alba; collo inferiore & pectore saturatè fuscis; uropygio candido; rectricibus binis intermediis in exortu albis, in reliqua longitudine fuscis, in apice albo marginatis, quatuor utrinque proximis primâ medietate candidis, alterâ fuscis, albo terminatis, utrinque extrema candida, maculâ fuscâ interiùs notata. . . . ARENARIA CINEREA.

Allouette de mer. *Catesb. Tom. I. pag. 72; avec une figure exacte Pl. 72.*
Les Anglois l'appellent, TURN-STONE; SEA-DOTTREL. Catesb.

Præcedentem crassitie nonnihil antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices & sex lineas explet, & ad extremos unguis novem pollices & tres lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim cum semilineas longum est; cauda duos pollices cum quinque lineis; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus decem lineas, intimus octo cum semi lineas; posticus autem tres tantum cum semi lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad
Tom. V.

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long; sa queue deux pouces cinq lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur dix lignes, l'intérieur huit lignes & demie; & celui de derrière trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend
 S

jusqu'à la première articulation. Il a un pied cinq pouces trois lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & le dessus du col sont d'un gris-brun. La partie supérieure du dos est couverte de plumes de la même couleur, & bordées de blanchâtre. Les scapulaires sont pareillement d'un gris-brun, & bordées de même de blanchâtre ; cependant deux de celles-là, sçavoir les inférieures, sont tout-à-fait blanches. La gorge est de cette dernière couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun foncé ; & la poitrine est variée sur ses côtés d'un peu de blanchâtre. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus de la queue sont brunes : les grandes sont blanches. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, bordées & terminées de blanc : & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé. L'aile est com-

primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & trium linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Caput & collum superius sunt griseo-fusca. Dorsum supremam partem vestiunt pennæ eodem colore imbutæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares sunt quoque griseo-fuscæ, albido similiter marginatæ ; ex istis tamen binæ, inferiores scilicet, penitus albescent. Guttur quoque albescit. Collum inferius & pectus sunt saturatè fusca ; pectus tamen ad latera paucò candicante varium. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Tectrices caudæ superiores minores sunt fuscæ : majores candidæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ pennis dorsum vestientibus concolores : majores corpori finitimæ griseo-fuscæ, albo fimbriatæ & terminatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : decem pri-

mores subtus candicant, superne verò sunt fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ, & scapo albo præditæ; ex istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ: quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in exortu candidæ, dein fuscæ, albo in apice marginatæ; quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò remix fit corpori vicinior: sex quæ sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, maculâ fuscâ, in latere interiore versus ipsarum extremitatem positâ, notatæ; quæ macula eò major est, quo remix fit à corpore remotior: quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ. Quatuor istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices: binæ intermediæ sunt in exortu albæ, dein in reliqua longitudine saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ: quatuor utrinque proximæ ab ipsarum

posée de vingt-quatre plumes: les dix premières sont blanchâtres en-dessous, mais en-dessus elles sont brunes, & la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-blanc, & leur tige blanche; cinq de celles-là, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la dixième inclusivement, sont bordées de blanc par le bout: les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, sont blanches à leur origine, ensuite brunes, & bordées de blanc par le bout; cette bordure blanche est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps: les six qui suivent, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache brune, placée sur leur côté extérieur vers leur extrémité; cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus éloignée du corps: enfin les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces quatre dernières sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont blanches à leur origine, ensuite d'un

brun-foncé dans le reste de leur longueur, & bordées de blanc par le bout : les quatre qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié est d'un brun foncé, & terminée de blanc, le brun occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée seulement d'une assez grande tache brune, placée vers son bout sur son côté intérieur. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, in altera medietate saturatè fuscæ, albo-terminatæ ; fusco tamen colore eò minus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : utrinque extrema candida, majusculâ tantùm notata maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsius apicem positâ. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri ; ungues verò nigricantes. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. Aubry.*

SECTION III.

Ceux qui ont le bec convexe en-dessus & comprimé par les côtés vers le bout.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Perdrix-de-mer.*

SECTIO III.

Eæ quæ rostrum habent superne convexum & apice lateraliter compressum.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Glareolæ.*




Fig. 1.

Echelle de 6. Pouces.

2. Coulon-chaud cendré.





Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Chirurgien brun.

2. Coulon-chaud centré.



LXXIII. LXXIII.

Genus Glareolæ. Le genre de la Perdrix-de-mer.

Hujus character est	Son caractere est d'avoir
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:	Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
Crura in parte inferiore plumis denudata:	La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Rostrum superne convexum, apice lateraliter compressum.	Le bec convexe en-dessus, & comprimé par les côtés vers le bout.

** I. LA PERDRIX-DE-MER.

Voyez Pl. XII. Fig. 1.

Glareola superne splendide griseo-fusca, infernè ex albo non-nihil rufescens; gutture & collo inferiore albo-rufescentibus, lineâ nigrâ circumdatis; pectore griseo-rufescente; lateribus dilutè castaneis; rectricibus quatuor utrinque extimis in exortu albis, versùs apicem fusco-nigricantibus, tribus extimæ proximis exteriùs griseo-fusco marginatis. . . .

GLAREOLA.

Glareola secunda. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 281.*

Erythropus minor. *Gesn. icon. Avi. pag. 109, in qua hujus icon pessima.*

Gallinulæ aquaticæ undecimum genus, quod Erythropodem minorem appello, vulgus Koppriegerle. *Gesn. Avi. pag. 513, in qua eadem icon.*

Gallinula Erythropus minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 454, in qua hujus icon pessima.*

Gallinula Erythropus minor. *Jonst. Avi. pag. 110.*

Hirundo marina. *Jonst. Avi. pag. 84.*

Charlet. Exer. pag. 96. N^o. 5.

Charlet. Onomazt. pag. 90. N^o. 5.

Hirundo marina *Avis. Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 696. hujus icon non satis accurata pag. 697.*

Hirundo marina *Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 156.*

Raj. Syn. Avi. pag. 72.

Hirundinis ripariæ species. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 96. hujus icon non satis accurata Tab. 46.

Pratincola. Kramer. Elench. veget. & Anim. pag. 381; cum icone satis accurata.

Les Allemands l'appellent KOBEL REGERLIN; SAND-VOGEL. Schwenck.

Les Allemands aux environs de Strasbourg, KOPPRIEGERLE. Gesn. Aldrov. Schwenck.

Les Autrichiens, BRACH-VOGEL. Kramer.

Les Anglois, SEA-SWALLOW. Charlet.

Elle est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; sa queue quatre pouces une ligne; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur sept lignes & demie, l'intérieur sept lignes; & celui de derrière quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a un pied dix pouces trois lignes de vol; & ses ailes lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatre lig-

Merulam crassitie circiter æquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos unguis septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices cum linea unica; pars crurum plumis denudata tres cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas, extimus septem cum semi lineas, intimus septem lineas; posticus autem quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & trium linearum intervallo.

distans ; alæ verò complicatæ ad quatuor usque lineas ultra caudam extremam protrahuntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ splendide griseo-fuscæ. Scapulares concolores. Guttur & collum inferius alborufescente tinguntur colore ; quem colorem circumdat linea nigra, ab oris angulo versus pectus ducta, & sic ad alterum oris angulum protensa. Pectus ex griseo rufescit. Venter, crurum superiora pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex albo nonnihil rufescunt ; latus tamen crurum exterius pauco griseo variegatur. Latera sunt dilute castanea. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, eodem imbuuntur griseo-fusco ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores ex fusco nigricant. Inferiores alarum tectrices minores sunt splendide fuscæ : majores corpori finitimæ dilute castaneæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes. Alarum componunt viginti tres remiges : novem primores ex fusco nigricant ; omnium tamen prior scapo

nes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun assez brillant. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-rouffâtre ; cette couleur est entourée d'une ligne noire, qui s'étend d'un coin de la bouche à l'autre, en passant vers la poitrine, qui est d'un gris-rouffâtre. Le ventre, le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de rouffâtre ; il y a cependant un peu de gris sur le côté extérieur des jambes. Les côtés sont d'un marron clair. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même gris-brun que celui du dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. Les petites du dessous des ailes sont d'un brun brillant : les grandes les plus proches du corps sont d'un marron-clair ; & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les neuf premières sont d'un brun-noirâtre, la première de toutes ayant sa tige blanchâtre : les huit suivantes, sçavoir depuis la dixième,

me jusqu'à la dix-septième inclusivement, & la dix-neuvième sont d'un gris-brun brillant du côté extérieur, d'un brun foncé du côté intérieur, & terminées obliquement de blanc; cette couleur ne s'étend que sur le côté intérieur des dixième, onzième, douzième & treizième plumes: la dix-huitième & les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun brillant comme celui du dos. Ces quatre dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus longues plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun brillant: celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est blanche à son origine, ensuite d'un gris-brun brillant dans le reste de sa longueur du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre terminé de blanc du côté intérieur: les quatre plus extérieures de chaque côté sont blanches à leur origine, & d'un brun-noirâtre vers le bout, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure; toutes ces plumes, excepté la plus extérieure de chaque côté, sont bordées extérieurement d'un gris-brun bril-

candante donatur: octo proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam septimam usque inclusivè, & insuper decima nona sunt in latere exteriorè splendidè griseo-fusca, in interiorè saturatè fusca, albo obliquè terminatæ; albedo autem quatuor remigum, decimæ scilicet, undecimæ, duodecimæ & tredecimæ, latus tantùm interius occupat: decima octava & quatuor corpori viciniores sunt, dorso instar, splendidè griseo-fusca. Quatuor istæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ splendidè griseo-fusca: utrinque proximè sequens in exortu candida, dein in reliqua longitudine exteriùs splendidè griseo-fusca, interiùs fusco-nigricans & albo terminata: quatuor utrinque extimæ in exortu albæ, versùs apicem fusco-nigricantes, albore eò majus spatium occupante, quò rectrix exterior fit; omnes autem istæ rectrices, si utrinque extimam excipias, sunt exteriùs griseo-fusco splendido marginatæ.

marginatæ. Binæ rectrices intermedia lateralibus longitudine cedunt; laterales autem gradatim longiores fiunt ad utrinque extimam usque binas intermedias unius pollicis & decem linearum longitudine excedentem; unde fit cauda maximè bifurca. Rostrum basi rubrum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque saturatissimè sanguinei. Maris, fluviorum & stagnorum littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

lant. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu d'un pouce dix lignes; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec est rouge à sa base, & noir dans le reste de sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un rouge de sang très-foncé. On la trouve sur les bords de la mer, des rivières & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. LA PERDRIX-DE-MER A^e COLLIER.

Glareola superne griseo-fusca, infernè subalbida; maculâ incipientem nigrâ; maculâ utrinque circa oculos, gutture & collo candidis; torques fusco; rectricibus griseo-fuscis....
GLAREOLA TORQUATA.

Glareola quinta. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 282.*

Glareola quinta Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 6.*

Ochropus minor. *Gesn. icon. Avi. pag. 109, in qua hujus icon non satis accurata.*

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 464.

Gallinulæ aquaticæ duodecimum genus, quod Ochropodem minorum nomino, vulgus Riegerle. *Gesn. Avi. pag. 514, in qua hujus icon non satis accurata.*

Gallinula Ochropus minor. *Jonst. Avi. pag. 110.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg l'appellent RIEGERLE. Gesn.

Aldrov. RIEGERLIN. Schwenck.

Les Silésiens, SAND RIEGERLIN; TULLFISZ. Schwenck.

Præcedenti multum crassitie cedit. Caput superius,
Tom. V.

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Le dessus
T

de la tête, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. De chaque côté de la tête est une tache blanche, placée vers les yeux. L'espace contenu entre ces taches ou le synciput est noir. La gorge & le col sont blancs; mais le bas du col est entouré d'une ligne brune, qui forme une espece de collier. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, & les côtés sont blanchâtres. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur. Les petites du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur: les moyennes sont de la même couleur que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunâtres; & les ongles noirâtres. Elle fait son nid dans le sable sur le bord des rivieres, dont elle ne s'éloigne jamais. Elle pond ordinairement sept œufs oblongs.

dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt griseo-fuscæ. In utroque capitis latere macula extat candida, circa oculos posita. Spatium autem maculas inter istas contentum, in syncipite scilicet, nigrum est. Guttur & collum albert; collum autem in parte infima lineâ cingitur fuscâ, torquem efficiente. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ subalbidæ. Quæ caudam subtus obtegunt, concolores. Superiores alarum rectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fuscæ: majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores similiter nigricant: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices griseo-fuscæ. Rostrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt sublutei; ungues verò nigricantes. In arenis ad littora fluviorum nidificat; quæ littora nunquam deserit. Ova parit ut plurimum septem oblonga.

3. LA PERDRIX-DE-MÉR TACHETÉE.

Glareola superne fusca, maculis obscurioribus varia, infernè rufa, maculis fuscis & albicantibus variegata; capite & collo pectori concoloribus; imo ventre rufo-candicante, nigris maculis vario; rectricibus candicantibus, apice nigris . . . GLAREOLA NÆVIA.

Melampus. Gesn. icon. Avi. pag. 107, in qua hujus icon pessima.

Gallinulæ aquaticæ septimum genus, quod Rot-Knillis vocitant, ego Melampodem cognomino. Gesn. Avi. pag. 510, in qua eadem icon.

Gallinula Melampus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 464. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 465.

Gallinula Melampus Gesnero, Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 109. N^o. 9.

Gallinula Melampus Willughby. Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 380. Glareola, Gallinula Melampus Gesneri, Aldrovandi, Willughbeji. Klein. Avi. pag. 101. N^o. 9.

Rot-Knuffell Leonardi Baltneri; Gallinula Melampus Gesnero, Aldrovando. Willugh. Ornith. pag. 225. hujus icon non satis accurata Tab. LVI.

Les Boulonnois l'appellent GIAROLA. Aldrov.

Les Allemands, ROT-KNILLIS. Gesn. Aldrov. Willugh. WASSER-HEUNLEIN. Rzac.

Les Polonois, KOKOSSKA. Rzac.

Magnitudine & crassitie præcedentem antecellit. Caput, guttur, collum, pectus & venter supremus rufo tinguntur, maculisque fuscis & albicantibus variegantur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices fuscæ sunt, maculis quibusdam obscurioribus distinctæ. Venter imus, latera, crurum pars suprema & pennæ caudam subtus cooperientes ex rufo candi-

Elle est plus grande & plus grosse que la précédente. La tête, la gorge, le col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un roux varié de taches brunes & de taches blanches. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun varié de quelques taches plus obscures. Le bas-ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux-blanc

châtre, joliment varié de taches noires. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos, & variées de plus de taches blanches. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont variées de cendré & de noir. La queue est composée de douze plumes blanchâtres, terminées de noir. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer & des rivières.

cant, & nigris maculis elegantur variegantur. Superiores alarum tectrices dorso concolores, maculis insuper candidis variæ. Remiges majores nigræ : minores cinereo & nigro distinctæ. Caudam componunt duodecim rectrices candicantes, in extremitate nigræ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Circa maris & fluminum littora versatur.

** 4. LA PERDRIX-DE-MER DU SÉNÉGAL.

Glareola in toto corpore fusca ; rectricibus interiùs & subtus cinereo-fuscis GLAREOLA SENEGALENSIS.

Elle est à peu près de la grosseur de la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; sa queue quatre pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes ; son pied quatorze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lig-

Glareolam nostratem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex lineas æquat ; & ad extremos ungues septem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est ; cauda quatuor pollices cum tribus lineis ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes quatuordecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim

lineas, extimus septem lineas, intimus sex cum semi lineas; posticus autem tres cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad novem usque lineas ultra caudam extremam protrahuntur. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, crurum parte supremâ & lateribus, pennis vestitur fuscis. Scapulares, quæ caudam superne & infernè obtegunt, & superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, concolores: majores à corpore remotiores fusco nonnihil dilutiore imbutæ. Tectrices alarum inferiores minores fuscæ: majores cinereo-fuscæ. Remiges majores sunt saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-fuscæ: minores subtus ex cinereo quoque fuscescunt, superne verò eodem imbuuntur colore ac

nes, l'extérieur sept lignes, l'intérieur six lignes & demie; & celui de derrière trois lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a un pied onze pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à neuf lignes au-delà du bout de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, est couvert de plumes brunes. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les petites du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun un peu plus foncé. Les petites couvertures du dessous des ailes sont brunes: les grandes sont d'un cendré-brun. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun foncé; cependant la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un cendré-brun: les moyennes sont en-dessous de cette dernière couleur, & en-dessus elles sont de la même couleur que le dos. De ces dernières

les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent; lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun en-dessous; mais en-dessus les deux du milieu sont brunes: toutes les latérales sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un cendré-brun du côté intérieur. Les deux du milieu sont beaucoup plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu de près de deux pouces; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates fermè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus subtus cinereofuscis; superne verò binæ intermediae fuscae sunt: laterales omnes in latere exteriori & apice concolores; in latere interiore cinereofuscae. Binæ rectrices intermediae lateralibus longitudine multò cedunt; laterales autem gradatim majori longitudine pollent ad utrinque extimam usque binas intermedias duorum ferè pollicum longitudine excedentem; unde fit cauda valdè bifurca. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Adanson*.

SECTION IV.

Ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, à savoir celui du *Rale*.

SECTIO IV.

Eæ quæ rostrum habent rectum & lateraliter compressum.

UNICUM genus, *Ralli* scilicet, hanc sectionem constituit.!

Omnes hujus sectionis Tous les Oiseaux de cette
 Aves corpore donantur la- section ont le corps applati
 teraliter compresso. par les côtés.

LXXIV.

Genus Ralli.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:
 Rostrum rectum, lateraliter
 compressum:
 Corpus lateraliter compres-
 sum.

LXXIV.

Le genre du Râle.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de
 membranes; trois devant,
 un derriere:
 La partie inférieure des jambes
 dénuée de plumes:
 Le bec droit & comprimé par
 les côtés:
 Le corps applati par les côtés.

** I. LE RASLE D'EAU.

Voyez Pl. XII. Fig. 2.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines fusco-rufes-
 cente-olivaceis superne vestitus, infernè cinereus, pennis
 in imo ventre apice dilute fulvo marginatis; lateribus ni-
 gricantibus, albo transversim striatis; rectricibus nigrican-
 tibus, utrinque fusco-rufescente-olivaceo fimbriatis

RALLUS. AQUATICUS.

Rallus alis griseis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, ros-
 tro luteo. Rallus aquaticus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 83. sp. 2.*

Rallus aquaticus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 234. hujus icon pef-
 sima Tab. LVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 113. N°. A. 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. N°. 12.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 321. N°. XVI.

Klein. Avi. pag. 103. N°. 2.

Ralla Anglorum & Gallorum ex Gallinularum genere. *Aldrov. Avi.
 Tom. III. pag. 455.*

Ralla Anglorum aquatica. *Jonst. Avi. pag. 110.*

Ortygometra alis fuscis. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 58. sp. 1.*

- Ortygometra subtrus albescens, tergore fulvo, maculis castaneis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXV. sp. 2.*
- Ortygometra Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 455. hujus icon à Bellonio mutuata pag. 456.*
- Gallinula serica. *Gesn. icon. Avi. pag. 101, in qua hujus icon minimè accurata.*
Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31 & insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. 53.
Charlet. Onomazt. pag. 107. N^o. 4.
- Gallinula serica Gesneri, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 235.*
Raj. Syn. Avi. pag. 114. N^o. 4.
- Gallinula, seu Gallinago serica dicta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 470, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Gallinaginis, vel Gallinulæ genus nomine ignoto, quod Samethounle nomino. *Gesn. Avi. pag. 517, in qua hujus icon minimè accurata.*
- Gallinula Holofericea. *Charlet. Exer. pag. 112. N^o. 4.*
- Gallinula chloropus, rarior species. *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 68. hujus icon minimè accurata Tab. 32.*
- Gallinæ aquaticæ species prima de novo adjecta. *Gesn. Avi. pag. 515, in qua hujus icon satis accurata (excepto rostro).*
- Glareola sexta. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 283.*
- Glareola septima. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 283.*
- Glareola septima Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 3.*
- Gallinago cinerea; Glareola septima Schwenckfeldii. *Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 381.*
- Râle d'eau. *Alb. Tom. I. pag. 67; avec une figure passable (excepté le bec) Pl. 77.*
- Ralle noir. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 212; avec une figure peu exacte pag. 213.*
- Ralle, Ralle, Roy & Mere des Cailles. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 49 a, dans laquelle est la même figure.*
- Les Catalans l'appellent, GALLA MAREZA. *Barr.*
- Les Vénitiens, FORZANE ou PORZANA. *Willugh. Alb.*
- Les Allemands, SAMETHOUNLE. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. AESCH-HEUNLEIN. Rzac. AESCH-HEUNLIN; MOTT-HEUNLIN; SCHWARTZ WASSER HEUNLE. Schwenck.*
- Les Anglois, WATER-RAIL. *Willugh. Raj. Sloane. Alb. & quelques-uns BILCOCK ou BROOK-OUZELL. Willugh. Raj. VELVET KUNNER. Charlet.*

Il est à peu près de la longueur du Râle de Genet ou Roi de Cailles. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui

Crassitie Rallum Genistarum sive Ortygometram circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam

extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos unguis undecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda unum pollicem cum octo lineis; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extremus unum pollicem cum quinque lineis, intimus sexdecim lineas; posticus autem quinque cum semi lineas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines verò ex fusco-rufescente nonnihil ad olivaceum vergentes. Scapulares, superioresque caudæ tectrices eodem imbuuntur colore, iisdemque marginibus præditæ sunt. Quæ margines in pennis dorsum vestientibus

de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue un pouce huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derrière cinq lignes & demie. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Il a douze pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un brun-roux tirant un peu sur l'olivâtre sur leurs bords. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur & bordées de même. Cette bordure est extrêmement large sur les plumes du dos & sur les scapulaires. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col;

la poitrine & le haut du ventre sont d'un joli cendré. (Dans quelques individus les plumes de la partie inférieure du col sont bordées de blanchâtre.) Les côtés sont couverts de plumes noirâtres, rayées transversalement de blanc. Celles qui couvrent le bas-ventre, & le haut des jambes sont cendrées & bordées par le bout de fauve clair. Les petites couvertures du dessous de la queue sont fauves : les grandes sont blanches, & seulement terminées de fauve. Les couvertures du dessous des ailes sont rayées transversalement de blanc & de cendré brun. Les petites du dessous, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & bordées d'un brun-roux tirant un peu sur l'olivâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur ; les moyennes sont pareillement brunes, mais elles sont bordées extérieurement d'un brun-roux tirant sur l'olivâtre. La queue est composée de douze plumes d'un noirâtre brillant, & bordées des deux côtés d'un brun-roux tirant sur l'olivâtre. Le demi-bec supérieur est rougeâtre à son origine & noirâtre à son extrémité ; l'inférieur est

& scapularibus sunt latissimæ. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur, collum inferius, pectus & venter supremus eleganti tinguntur cinereo. (In quibusdam individuis pennæ collum inferius obtegentes marginibus gaudent candicantibus). Latera cooperiunt pennæ nigricantes, albo transversim striatæ. Quæ imum ventrem & crurum partem supremam vestiunt, sunt cineræ, fulvo diluto in apice fimbriatæ. Inferiores caudæ tectrices minores fulvæ : majores candidæ, fulvo solummodo terminatæ. Pennæ alas subtus obtegentes albo & cinereo-fusco transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, nigricantes, fusco-rufescente paululum ad olivaceum vergente marginatæ : majores à corpore remotiores fuscæ. Remiges majores sunt quoque fusco imbutæ : minores concolores, sed fusco-rufescente ad olivaceum inclinante exteriorius marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices splendide nigricantes, in utroque latere fusco-rufescente-olivaceo fimbriatæ.

Mandibula superior in exortu rubescens, in extremitate nigricans; inferior verò per totam longitudinem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusco-viridescentes. Juxta aquas degit. *Ex museo Reaumuriano.*

rougeâtre dans toute sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. On le trouve sur le bord des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE PETIT RASLE D'EAU OU LA MAROQUETTE.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines fusco olivaceis, maculis candidis variegatis, superne vestitus, infernè cinereus, albido varius; syncipite, gutture & collo inferiore cinereis; collo superiore saturatè cinereo, maculis albis vario; collo ad latera & pectore cinereo-olivaceis, maculis albis variegatis; lateribus cinereo-olivaceis, albo transversim striatis; reatricibus in medio nigricantibus, ad margines fusco-olivaceis, binis intermediis lineâ candidâ utrinque notatis RALLUS AQUATICUS MINOR SIVE MARUETTA.

- Ochra. *Gesn. icon. Avi. pag. 108, in qua hujus icon minimè accurata.*
 Gallinulæ aquaticæ decimum genus, cui Ochrae nomen fecimus, vulgò Wynkernell appellant. *Gesn. Avi. pag. 513, in qua eadem icon.*
 Gallinula Ochra. *Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31.*
 Gallinula Ochra, quam Germani Wynkernell appellant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 468, in qua hujus icon minimè accurata.*
 Gallinula Ochra Gesneri, quam Germani Wynkernell appellant, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 236.*
Raj. Syn. Avi. pag. 115. N^o. 7.
 Porzana minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 558, in qua hujus icon minimè accurata.*
Jonst. Avi pag. III.
 Porzana Italarum. *Charlet. Exer. pag. 112. N^o. 5.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. N^o. 5.
 On l'appelle en quelques endroits de France COCOUAN.

Les Boulonnois l'appellent PORZANA. *Aldrov.*

Les Milanois , GIRARDINA. *Aldrov.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg , WYNKERNELL. *Gesn. Aldrov.*
Willugh. Raj.

Les Anglois , GIRARDIN. *Charlet.*

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces dix lignes , & jusqu'à celui des ongles de huit pouces onze lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long ; sa queue un pouce neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , quatre lignes & demie ; son pied treize lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , seize lignes , l'extérieur treize lignes , l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derrière cinq lignes & demie. Il a douze pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est cendré ; cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Le sommet de la tête est couvert de plumes noirâtres , bordées d'un brun tirant sur l'olive. La partie supérieure du col est d'un cendré foncé , varié de petites taches blanches. La partie supérieure

Præcedenti multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & decem lineas æquat , & ad extremos unguis octo pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est ; cauda unum pollicem cum novem lineis ; pars crurum plumis denudata quatuor cum semi lineas ; pes tredecim cum semi lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas , extremus tredecim lineas , intimus duodecim cum semi lineas ; posticus autem quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Synciput cinereo imbitur colore ; qui color supra oculos utrinque protenditur. Summum caput vestiunt pennæ nigricantes , fusco ad olivaceum vergente

marginatæ. Pars colli superior saturatè cinerea, minutis maculis albis varia. Partem dorsi supremam obtegunt pennæ in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ, minutis variegatæ maculis candidis, in utroque cujuslibet pennæ latere protensis. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Dorsum infimum & uropygium cooperiunt pennæ nigricantes, fusco-olivaceo in apice tantùm fimbriatæ, minutisque maculis candidis ad latera variegatæ. Guttur tingit color cinereus, ad oculos usque utrinque productus, & supra collum inferius protensus. Collum ad latera, pectusque ex cinereo paululùm ad olivaceum vergunt, minutisque maculis albis variegantur. Latera cooperiunt pennæ similiter cinereo-olivaceæ, albo transversim striatæ. Quæ ventrem & crurum partem supremam obtegunt, sunt cinereæ, albido terminatæ; qui color albidus in imo ventre & crurum parte suprema paululùm ad fulvum dilutum vergit. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutè fulvæ. Pennæ alas subtus obtegentes albæ, cinereo

du dos est couverte de plumes noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre sur leurs bords, & variées de petites taches blanches, qui s'étendent sur chaque côté de chaque plume vers ses bords. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, bordées par le bout seulement de brun-olivâtre, & variées sur leurs côtés de petites taches blanches. La gorge est cendrée; cette couleur s'étend de chaque côté jusqu'aux yeux, ainsi que sur la partie inférieure du col. Les côtés du col & la poitrine sont d'un cendré tirant un peu sur l'olivâtre, & varié de petites taches blanches. Les côtés sont couverts de plumes du même cendré, rayé transversalement de blanc. Celles qui couvrent le ventre & le haut des jambes sont cendrées, & terminées de blanchâtre; cette dernière couleur sur le bas-ventre & le haut des jambes tire un peu sur le fauve clair. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair. Celles du dessous des ailes sont blanches, & variées de cendré. Le bord de l'aîle, au-dessus & au-dessous du pli qui répond

à celui du poignet , est blanc. Les plus petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-olivâtre , & variées de petites taches blanches , placées des deux côtés sur leurs bords : les grandes les plus proches du corps sont noirâtres dans leur milieu , d'un brun-olivâtre sur leurs bords , & variées de bandes blanches transversales & en zigzags : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-olivâtre du côté extérieur , & d'un cendré-brun du côté intérieur. La première des plumes de l'aile est blanche du côté extérieur depuis son origine jusque vers son bout , qui est d'un brun-olivâtre ; son côté intérieur est d'un cendré-brun : toutes les autres (excepté les cinq plus proches du corps) sont d'un brun-olivâtre du côté extérieur , & d'un cendré-brun du côté intérieur : enfin les cinq plus proches du corps sont noirâtres dans leur milieu , d'un brun-olivâtre sur leurs bords , & variées sur leur côté extérieur seulement de lignes blanches transversales & en zigzags. Ces cinq dernières plumes sont longues & pointues , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de

variæ. Alarum margines , supra & infra articulum carpo humano respondentem , candidæ. Superiores ipsarum tectrices minimæ & mediæ fusco olivaceæ , minutisque variegatæ maculis albis , in utroque latere supra margines positis : majores corpori viciniore in medio nigricantes , ad margines fusco-olivaceæ , & tæniis transversis undatisque candidis variæ : majores à corpore remotiores in latere exteriori fusco-olivaceæ , in interiore cinereo-fuscæ. Remix prima in latere exteriori ab ipsius exortu versùs apicem usque candida , ad apicem fusco-olivacea , in latere autem interiore cinereo-fusca : reliquæ omnes remiges (quinque tamen corpori viciniorebus exceptis) exterius fusco-olivaceæ , interius cinereo-fuscæ : quinque tandem corpori viciniore in medio nigricantes , ad margines fusco-olivaceæ , lineis transversis & undatis albis in latere tantùm exteriori variegatæ. Quæ quinque nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ , & dum alâ complicatur , majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam com-

ponunt duodecim rectrices in medio nigricantes , ad margines fusco - olivaceæ : binæ intermediæ exiguâ in super lineâ candidâ , ab ipsarum exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque secundùm margines protensâ , in utroque latere notantur. Rostrum , unguis que flavo-olivacei. Pars crurum plumis denudata & pedes fusco - olivaceo imbuti. Juxta stagnorum & fluviorum ripas versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

douze plumes noirâtres dans leur milieu , & d'un brun-olivâtre sur leurs bords : les deux du milieu sont de plus marquées sur chacun de leurs côtés d'une petite ligne blanche , qui s'étend tout le long de leurs bords depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur. Le bec & les ongles sont d'un jaune - olivâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes , & les pieds sont d'un brun-olivâtre. On le trouve sur le bords des étangs & des rivieres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

** 3. LE RASLE DE GENET OU ROI DE CAILLES.

Voyez Pl. XIII. Fig. 2.

Rallus pennis in medio nigricantibus , ad margines griseo-rufescentibus superne vestitus , infernè albo - rufescens ; genis , collo inferiore & pectore dilutè cinereis ; lateribus rufis , albo transversim striatis ; rectricibus in medio nigricantibus , ad margines griseo - rufescentibus RALLUS GENISTARUM SIVE ORTYGOMETRA.

Rallus alis rufo-ferrugineis. *Crex. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 83. sp. 1.*

Rallus terrestris. *Klein. Avi. pag. 102. N^o. 1.*

Crex. Gesn. Avi. pag. 362.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 428.

Charlet. Exer. pag. III. N^o. III.

Charlet. Onomazt. pag. 106. N^o. III.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 58. sp. 2.

Ortygometra alis rufo-ferrugineis. *Faun. Succ. Linn. N^o. 162.*

Ortygometra tota rufa , plerumque in Genistis degens. *Barr. Ornith.*

Class. III. Gen. XXXV. sp. 1.

Ortygometra. *Gesn. Avi. pag. 360. hujus icon minimè accurata pag. 361.*

Gefn. icon. Avi. pag. 71, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 174. hujus icon non satis accurata pag. 176.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 313.

Bell. Obs. pag. 19.

Jonst. Avi. pag. 48. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII: altera icon non satis accurata Tab. XXVII: & tertia icon à Gesnero mutuata eadem Tab. sub titulo, Coturnix.

Charlet. Exer. pag. 83. N°. XIV.

Charlet. Onomazt. pag. 75. N°. XIV.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.

Moehr. Avi. Gen. 85.

Ortygometra Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 122. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.

Raj. Syn. Avi. pag. 58. N°. A. 8.

Ortygometra Aldrovandi, Gesneri; Cenchramus Plinii; Coturnix magna; Rex Coturnicum; Rallus terrestris. Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 400.

Coturnico-mater Scaligero. Charlet.

Ralle rouge, ou de Genet. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 214, dans laquelle il y a une figure peu exacte.

Ralle rouge, ou Ralle de Genet. Bel. Portr. d'Ois. pag. 49 b, dans laquelle est la même figure.

Roy, ou Mere des Cailles. Alb. Tom. I. pag. 27; avec une figure mal coloriée Pl. 32.

Les Grecs l'appellent Ορτυζομήτρα. Bel. Gefn. Aldrov. Schwenck. Κρηξ. Aldrov.

Les Italiens, RE DE QUAGLIE. Bel. Gefn. Aldrov. Willugh.

Les Allemands, SCHRYCK. Willugh. SCHRYK; WACHTELN KOENIG.

Gefn. Aldrov. WACHTEL KOENIG. Schwenck. Rzac. ALTE KNECHT. Schwenck.

Les Silésiens, SCHNERCKER. Schwenck.

Les Polonois, CHROSCIEL; DERKACZ; KASPER. Rzac.

Les Suédois, KORN KNARREN. Linn.

Les Uplandois, AENGSAERPA. Linn.

Les Anglois, DAKER-HEN. Gefn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.

RAIL. Willugh. Raj. LAND RAIL. Alb.

Les Ecoffois, CORN-CREK. Sibbald.

Il est un peu plus gros & plus grand qu'une Caille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces six lignes, & jus-

Magnitudine & crassitie Coturnicem paululum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex

Sex lineas æquat, & ad extremos unguis decem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; trium digitorum anteriorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet, extimus quatuordecim lineas longus, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem solummodo quinque lineas. Antici digiti rudimento membranæ in exortu inter se connectuntur. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Superiores caudæ tectrices & scapulares concolores; at tamen ex scapularibus exteriores nullo modo nigricant, & ad rufum magis inclinant. Guttur ex albo rufescit. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, collum

Tom. V.

qu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce cinq lignes de long, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derrière cinq lignes seulement. Les doigts antérieurs sont réunis à leur origine par un très-petit commencement de membrane. Il a seize pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur; cependant les plus extérieures de ces dernières n'ont rien de noirâtre, & tirent plus sur le roux. La gorge est d'un blanc-roussâtre. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré clair, les bords des plu-

X

mes de la poitrine tirant un peu sur le rouffâtre. Le ventre est d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de rouffâtre. Les côtés sont roux & rayés transversalement de blanc. Le haut des jambes est rouffâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont rouffes dans leur milieu, & marquées d'une large bordure blanche. Celles du dessous des aîles sont entièrement rouffes. Le bord de l'aîle est dans toute sa longueur d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de rouffâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps sont rouffes : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un fauve clair du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, qui sont d'un gris clair en-dessous ; mais en-dessus la première est d'un fauve très-clair du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur : les cinq suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la sixième inclusivement, sont d'un gris-brun du côté intérieur & à leur bout, & fauves du côté extérieur : les treize qui suivent, sçavoir depuis la septième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont entièrement fauves :

inferius & pectus diluto tinguntur cinereo, pennarum pectus cooperientium marginibus nonnihil ad rufescentem colorem inclinantibus. Venter albet cum lævissima rufescentis mixtura. Latera sunt rufa, albo transversim striata. Crurum pars suprema rufescit. Inferiores caudæ tectrices in medio rufæ, latâ margine albâ præditæ. Pennæ alas subtus obtegentes penitus rufæ. Alarum margines per totam longitudinem albæ, lævissimâ rufescentis mixturâ adumbratæ. Superiores ipsarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, rufæ : majores à corpore remotiores in latere exteriori dilutè fulvæ, in interiori griseo-fuscæ. Alam componunt viginti tres remiges subtus dilutè griseæ ; superne verò prior est in latere exteriori dilutissimè fulva, in latere interiori griseo-fusca : quinque proximè sequentes, à secunda scilicet ad sextam usque inclusivè, in latere interiori & apice griseo-fuscæ, in latere exteriori fulvæ : tredecim quæ sequuntur, à septima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, penitus fulvæ : quatuor corpori

finitimæ pennis scapularibus concolores. Sex remiges corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus. Mandibula superior griseo-fusca, inferior grisea. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter grisei; ungues verò colore saturatiore imbuti sive griseo-fusci. Inter Ericas humi nidificat; & sexdecim aut octodecim ova ponit. Pullos recenter exclusos vestit pennitùs nigra lanugo. *Ex museo Realmuriano.*

les quatre plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires. Les six plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noires dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Le demi-bec supérieur est d'un gris-brun, l'inférieur est gris. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de cette dernière couleur; & les ongles sont d'une couleur plus foncée, ou gris-bruns. Il fait son nid par terre dans les Bruyères; & pond jusqu'à seize ou dix-huit œufs. Ses petits en naissant sont couverts d'un duvet entièrement noir. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. LE RASLE DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XIV. Fig. 1.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestitus, infernè fusco & griseo transversim striatus; taniâ supra oculos albidâ, per oculos castaneo-fuscâ; collo inferiore griseo-rufescente, griseo-fusco transversim striato; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus, lateralibus interiùs spadiceo maculatis RALLUS PHILIPPENSIS.

On l'appelle aux Isles Philippines TIKLIN.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue deux pouces sept lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, neuf lignes; son pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere six lignes & demie. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Il a quatorze pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-rouffâtre sur leurs bords. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur; cependant quelques-unes de ces dernières sont marquées de quelques petites taches blanches, placées sur leurs bords. De cha-

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices æquat, & ad extremos unguis duodecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & septem lineas; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes octodecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem sex cum semi lineas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Tectrices caudæ superiores, scapularesque pennæ concolores; attamen ex scapularibus aliquot minutis quibus-

dam maculis candidis, ad ipsarum margines collocatis, sunt notata. In utroque capitris latere tania extat albida, ab exortu rostri orta, supra oculos ducta, & versus occipitium usque protensa. Infra taniam hanc altera adest tania majorem latitudinem obtinens, castaneo - fusca, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & pariter versus occipitium usque protensa. Guttur fordide albicat. Pars colli inferiore est ex griseo rufescens, minutisque taniis transversis griseo-fuscis, minimè conspicuis striata. Pectus, venter & latera fusco & griseo transversim quoque striantur; qui color griseus in ventre ferè candicat. Crurum suprema pars ex griseo-rufescit. Inferiores caudæ tectrices sunt fusco-nigricantes, albo-rufescente transversim striata. Pennæ alas subtus obtegentes cinereo-fuscæ, & quælibet taniâ insignitur transversâ candicante, eodemque colore terminatur. Tectrices alarum superiores minimæ sunt griseo-rufescentes: mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, in exortu fuscæ, griseo-rufescente terminatæ, & per totam longitudinem maculis,

que côté de la tête est une bande blanchâtre, qui part de l'origine du bec, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. Au-dessous de cette bande en est une plus large, d'un marron rembruni, qui part des coins de la bouche, passe par les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge est d'un blanc sale. La partie inférieure du col est d'un gris-rouffâtre, rayé de petites bandes transversales d'un gris-brun, fort peu apparentes. La poitrine, le ventre & les côtés sont rayés transversalement de brun & de gris; cette dernière couleur est presque blanchâtre sur le ventre. Le haut des jambes est d'un gris-rouffâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-noirâtre, & rayées transversalement de blanc-rouffâtre. Celles du dessous des ailes sont d'un cendré-brun, marquées chacune d'une bande transversale blanchâtre, & terminées de la même couleur. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-rouffâtre: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes à leur origine, terminées de gris-rouffâtre, & marquées dans toute leur longueur de taches, les unes de

rouge-bai & les autres blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & rayées transversalement de rouge-bai. Les plumes de l'aile bâtarde sont brunes, marquées sur leur côté extérieur de taches rouffâtres, sur leur côté intérieur de bandes transversales blanches, & terminées de gris-rouffâtre. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les deux premières sont brunes, & marquées des deux côtés de taches transversales qui sont d'un rouge-bai vers la tige de la plume & blanches en approchant vers ses bords : les seize suivantes, sçavoir depuis la troisième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont brunes, & rayées de larges bandes transversales d'un rouge-bai; dans quelques-unes de ces plumes les bandes transversales blanchissent un peu en approchant vers le bord intérieur de la plume : les six plus proches du corps sont noirâtres dans leur milieu, d'un gris-rouffâtre sur leurs bords, & marquées de taches à peu près rondes, dont celles qui sont placées vers l'origine de la plume, sont d'un rouge-bai, & celles qui sont placées vers son extrémité, sont blanches. Ces six plumes ont d'autant moins de ces taches,

aliis spadiceis, aliis candidis notatæ : majores à corpore remotiores fuscæ, spadiceo transversim striatæ. Ala nottha pennis conflatur fuscis, maculis rufescentibus in latere exteriori insignitis, in latere interiore tæniis transversis albis notatis, & griseo-rufescente terminatis. Alam componunt viginti quatuor remiges : binæ priores sunt fuscæ, in utroque latere maculis notatæ transversis versus remigis scapum spadiceis, & versus margines procedendo candidis : sexdecim proximè sequentes, à tertia scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, fuscæ, latis tæniis transversis spadiceis striatæ; in quibusdam ex istis remigibus tæniæ transversæ, versus marginem remigis interiorum procedendo, paululum canescunt : sex tandem corpori finitimæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes, subrotundis insignitæ maculis, quarum quæ versus remigis exortum collocantur, sunt spadiceæ, quæ verò remigis extremitatem variegant, candidæ. Quæ sex remiges eò minori istarum macularum numero insigniuntur, quò fiunt cor-

pori viciniore. Sex istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Remix prima secundæ octo linearum longitudine cedit; secunda verò reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes : lateralium insuper latus interius minutis quibusdam maculis spadiceis insignitur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

qu'elles sont plus proches du corps. Ces six dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La première des plumes de l'aîle est plus courte de huit lignes que la seconde, qui est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-rouffâtre sur leurs bords : le côté intérieur des latérales est de plus marqué de quelques petites taches de rouge - bai. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris. On le trouve aux *Iles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

** 5. LE RASLE RAYÉ DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XIV. Fig. 2.

Rallus superne fusco-nigricans, pennis maculis transversis albidis utrinque notatis, infernè cinereo-olivaceus; colli superioris parte supremâ castaneâ; gutture albo-rufescente; imo ventre, lateribus & rectricibus fusco-nigricantibus, albido transversum striatis . . . RALLUS PHILIPPENSIS STRIATUS.

On l'appelle aux Iles Philippines TIKLIN.

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab

Il est beaucoup moins grosse que le précédent. Sa longueur

depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes & demie de long; sa queue un pouce six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'extérieur quatorze lignes & demie, l'intérieur treize lignes; & celui de derrière six lignes. Il a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est variée de marron & de noirâtre. Le haut de la partie supérieure du col est d'un marron sans mélange d'autre couleur. Le bas de la partie supérieure du col, le dos & les plumes scapulaires sont d'un brun-noirâtre, chaque plume étant marquée des deux côtés de taches transversales blanchâtres. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun plus clair, & chaque plume est marquée de même des deux côtés de taches transversales blanchâtres. La gorge est d'un blanc-roussâtre.

apice rostri ad caudam extremam octo pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem cum sex lineis; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim cum semi lineas, extimus quatuordecim cum semi lineas, intimus tredecim lineas; & posticus sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est tredecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput superius castaneo & nigricante variegatur. Colli superioris pars suprema castaneo imbitur absque ulla alterius coloris mixtura. Colli superioris pars infima, dorsum & scapulares pennæ sunt fusco-nigricantes, unaquâque pennâ maculis transversis albidis utrinque notatâ. Uropygium & superiores caudæ tectrices tingit color dilutiùs fuscus, & quælibet penna similiter maculis transversis albidis utrinque

utrinque insignitur. Guttur ex albo rufescit. Caput ad latera, pars colli inferior, pectus & venter supremus ex cinereo ad olivaceum vergunt. Venter imus, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex fusco nigricant, & albido transversim striantur. Crurum suprema pars grisea, tæniis transversis albidis pariter striata. Superiores alarum tectrices minores sunt fusco-fulvæ, tæniis transversis candicantibus utrinque notatæ : majores à corpore remotiores fusco-fulvæ quidem, sed tæniis destitutæ : majores corpori finitimæ fusco-nigricantes, albido transversim striatæ. Remiges alarum primores sunt quoque fusco-fulvæ : proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum occupant, fusco imbutæ nonnihil saturatiore : corpori finitimæ fusco-nigricantes : omnes autem strictioribus insigniuntur tæniis transversis, in latere exteriori albo-rufescentibus, in interiori candidis. Ex remigibus corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè

Les côtés de la tête, la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre. Le bas-ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont d'un brun-noirâtre, rayé transversalement de blanchâtre. Le haut des jambes est gris, & rayé pareillement de bandes transversales blanchâtres. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-fauve, chacune étant marquée des deux côtés de bandes transversales blanchâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-fauve & sans rayures ; les grandes les plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & rayées transversalement de blanchâtre. Les premières plumes de l'aile sont d'un brun-fauve : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un brun un peu plus foncé : & les plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre : toutes sont marquées d'étroites bandes transversales, qui sont d'un blanc-rouffâtre du côté extérieur, & blanches du côté intérieur. De ces plumes les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile,

Les troisième & quatrième plumes de l'aile sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un brun-noirâtre, & rayées d'étroites bandes transversales blanchâtres. Le bec est de couleur de corne claire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-brun; & les ongles gris. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. Turgot* qui le conserve dans son cabinet.

pertingunt. Ex remigibus tertia & quarta reliquarum omnium longitudinem antecellunt. Cauda duodecim constat rectricibus fusconigricantibus, strictis tæniis transversis albidis striatis. Rostrum dilutè corneo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-fusci; ungues verò grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in museum *D. Turgot* missus est.

** 6. LE RASLE A COLLIER DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XV. Fig. 1.

Rallus superne fuscus, ad olivaceum obscurum inclinans; infernè fuliginosus, albo transversim striatus; tæniâ infra oculos candidâ; fasciâ supra pectus transversâ castaneâ; rectricibus fuscis, oris exterioribus ad olivaceum obscurum vergentibus RALLUS PHILIPPENSIS TORQUATUS.

On l'appelle aux *Isles Philippines* TIKLIN.

Il est un peu plus gros que le *Râle de Genet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est

Crassitie *Rallum Genistarum* paululùm excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem & octo lineas longum est; cauda unum pollicem & no-

venem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus octodecim lineas, intimus unum pollicem & quinque lineas; & posticus octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & trium linearum intervallum distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitæ & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex fusco ad olivaceum obscurum paululum inclinant. Caput ad latera sive genæ, gutturque fuliginoso imbuuntur colore. In utroque capitæ latere tænia extat candida, ab oris angulis orta, infra oculos ducta, ad collum usque protensa. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes fuliginei sunt coloris, strictisque tæniis transversis albis striantur. Crurum pars suprema grisea, strictis tæniis transversis candicantibus pa-

dégarnie de plumes, dix lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce six lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derrière huit lignes. Il a un pied neuf pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun tirant un peu sur un olivâtre sombre. Les côtés de la tête ou les joues, & la gorge sont de couleur de fuye. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusqu'au col. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont de couleur de fuye, & rayés d'étroites bandes transversales blanches. Le haut des jambes est gris, & rayé pareillement d'étroites bandes transversales blanchâtres. Au-dessus de la poitrine est une bande transversale d'un beau marron, large de huit ou neuf lignes;

qui forment une espece de collier. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait brunes, mais bordées extérieurement d'une couleur un peu plus claire. L'aile est composée de vingt-deux plumes brunes, & bordées extérieurement d'une couleur un peu plus claire : les trois premières de ces plumes sont marquées sur leur côté intérieur de bandes transversales blanches : les six suivantes, sçavoir depuis la quatrième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont de même marquées sur leur côté intérieur de bandes transversales d'un marron-roussâtre. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. Les troisième & quatrième plumes de l'aile sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes brunes, bordées extérieurement d'un brun tirant un peu sur un olivâtre sombre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-brun ; & les ongles

riter striata. Supra pectus fascia extat transversa eleganter castanea, octo aut novem lineas lata, torquem quodammodo efficiens. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores penitus fuscæ, colore tamen nonnihil dilutiore exteriùs simbriatæ. Alam componunt viginti duo remiges fuscæ, fusco paululùm dilutiore in latere exteriore marginatæ : ex istis remigibus tres primores taniis transversis albis in latere interiore notantur : sex proximè sequentes, à quarta scilicet ad nonam usque inclusivè, taniis transversis castaneo-rufescentibus interiùs similiter insigniuntur. Ex remigibus corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Ex remigibus tertia & quarta reliquarum omnium longitudinem superant. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ, oris exterioribus ex fusco ad olivaceum obscurum nonnihil vergentibus præditæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque

sunt griseo-fusci; ungues verò grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Turgot* missus est. gris. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. Turgot*, qui le conserve dans son cabinet.

** 7. LE RASLE BRUN DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XV. Fig. 2.

Rallus superne fuscus, infernè fusco-vinaceus, gutture dilutiore; imo ventre griseo-fusco; tectricibus caudæ inferioribus nigris, albo transversim striatis; reatricibus fuscis...
RALLUS PHILIPPENSIS FUSCUS.

On l'appelle aux *Isles Philippines* TIKLIN.

Rallo aquatico minori sive Maruettæ paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda unum pollicem cum novem lineis; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus undecim lineas; posticus autem solummodo quinque lineas. Omnes digiti sunt ad exortum

Il est un peu moins gros que le *petit Râle d'eau* ou la *Marouïette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière cinq lignes seulement. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Il a dix pouces six lig-

nes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie postérieure de la tête , le dessus du col , le dos & le croupion sont bruns. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie antérieure de la tête , les joues , la gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le haut du ventre & les côtés sont d'un joli brun-vineux ; cette couleur est beaucoup plus claire sous la gorge qu'ailleurs. Le bas - ventre & le haut des jambes sont d'un gris-brun. Les couvertures du dessous de la queue sont noires , & rayées transversalement de blanc. Celles du dessous des ailes sont pareillement noires , & marquées seulement de quelques petits points blancs. Les petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont brunes : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un gris-brun du côté extérieur , & brunes du côté intérieur. Les grandes plumes de l'aile sont de la même couleur que ces dernières couvertures : les moyennes sont entièrement brunes. La queue est composée de douze plumes d'un fort beau

usque à se invicem discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est decem pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protrahuntur. Capitis posterior pars , sicut & colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt fuscæ. Capitis partem anteriorem , genas , guttur , collum inferius , pectus , ventrem supremum & latera tingit color fusco-vinaceus elegans ; sub gutture multò dilutior quàm in reliquis prædictis partibus. Ventrem infimum & crurum partem supremam vestiunt pennæ griseo-fuscæ. Inferiores caudæ rectrices sunt nigræ , albo transversim striatæ. Pennæ alas subtus obtegentes similiter nigræ , quibusdam tantum punctulis candidis notatæ. Superiores alarum rectrices minores , sicut & majores corpori finitimæ , fuscæ : majores à corpore remotiores in latere exteriori griseo-fuscæ , in interiori fuscæ. Remiges majores novissimè dictis rectricibus concolores : minores penitus fuscæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus

elegantissimè fuscis. Rostrum quoque fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguetque flavi. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *musæum D. Aubry* missus est.

brun. Le bec est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

8. LE RASLE DE VIRGINIE.

Rallus superne fuscus, infernè fusco-rufescens; rectricibus fuscis . . . RALLUS VIRGINIANUS.

Rallus terrestris Americanus. *Klein. Avi. pag. 103. N°. 4.*
Râle de l'Amérique. Catesb. Tom. I. pag. 70; avec une figure exacte Pl. 70.
Les Anglois l'appellent SOREE. Catesb.

Rallo aquatico nonnihil crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos unguet octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda octodecim lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; & posticus septem lineas. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attin-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue dix-huit lignes; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière sept lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jus-

qu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, & le croupion sont bruns. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un brun-rouffâtre. Les plumes de l'aîle sont tout - à - fait brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. Il devient très-gras en Automne, & est alors très-bon à manger. On le trouve en *Virginie*.

gunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ. Scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex fusco rufescunt. Alarum remiges sunt penitus fuscæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusci. Per Autumnum maximè pinguescit, & tunc in cibis delicatissimus. Habitat in *Virginia*.

SECTION V.

SECTIO V.

Ceux qui ont le bec menu.

Eæ quæ rostrum habent gracile.

CETTE Section contient trois genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la longueur du bec & par son extrémité ou lisse ou raboteuse. Les uns ont le bec de moyenne longueur, droit, & dont le bout est obtus &

IN illa sectione tria continentur Avium genera, longitudine rostri & ipsius apice sive levi sive rugoso à se invicem discrepantia. Aliæ enim rostro donantur mediæ longitudinis, recto; ipsius apice obtuso & levi, ut



Fig. 2.

2. Râle d'eau.






Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pousces

1. Perdrix-de-mer.

2. Râle d'eau.

Dessiné et Gravé par Martin.





Fig. 2

2. Râle de Genet ou Roi de Cailles.






Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces

1. Petit Râle d'eau ou Marouïette.

2. Râle de Genet ou Roi de Cailles.

Dessiné et Gravé par Martinet.






Fig. 1.

2. Râle rayé des Philippines.







Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Râle des Philippines.

2. Râle rayé des Philippines.



1. Gull (Herring Gull) - *Larus argentatus*



2. Râle brun des Philippines.





Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces pour la 1^{re} Figure.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Râle à collier des Philippines.

2. Râle brun des Philippines.



ut *Tringa* : aliæ rostro longissimo præditæ sunt. Inter quas aliæ rostrum habent subrectum, sursum modicè tendens; ipsius apice obtuso & levi, ut *Limosa*: aliæ rostrum planè rectum; ipsius apice obtuso & rugoso, ut *Scolopax*.

lisse, comme le *Beccasseau* : les autres ont le bec très-long. De ces derniers les uns ont le bec plutôt recourbé en en-haut que droit, & dont le bout est obtus & lisse, comme la *Barge* : les autres ont le bec tout-à-fait droit, & dont le bout est obtus & raboteux, comme la *Beccasse*.

LXXV.

LXXV.

Genus Tringæ.

Le genre du Beccasseau.

Hujus character est
 Digniti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plumis denudata:
 Rostrum gracile, mediæ longitudinis, rectum; ipsius apice obtuso & levi.

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière:
 La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
 Le bec menu, de moyenne longueur, droit, & dont le bout est obtus & lisse.

** I. LE BECCASSEAU, APPELLÉ VULGAIREMENT
 CUL-BLANC.

Voyez Pl. XVI. Fig. 1.

Tringa superne splendide fusca, maculis candicantibus varia, inferne alba; tæniâ supra oculos candidâ; collo inferiore cinereo-fusco maculato; lateribus cinereo-fuscis, albo transversim striatis; restrictibus binis intermediis in exortu albis, apice fusco-nigricantibus, albo transversim striatis, lateralibus candidis, ad apicem fusco-nigricante transversim striatis TRINGA.

- Tringa rostri apice punctato ; pedibus livido-virescentibus , dorso fusco-viridi nitido. *Faun. Suec. Linn. N^o. 146.*
- Tringa rostri apice punctato , pedibus virescentibus , dorso fusco-viridi nitido. Ochropus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 8.*
- Tringa nigra albo punctata , pectore maculato , abdomine subalbido , pedibus virescentibus. *Faun. Suec. Linn. N^o. 152.*
- Tringa rostro lævi , pedibus virescentibus , corpore albo punctato , pectore subalbido. Glareola. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 11.*
- Tryngas. *Gesn. Avi. pag. 501.*
- Trynga. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 480. hujus icon minimè accurata pag. 481.*
- Trynga alia , seu secunda. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 480. hujus icon minimè accurata pag. 482.*
- Tringa Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 222. hujus icon minùs accurata Tab. LV ; & insuper altera icon minimè accurata Tab. LVI, sub titulo , Cinclus Bellonii.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 108. N^o. A. 7.*
- Tringa prima. *Jonst. Avi. pag. 111. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53 , sub titulo , Trynga.*
- Tringa tertia. *Jonst. Avi. pag. 112.*
- Tringa alia , seu tertia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 480. hujus icon minùs accurata pag. 483.*
- Trynga altera. *Jonst. Avi. pag. 112. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53.*
- Tringa tertia Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 109. N^o. 8.*
- Tringa tertia Aldrovandi , Giaroncello , & Pinirolo Italis dicta. *Willugh. Ornith. pag. 223.*
- Gallinula pedibus viridibus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 8.*
- Cinclus. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 2.*
- Cinclus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 480.*
- Cinclus tertius. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 490. hujus icon non satis accurata pag. 492.*
- Cinclus tertius Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 227.*
- Raj. Syn. Avi. pag. 110. N^o. 14.*
- Cincli congener altera. *Jonst. Avi. pag. 112. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53 , sub titulo , Cinclus.*
- Rhodopus. *Gesn. icon. Avi. pag. 106 , in qua hujus icon pessima.*
- Gallinulæ aquaticæ quintum genus , quod Rhodopodem appellamus ; vulgus Germanicum Steingaellyl. *Gesn. Avi. pag. 508 , in qua eadem icon.*
- Gallinula Rhodopus. *Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31.*
- Gallinula Rhodopos , five phœnicopos. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 456. hujus icon pessima pag. 457.*

LES OISEAUX, Classe III. Ordre XVII. 179

- Gallinula Rhodopus, sive phœnicopus Gefneri. *Willugh. Ornith. pag. 223.*
- Gallinæ aquaticæ species fecunda de novo adjecta. *Gesn. Avi. pag. 516, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Glareola octava. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 283.*
- Glareola octava Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 7.*
- Glareola quarta. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 282.*
- Glareola quarta Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 4.*
- Ochropus medius. *Gesn. icon. Avi. pag. 107, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 463.*
- Gallinulæ aquaticæ octavum genus, vulgò dictum Mattnillis: nobis Ochropus medius. *Gesn. Avi. pag. 511, in qua hujus icon non satis accurata.*
- Gallinula aquatica octava Gefneri: Ochropus medius ejusdem. *Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 380.*
- Gallinula Ochropus. *Charlet. Exer. pag. 112. N^o. 3.*
- Gallinula Ochropus medius. *Jonst. Avi. pag. 110.*
- Gallinula Ochra. *Charlet. Onomazt. pag. 107. N^o. 3.*
- Porphyrio nigricans, pedibus & rostro roseis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp. 5.*
- Steingallell Leonardi Baltneri. *Willugh.*
- Autre Beccassine. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 216.*
- Les Grecs l'appellent Τρυγίας. *Gensf. Κικυλλος. Bel.*
- Les Boulonnois, GIAROLO. *Aldrov. Jonst. GIARONCELLO; PINIROLO. Aldrov. Jonst. Willugh. Raj. SGAINOLO. Aldrov.*
- Les Allemands, STEINGAELLYL. *Gesn. Aldrov. Willugh. BUNDT WASSER HEUNLIN; GESCHECKT MOTT HEUNLE. Schwenck. GREUN-FEUSSEL. Schwenck. Rzac.*
- Les Allemands aux environs de Strasbourg, MATTKNILLIS. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*
- Les Suédois, HORSJJOEK. *Linn.*

Pluviali aureæ paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis novem pollices & quinque lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque unum polli-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes

de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derrière quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a quinze pouces neuf lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un cendré-brun. Les joues & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un cendré-brun dans leur milieu, & blanchâtres sur leurs bords. Celles qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un brun brillant, & variées sur chacun de leurs bords de petites taches blanchâtres. Le croupion est couvert de plumes brunes, variées de même sur chacun de leurs bords de très-petites taches blanchâtres, & de plus bordées de la

cem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim cum semi lineas, intimus decem cum semi lineas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum & novem linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput superius ex cinereo fusciscit. Genas & partem colli superiorem vestiunt pennæ in medio cinereo-fuscæ, ad margines candicantes. Quæ dorsum cooperiunt, sicut & scapulares, sunt splendide fuscæ, in utraque margine minutis maculis candicantibus variæ. Uropygium pennis vestitur fuscis, in utraque pariter margine minutissimis maculis albidis variegatis,

eodemque colore infuper in apice fimbriatis. In utroque capitis latere latiuscula extat tænia candida, ab exortu mandibulæ superioris orta, & supra oculos protensa. Infra quam tæniam altera adest fascia cinereo - fusca, ab exortu quoque mandibulæ superioris orta, & ad oculum usque producta. Guttur albicat. Partem colli inferiorem obtegunt pennæ candidæ, maculis cinereo - fuscis in medio insignitæ. Pectus, venter & crurum suprema pars albert. Tectrices caudæ superiores & inferiores concolores. Pennæ alas subtus & latera cooperientes sunt cinereo-fuscæ, albo transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & maiores corpori finitimæ, fusco imbutæ nonnihil quàm in dorso saturatiore, & in utraque margine minutis maculis candicantibus variegatæ: majores à corpore remotiores fusco - nigricantes & immaculatæ. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum novemdecim primores ex fusco nigricant; quinque corpori viciniore eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur, & in exteriori margine maculis

même couleur par le bout. De chaque côté de la tête est une assez large bande blanche, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'au-dessus des yeux. Au-dessous de cette bande en est une autre d'un cendré-brun, qui part de même de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes blanches, marquées dans leur milieu de taches d'un cendré-brun. La poitrine, le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Celles du dessous des ailes & les côtés sont d'un cendré-brun, rayé transversalement de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun un peu plus foncé que celui du dos, & variées sur chacun de leurs bords de petites taches blanchâtres: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun - noirâtre & sans taches. L'aile est composée de vingt-quatre plumes: les dix-neuf premières sont d'un brun-noirâtre: les cinq plus proches du corps sont du même brun que le dos, & variées sur

leur bord extérieur de taches blanchâtres. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile; dont la première est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont blanches à leur origine; le reste est d'un brun-noirâtre, & rayé des deux côtés de bandes transversales blanches: toutes les latérales sont blanches, & rayées vers leur extrémité seulement de larges bandes transversales d'un brun-noirâtre: ces plumes ont d'autant moins de ces bandes, qu'elles sont plus extérieures; de façon que la plus extérieure de chaque côté n'en a qu'une seule: celle qui la suit immédiatement en a deux du côté extérieur & une du côté intérieur: la troisième en a deux de chaque côté: la quatrième en a trois du côté extérieur & deux du côté intérieur: la cinquième enfin en a quatre du côté extérieur & deux du côté intérieur. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un verd obscur, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, & les pieds sont de couleur de plomb verdâtre; &

candicantibus variegantur. Quæ novissimè dictæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt; remix autem prior omnium longissima. Caudam componunt duodecim rectrices: binæ intermediae in exortu albæ, in reliqua longitudine fusco-nigricantes, in utroque latere albo transversim striatæ: laterales omnes candidæ, latis quoque tæniis transversis fusco-nigricantibus versùs ipsarum apicem tantùm striatæ: quæ rectrices eò minori insigniuntur tæniarum numero, quò exteriores fiunt; ita ut utrinque extrema unicâ tantùm sit notata tæniâ: proximè sequens binis in latere exteriori, unicâ in latere interiori: tertia in utroque latere duabus: quarta exterius tribus, binis interiùs: quinta tandem in latere exteriori quatuor, in interiori binis tæniis sit insignita. Oculorum irides avellanæ. Rostrum obscurè viride, attamen apice nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque plumbeo-viridescentes; ungues verò nigri. Solitaria est; attamen pariendi tempore binæ volant, mas & foemina. Pesci-

narum, lacum, fluviorum-
que ripas frequentat. *Ex
musæo Realmuriano.*

les ongles noirs. Il est solitaire,
excepté dans le temps de l'a-
mour, où il s'associe avec sa
femelle. On le trouve sur les
bords des étangs, des lacs &
des rivières. *Du cabinet de M.
de Reaumur.*

Exquisito sapore gaudet
hæc Avis; ideoque illam
venantur aucupes: quam ob
causam ad ripas aquarum,
quas frequentat, virgulas
apponunt glutine imbutas,
quibus ope capitur.

Cet Oiseau est très-bon à
manger; c'est pourquoi on en
fait la chasse: elle consiste à
tendre aux bords des eaux,
qu'il fréquente, des gluaux dans
lesquels il vient se prendre.

** 2. LA GUIGNETTE.

Voyez Pl. XVI. Fig. 2.

Tringa superne splendidè griseo-fusca, lineis longitudinali-
bus & transversis undatisque fusco-nigricantibus varia,
infernè albâ; gutture, collo inferiore & pectore supremo
cinereo-albis, pennis lineâ longitudinali fuscâ in medio
notatis; reâtricibus decem intermediis griseo-fuscis, viri-
descende adumbratis, fusco-nigricante transversim & un-
datim striatis, utrinque extimâ candidâ, interiùs griseo-
fusco transversim striatâ, binis extimæ proximis apice al-
bis GUINETTA.

Tringa rostro lævi, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo. *Faur.
Suec. Linn. N^o. 147.*

Tringa rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris,
tubtus albo. *Hypoleucos. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 9.*

Tringa minor. *Willugh. Ornith. pag. 223. hujus icon non satis accurata
Tab. LV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 108. N^o. A. 6.

Charlet. Exer. pag. 112. N^o. IX.

Tringa quinta. *Jonst. Avi. pag. 112.*

Motacillæ genus. *Gesn. Avi. pag. 119, in qua hujus icon pessima.*

Gesn. icon. Avi. pag. 123, in qua eadem icon.

Tom. V.

*

- Motacillæ, seu Cincli genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 485. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 486.*
- Hypoleucos. *Gesn. icon. Avi. pag. 106, in qua hujus icon pessima. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 3.*
- Gallinulæ aquaticæ sextum genus, quod Hypoleucon cognomino; vulgus Germanicum appellat Fysterlin. *Gesn. Avi. pag. 509, in qua hujus icon pessima.*
- Gallinula Hypoleucos. *Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31.*
- Gallinula Hypoleucos, quam vulgus Germanicum Fysterlin appellat; *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 469, in qua hujus icon minùs accurata.*
- An Pluvialis fusco-cinerea, rarior species? *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 62. hujus icon minùs accurata Tab. 29.*
- Pfisterlein Leonardi Baltneri. *Willugh.*
- Les Gènévois l'appellent BECCASSINE. *Willugh.*
- Les Allemands, FYSTERLIN. *Gesn. Aldrov. Jonst.*
- Les Misniens, PILWENCKGEN; PILWEGICHEN. *Gesn. Aldrov. Jonst.*
- PILENTE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Suédois, SNAEPPA. *Linn.*
- Les Habitans de la Province d'Yorck, SAND-PIPER. *Raj. Charlet.*

Elle est un peu plus grosse que l'Alouette-de-mer. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces sept lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes & demie; son pied dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derrière trois lignes seulement. Celui du

Crassitie *Cinclum* nonnihil superat. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor cum semi lineas; pes decem cum semi lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem tres solummodo

solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ griseo-fuscæ, lineâ fusco saturatiore imbutâ, secundùm scapi longitudinem ductâ, notatæ. Quæ dorsum & uropygium obtegunt, sicut & scapulares, superioresque caudæ tectrices, sunt splendide griseo-fuscæ, lineâ fusco-nigricante, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, pluribusque aliis lineis transversis & undatis concoloribus insignitæ. Guttur, partem colli inferiorem, supremumque pectus cooperiunt pennæ cinereo-albæ, lineâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, & versùs ipsarum extremitatem paululùm ampliata, notatæ. Pectus infimum, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant.

milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a douze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un gris-brun, marquées chacune d'une ligne d'un brun plus foncé, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue, sont d'un gris-brun fort brillant, marquées chacune d'une ligne d'un brun-noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & de plusieurs autres lignes transversales & en zigzags de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont couverts de plumes d'un gris-blanc, marquées chacune d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & qui s'élargit un peu vers le bout de la plume. Le bas de la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, le haut des jambes & les côtés sont blancs. Les couvertures

du dessous des ailes les plus proches du corps sont de la même couleur : les plus éloignées du corps sont d'un cendré-brun & terminées de blanc. Les petites & les grandes couvertures du dessus des ailes les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes du dos ; cependant quelques-unes des grandes sont terminées de blanc : les petites les plus éloignées du corps , sçavoir celles qui couvrent le pli de l'aile qui répond à celui du poignet, sont d'un gris-brun , & bordées de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes , & bordées obliquement de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aile sont brunes , excepté une partie de leur côté intérieur , qui est blanche , & cela depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur , le blanc occupant d'autant plus de largeur , que la plume est plus proche du corps : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) sont blanches , & marquées vers leur extrémité d'une tache brune ; qui est d'autant plus grande que la plume est plus éloignée du corps ; elles ont aussi leur côté extérieur brun , mais à leur origine seulement : les qua-

Tectrices alarum inferiores corpori viciniore concolores : à corpore remotiores sunt cinereo-fuscæ , apicibus albis præditæ. Superiores alarum tectrices , minores scilicet & majores corpori finitimæ , eodem imbuuntur colore ac pennæ dorsum vestientes ; ex majoribus tamen quædam albo terminantur : minores à corpore remotiores , istæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem obtegunt , griseo-fuscæ , candidante fimbriatæ : majores à corpore remotiores fuscæ , albo in apice obliquè marginatæ. Remiges alarum majores sunt quoque fuscæ , at tamen in latere interiore partim candidæ , ab ipsarum exortu scilicet ad duas circiter tertias longitudinis partes usque , albedine eò majorem latitudinem obtinente , quò remix fit corpori viciniore : minores (exceptis tamen quatuor corpori finitimis) candidæ , versùs ipsarum extremitatem fuscâ insignitæ maculâ , eò majus spatium occupante , quò remix fit à corpore remotior ; sunt quoque in latere exteriori fuscæ , sed in ipsarum exortu tantùm : quatuor cor-

pori viciniore eodem imbuuntur griseo-fusco ac dorsum ipsum tingitur, taniisque transversis & undatis fusco-nigricantibus striantur. Quæ quatuor nuper descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur: quatuor intermediæ sunt splendide griseo-fuscæ, paululùm viridescente adumbratæ, fusco-nigricante transversim & undatim striatæ: binæ utrinque proximè sequentes eodem imbutæ colore, sed apice albæ: quinta novissimis istis concolor, maculis insuper candidis, ad ipsius margines positis, insignita: utrinque tandem extrema candida, in latere interiore latiusculis taniis transversis splendide griseo-fuscis notata; quædam autem taniæ griseo-fuscæ supra latus exterius nonnihil protenduntur. Rectrices quatuor intermediæ lateraliū longitudinem excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Oculorum irides avellanæ. Rostrum fuscum. Pars crurum

tre plus proches du corps sont du même gris-brun que celui du dos, & rayées de bandes transversales & en zigzags d'un brun-noirâtre. Ces quatre dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes: les quatre du milieu sont d'un gris-brun brillant, un peu ombré de verdâtre, & rayé transversalement & en zigzags de brun-noirâtre: les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, mais terminées de blanc: la cinquième est colorée comme ces dernières, & est de plus marquée de taches blanches, placées sur chacun de ses bords: enfin la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée sur son côté intérieur de larges bandes transversales d'un gris-brun brillant, dont quelques-unes s'étendent un peu sur le côté extérieur. Les quatre plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est brun. La partie des

jambes qui est dégarnie de plumis denudata, pedes, plumes, les pieds & les ongles unguisque fusco-viridescen- font d'un brun-verdâtre. On la tes. Juxta stagnorum, lacuum & fluviorum ripas versatur. trouve sur les bords des étangs, des lacs & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.* *Ex museo Realmuriano.*

** 3. LE CHEVALIER.

Voyez Pl. XVII. Fig. 1.

Tringa pennis in medio fuscis, ad margines griseis superne vestita, infernè alba; collo inferiore griseo, marginibus pennarum albidis; reſtricibus griseo-fuscis, albido in apice marginatis, quatuor intermediis & binis utrinque extimis nigricante transverſim ſtriatas; pedibus dilutè rubris . . .
TOTANUS.

Tringa roſtro nigro, baſi rubrà: pedibus coccineis. Faun. Suec. Linn. N^o. 149.

Erythropus major. Gefn. icon. Avi. pag. 101, in qua hujus icon minimè accurata.

Gallinulæ aquaticæ primum genus, quod vulgò germanicè vocant Rotbein, id eſt, Erythropodem. Gefn. Avi. pag. 504, in qua eadem icon.

Gallinula Erythropus major Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 453, in qua hujus icon peſſima.

Gallinula Erythropus. Charlet. Exer. pag. 112. N^o. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 107. N^o. 2.

Gallinula Erythropus major. Jonſt. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31, ſub titulo, Erythropus.

Gallinula Erythropus major Gefneri. Raj. Syn. Avi. pag. 107. N^o. A. 1. Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 50. hujus icon peſſima Tab. 23.

Gallinula Erythropus major Gefneri Aldrovando. Willugh. Ornith. pag. 221.

Scolopax roſtro recto baſi rubro, pedibus coccineis, remigibus ſecundariis albis. Totanus. Linn. Syſth. Nat. ed. 10. Gen. 77. ſp. 4.

Calidris Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 431. hujus icon minimè accurata pag. 433.

Jonſt. Avi. pag. 108.

Calidris Bellonii, Fedoa. Charlet. Exer. pag. 112. N^o. V.

Charlet. Onomazt. pag. 106. N^o. V.

Totanus. Charlet. Exer. pag. 112. N^o. IV.

Charlet. Onomazt. pag. 106. N^o. IV.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 5.

Totanus Gesneri. Raj. Syn. Avi. pag. 107. N^o. A. 1.

Glareola prima. Schwenck. Avi. Sil. pag. 281.

Glareola prima Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 101. N^o. 1.

Glareola prima Schwenckfeldii ; Erythropus primus Gesneri ; Redshanca Turneri. Rzac. Auc. Hist. nat. Pol. pag. 383.

Chevalier rouge. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 207 ; avec une figure passable pag. 208.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 46 b, dans laquelle est la même figure.

Becassine d'étrang. Alb. Tom. III. pag. 37 ; avec une figure mal coloriée Pl. 87.

Les Grecs l'appellent Καλίδρις. Bel.

Les Allemands, ROT-BEIN. Gesn. Aldrov. Rzac. ROTT-BEIN ; WASSER-HEUNLIN MIT ROTEN BEINEN. Schwenck. ROT-FEUSSEL. Schwenck. Rzac.

Les Anglois, RED-SHANK. Aldrov. Willugh. Raj. Sibbald. POOL-SNIPE. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.

Cum *Pluviali aurea* crassitie circiter convenit. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad
caudam extremam undecim
pollices & tres lineas æquat,
& ad extremos ungues duo-
decim pollices & undecim
lineas. Rostrum ab ipsius
apice ad oris angulos usque
unum pollicem & quinque
lineas longum est ; cauda
duos pollices cum novem
lineis ; pars crurum plumis
denudata quatuordecim li-
neas ; pes unum pollicem &
novem lineas ; trium digi-
torum anticorum medius
cum ungue unum pollicem
& quinque cum semi lineas,
extimus quatuordecim cum
semi lineas, intimus trede-

Il est à peu près de la gros-
seur du *Pluvier doré*. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est
d'onze pouces trois lignes, &
jusqu'à celui des ongles de
douze pouces onze lignes. Son
bec depuis son bout jusqu'aux
coins de la bouche a un pouce
cinq lignes de long ; sa queue
deux pouces neuf lignes ; la
partie de ses jambes qui est dé-
garnie de plumes, quatorze
lignes ; son pied un pouce neuf
lignes ; celui du milieu des
trois doigts antérieurs, joint
avec l'ongle, un pouce cinq
lignes & demie, l'extérieur
quatorze lignes & demie, l'in-
térieur treize lignes ; & celui
de derrière quatre lignes & de-

mie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt inférieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied sept pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur; cependant quelques-unes des plus grandes de ces dernières sont blanches, & s'étendent presque jusqu'au bout de la queue; & les bords de quelques-unes des plumes du dos tirent un peu sur le fauve. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes grises, & bordées de blanchâtre: celles qui sont les plus proches de la gorge, sont de plus marquées dans leur milieu d'une petite tache brune. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un beau blanc. Les cô-

tes sont blanches; posticus autem quatuor tantum cum semi lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extremo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis septem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum & uropygium pennis vestiuntur in medio fuscis, ad margines griseis. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores; attemen ex tectricibus caudæ superioribus majores quædam candidæ, & caudæ extremitatem ferè pertingentes; & expennis dorsum vestientibus quædam quoque ad margines nonnihil ad fulvum inclinant. Guttur albicat. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ griseæ, marginibus albidis præditæ; quæ gutturi magis appropinquant, minutâ maculâ fuscâ insuper in medio notatæ. Pectus, venter, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ele-

ganser albert. Latera cooperiunt pennæ dilutè griseæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores sunt griseo-fuscæ, colore dilutiore marginatæ : majores corpori viciniores concolores, sed candicante in apice fimbriatæ ; ex istis quædam insuper maculis quibusdam nigricantibus variegantur : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice marginatæ. Remiges majores subtus cinereæ, superne nigricantes, paucocandicante in extremitate fimbriatæ, & scapo albido præditæ : minores in latere exteriori fusco-nigricantes, in latere interiore versùs ipsarum exortum candidæ, versùs extremitatem griseæ, in tota circumferentia albo marginatæ : ex istis tamen excipiendæ sunt quinque corpori finitimæ griseo-fuscæ, maculis quibusdam nigricantibus variæ, & versùs apicem albido fimbriatæ. Quæ novissimè dictæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complacatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Quædam componunt duodecim rectrices griseo-fuscæ, albido in apice marginatæ : quatuor intermediæ & binæ

tés sont couverts de plumes d'un gris clair, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun, & bordées d'une couleur plus claire : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, & bordées de blanchâtre par le bout, quelques-unes sont de plus variées de quelques taches noirâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aile sont cendrées en-dessous, noirâtres en-dessus, bordées à leur extrémité d'un peu de blanchâtre, & ont leur tige de cette dernière couleur : les moyennes sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur ; mais leur côté intérieur est blanc vers leur origine & gris vers leur extrémité ; & tout le tour de la plume est bordé de blanc : il faut cependant excepter les cinq plus proches du corps, qui sont d'un gris-brun, variées de quelques taches noirâtres & bordées de blanchâtre vers leur extrémité. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun, & bor-

dées de blanchâtre par le bout : les quatre du milieu & les deux plus extérieures de chaque côté sont marquées de taches transversales noirâtres, sçavoir trois placées sur le côté extérieur, & une seulement placée sur le côté intérieur; tandis que les deux intermédiaires de chaque côté n'ont aucunes de ces taches. Les quatre plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un rouge clair, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un rouge clair; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

utrinque extimæ maculis insigniuntur transversis nigricantibus, tribus scilicet in latere exteriori positis, unicâ verò in latere interiori collocatâ; binæ autem utrinque medium locum obtinentes maculis penitus destituuntur. Rectrices quatuor intermedia lateralium longitudinem paululùm superant; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Oculorum irides avellanæ. Rostrum dilutè rubrum, excepto apice nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedesque pariter dilutè rubri; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex museo Reaumuriano.*

** 4. LE CHEVALIER ROUGE.

Tringa pennis in medio fuscis, ad margines griseis superne vestita, infernè alba, maculis griseo-fuscis varia; uropygio candido; reatricibus griseo-fuscis, nigricante transversim striatis, albo in apice marginatis; pedibus rubris . . .
TOTANUS RUBER.

Tringa luteo cinereoque maculata subtus alba, rostro pedibusque rubris. Faun. Succ. Linn. N°. 153.

Tringa

Tringa rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subrus albo. Gambetta. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 3.*

Calidris nigra, quæ Gambetta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 434, hujus icon minimè accurata pag. 432.*

Gambetta Italis dicta. *Jonst. Avi. pag. 109.*

Gambetta Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 222.*

Raj. Syn. Avi. pag. 117. N^o. 2.

Totanus alter. *Willugh. Ornith. pag. 221.*

Raj. Syn. Avi. pag. 106. N^o. 11.

Gallinula pedibus nigris. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 9.*

Glareola alia primæ similis, pedibus ex luteo rubentibus. *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 1.*

An Yacatopil, seu Rostrum Sudis? *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 29.*

Cap. LXIX.

Raj. Syn. Avi. pag. 164.

Chevalier. *Gesn. Avi. pag. 795.*

Chevalier aux pieds rouges. *Alb. Tom. II. pag. 43; avec une figure mal coloriée Pl. 68.*

Les Boulonnois l'appellent GAMBETTA. *Aldrov.*

Les Anglois, RED LEGGED HORSEMAN. *Alb.*

Les Mexiquains, YACATOPIL. *Fern.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos unguis duodecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata, quatuordecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extremus duodecim cum semi lineas, intimus undecim li-

Tom. V.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière quatre lig-

Bb

nes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied sept pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, & le dos sont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Le croupion est blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont d'un blanc varié de taches de gris-brun, qui occupent le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre, quelques-unes étant bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-cinq plumes: les neuf premières sont

neas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & septem pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsumque vestiunt pennæ in medio fuscæ, ad margines griseæ. Scapulares concolores. Uropygium est candidum. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores albescent, maculisque variegantur griseofuscis; cujuslibet pennæ medium occupantibus. Pennæ alas subtus obregentes albescunt. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt in medio fuscæ, ad margines griseæ: majores à corpore remotiores fusconigricantes, quibusdam albo in apice marginatis. Viginti quinque remigibus ala conflatur: novem primores sunt

subtus cineræ, superne nigricantes, pauco albedo in apice marginatæ, scapis quoque albidis præditæ : undecim quæ proximè sequuntur, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in latere exteriori fusco-nigricantes, in interiori fuscæ, inque tota circumferentia albo fimbriatæ : quinque corpori viciniore in medio fuscæ, latè griseo-marginatæ. Quæ quinque novissimæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices griseo-fuscæ, nigricante transversim striatæ, albo in apice marginatæ. Quatuor intermediæ lateralium longitudinem nonnihil superant; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorum. Oculorum irides sunt flavo-viridescentes, easque ambit circulus niger. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque rubrum, à medietate ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò nigri. Juxta maris & fluviorum littora degit. *Ex mu-*

cendrées en-dessous, noirâtres en-dessus, bordées à leur extrémité d'un peu de blanchâtre, & ont leur tige de cette dernière couleur : les onze suivantes, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur, brunes du côté intérieur, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les cinq plus proches du corps sont brunes dans leur milieu, avec une large bordure grise. Ces cinq dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun, rayées transversalement de noirâtre, & bordées de blanc par le bout. Les quatre du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est d'un jaune-verdâtre, entouré d'un cercle noir. Le bec est rouge depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, & noir de là jusqu'à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les

ongles noirs. On le trouve sur les bords de la mer & des rivières. *Du cabinet de M. de Reaumur.* *ſeo Realmuriano.*

** 5. LE CHEVALIER RAYÉ.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 1.

Tringa pennis grifeo-fufcis , fufco-nigricante tranſverſim ſtriatifuperne veſtita , infernè alba , tæniis aliis tranſverſis , aliis longitudinalibus fufcis varia ; collo fufco , marginibus pennarum in collo ſuperiore albo-rufefcentibus , in collo inferiore albis ; uropygio candido ; reſtricibus albis , fufco-nigricante tranſverſim ſtriatif , binis intermediis in albo colore grifeo-fufco maculatis ; pedibus pallidè rubris
TOTANUS STRIATUS.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes , & juſqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix - huit lignes de long ; ſa queue deux pouces trois lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes , treize lignes ; ſon pied un pouce ſix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , treize lignes & demie , l'extérieur un pouce , l'intérieur onze lignes ; & celui de derrière quatre lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni

Præcedenti paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet , & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque octodecim lineas longum eſt ; cauda duos pollices cum tribus lineis ; pars crurum plumis denudata tredecim lineas ; pes unum pollicem & ſex lineas ; trium digitorum anteriorum medius cum ungue tredecim cum ſemi lineas , extimus unum pollicem , intimus undecim lineas ; poſticus autem quatuor lineas tantùm. Trium digitorum

anticorum medius cum extremo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partem capitis superiorem cooperiunt pennæ fusco-nigricantes, in utroque latere rufescente marginatæ. Quæ collum superius obtegunt, sunt in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad margines albo-rufescentes. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, griseo-fuscæ, tæniis transversis fusco-nigricantibus notatæ: scapo quoque fusco-nigricante præditæ. Dorsum infimum & uropygium sunt candida. Guttur & pars colli inferior penis vestiuntur in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscis, ad margines albis. Quæ pectus, ventrem & latera obtegunt, albæ, tæniis variegatæ fuscis, aliis transversis, aliis quibusdam longitudinalibus. Cru-

avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un brun-noirâtre, bordées des deux côtés de roussâtre. Celles qui couvrent le dessus du col, sont brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & d'un blanc-roussâtre sur leurs bords. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un gris-brun, & marquées de rayes transversales d'un brun-noirâtre: leur tige est de cette dernière couleur. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanches sur leurs bords. Celles qui couvrent la poitrine, le ventre, & les côtés, sont blanches & variées de bandes brunes, les unes transversales & quelques autres longitudinales. Le haut des jambes est blanc. Les couvertures du dessus & du des-

fous de la queue font de la même couleur, & rayées transversalement de brun-noirâtre. Celles du dessous des ailes font entièrement blanches, si l'on en excepte les plus grandes, qui font rayées de bandes transversales d'un gris-blanc. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes font d'un gris-brun : les moyennes font de la même couleur, & rayées transversalement de brun-noirâtre : les grandes les plus proches du corps font brunes, & terminées d'un blanc sur lequel est une bande brune transversale & en zig-zags : enfin les grandes les plus éloignées du corps font d'un brun-noirâtre. L'aile est composée de vingt-six plumes : les sept premières font en-dessous d'un gris-blanc, & en-dessus d'un brun-noirâtre, ayant cependant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc ; de plus la tige de la première est blanche : les treize qui suivent celles-ci, sçavoir depuis la huitième jusqu'à la vingtième inclusivement, font brunes à leur origine, & blanches dans le reste de leur longueur, cette der-

rum suprema pars albicat. Tectrices caudæ superiores & inferiores sunt quoque candidæ, fusco-nigricante transversim striatæ. Inferiores alarum tectrices penitus albicantes, ex illis tamen majores tæniis transversis cinereo-allis striatæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, obtegunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ sunt griseo-fuscæ : mediæ concolores, sed fusco-nigricante transversim striatæ : majores corpori viciniore fuscæ, apice albo, tæniâ transversâ & undatâ fuscâ insignito : majores tandem à corpore remotiores ex fusco nigricant. Alarum componunt viginti sex remiges, quarum septem primores sunt subtus cinereo-albæ, superne verò fusco-nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ ; prioris insuper scapus albicat : tredecim proximè sequentes, ab octava scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in exortu fuscæ, in reliqua longitudine candidæ, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix fit

corpori vicinior; ita ut octava sit ferè in toto fusca, vigesima verò ferè penitus candida: in quatuor ex istis remigibus, ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè, albor lineolis quibusdam transversis fuscis insignitur: vigesima prima paucò in exortu fusco notatur, inde ad apicem alba est, lineis quibusdam transversis fuscis striata: vigesima secunda griseo-fusca, in utraque margine alba, griseo-fusco transversim striata: quatuor corpori finitimæ griseo-fusca, tæniis notatæ transversis fusco-nigricantibus; quæ tæniæ eò minùs sunt conspicuæ, quò remix fit corpori vicinior. Sex remiges corpori finitimæ longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices albæ, fusco-nigricante transversim striatæ: duarum insuper intermediarum alba intervalla sunt griseo-fusco maculata. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque rubescens, à medietate ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata,

niere couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que la huitième est presqu'entièrement brune, & la vingtième presqu'entièrement blanche: dans quatre de ces plumes, sçavoir depuis la huitième jusqu'à l'onzième inclusivement, le blanc est marqué de quelques petites lignes transversales brunes: la vingt-unième a un peu de brun à son origine; tout le reste est blanc & rayé de quelques lignes transversales brunes: la vingt-deuxième est d'un gris-brun, & bordée des deux côtés d'un blanc rayé transversalement de gris-brun: les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun rayé transversalement de brun-noirâtre; cette rayure est d'autant moins apparente, que la plume est plus proche du corps. Les six plumes les plus proches du corps sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de brun-noirâtre: de plus dans les deux du milieu les intervalles blancs sont tachés de gris-brun. Le bec est rougeâtre depuis son origine

jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville, & de celui de M. l'Abbé Aubry.*

pedesque pallidè rubri; ungues verò nigricantes. Circa maris littora versatur. *Ex museis D. de Bandeville & D. Aubry.*

** 6. LE CHEVALIER TACHETÉ.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestita, infernè alba, maculis nigricantibus varia; uropygio & imo ventre candidis; lateribus, rectricibusque albo & nigricante transversim striatis; pedibus rubris TOTANUS NÆVIUS.

An Pluvialis flavo-cinerea? Marsil. Danub. Tom. V. pag. 64. hujus icon minimè accurata Tab. 30.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes & demie; son pied un pouce sept lignes & demie; celui du milieu des trois doigts

A præcedente paululùm crassitie superatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda duos pollices cum quatuor lineis; pars crurum plumis denudata decem cum semi lineas; pes unum pollicem & septem cum semi lineas;

lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; posticus autem tres tantum cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis quinque pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Scapulares sunt quoque in medio nigricantes, sed ad latera nigricante & griseo-rufescente transversim striantur. Dorsum infimum & uropygium sunt candida. Guttur, collum inferius & pectus supremum nigricante & albido varia, nigricante scilicet uniuscujusque pennæ medium occupante, & albido circa margines posito; qui color albidus ad colli

Tom. V.

antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derrière trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied cinq pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête & les parties supérieures du col & du dos sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-rouffâtre sur leurs bords. Les scapulaires sont pareillement noirâtres dans leur milieu, mais leurs côtés sont rayés transversalement de noirâtre & de gris-rouffâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. La gorge, la partie inférieure du col & la partie supérieure de la poitrine sont variées de noirâtre & de blanchâtre, le noirâtre occupant le milieu de chaque plume, & le blanchâtre en occupant les bords; cette dernière couleur tire un peu sur le rouffâtre sur les côtés du col. Le bas de la poitrine & le haut du

Cc

ventre sont blancs, & variés de quelques petites taches noirâtres. Le bas ventre est blanc & sans taches. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, ainsi que les plumes qui couvrent les côtés, sont rayées transversalement de blanc & de noirâtre. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & variées d'un peu de noirâtre. Les petites du dessus sont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur à leur origine, rayées transversalement de noirâtre & de gris-rouffâtre à leur extrémité : les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur, ayant cependant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc ; la première de ces plumes a sa tige blanche ; & les dernières sont variées vers leur extrémité seulement de quelques lignes noirâtres, placées du côté intérieur sur le gris-blanc : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) sont d'un gris-brun depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de-là jusqu'à leur extrémité elles sont blanches & rayées transversalement de brun : les qua-

latera nonnihil ad rufescentem vergit colorem. Pectus infimum & venter supremus albert, & minutis quibusdam maculis nigricantibus variegantur. Venter imus candidus est & immaculatus. Tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ latera cooperientes albo & nigricante transversim striantur. Tectrices alarum inferiores sunt candidæ, paucò nigricante variæ. Superiores minores griseo-fuscæ : majores corpori viciniore in exortu concolores, in extremitate nigricante & griseo-rufescente transversim striatæ : majores à corpore remotiores penitus nigricantes. Remiges alarum majores similiter nigricant, attamen in latere interiore maximâ parte ex cinereo albert ; ex istis prior insuper scapo donatur candido ; & ultimæ versùs ipsarum extremitatem tantùm lineis quibusdam variegantur nigricantibus, in latere interiore supra cinereo-album colorem positis : minores (quatuor corpori viciniorebus exceptis) sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque griseo-fuscæ, à medietate ad apicem

tem candidæ ; fusco transversim striatæ : quatuor corpori finitimæ in medio griseo-fuscæ , ad latera nigricante & griseo-rufescente transversim striatæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ , & dum ala complicatur , majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus albo & nigricante transversim striatis. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter rubri ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex museis D. de Bandeville & D. Aubry.*

tre plus proches du corps sont d'un gris-brun dans leur milieu ; mais leurs côtés sont rayés transversalement de noirâtre & de gris-roussâtre. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes rayées transversalement de blanc & de noirâtre. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont pareillement rouges ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville & de celui de M. l'Abbé Aubry.*

** 7. LE CHEVALIER CENDRÉ.

Voyez Pl. XVII. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè albo-rufescens ; vertice nigricante ; collo inferiore & pectore griseo-rufescentibus ; uropygio cinereo-fusco, maculis nigricantibus vario ; rectricibus splendidè griseo-fuscis, versùs apicem taniâ nigricante circumferentiæ parallelâ notatis, in apice rufescente marginatis, octo intermediis versùs apicem exteriùs rufescente maculatis ; pedibus saturatè cinereis . . . TOTANUS CINEREUS.

*Tringa remigibus fuscis, primâ rachi niveâ. Faun. Suec. Linn. N^o. 151.
Tringa rostro lævi, pedibus fuscis, remigibus fuscis : rachi primâ niveâ. Tringa littorea. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 12.*

Gallinula pedibus nigricantibus. Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 7.*

Chalidris nigra. *Jonst. Avi. pag. 109.*

Charlet. Exer. pag. 112. N^o. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 107. N^o. 2.

Chalidris nigra Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 432.*

Charadrius nigricans. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. X. sp. 3.*

Chevalier noir. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 208.*

Héron blanc de M. Oldham. *Alb. Tom. III. pag. 37; avec une figure mal coloriée Pl. 89.*

Il est à peu près de la grosseur du *Chevalier rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a seize lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes & demie, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derrière quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied neuf pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées,

Cum *Totano rubro* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues tredecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sexdecim lineas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes unum pollicem & decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim cum semi lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem solummodo quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & cum intimo digito rudimento membranæ connectitur. Alis expansis, extremitates majorum remi-

gum unius pedis & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad trium usque linearum distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. Capitis vertex nigricat. Reliquum caput superius pennis vestitur in medio fuscis, in tota circumferentia griseis. Pars colli superior penitus grisea. Dorsum cooperiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares concolores; in scapularibus tamen majoribus color nigricans ad viridescentem splendidum colorem vergit. Uropygium & superiores caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ; quælibet tamen pennæ versùs extremitatem nigricante insignitur maculâ; color insuper cinereo-fuscus in pennarum marginibus paululùm ad rufescentem colorem inclinât. Guttur ex albo rufescit. Collum inferius & pectus sunt griseo-rufescentia. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices ex albo nonnihil ad rufescentem inclinant colorem. Pennæ alas subtus obtegentes candidæ, minoribus, illis scilicet quæ versùs alarum margines locum

s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Le sommet de la tête est noirâtre. Tout le reste du dessus de la tête est couvert de plumes brunes dans leur milieu, & grises dans leur circonférence. La partie supérieure du col est entièrement de cette dernière couleur. Le dos est couvert de plumes noirâtres dans leur milieu, & rouffes sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur; cependant sur les plus grandes de ces dernières le noirâtre tire sur le verdâtre brillant. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun, & chaque plume est marquée vers son bout d'une tache noirâtre; de plus le cendré-brun tire un peu sur le rouffâtre sur les bords des plumes. La gorge est d'un blanc-rouffâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris-rouffâtre. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le rouffâtre. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches, les petites, sçavoir celles qui sont vers le bord de l'aîle, étant variées d'un peu de cendré-brun. Les petites couvertures

du dessus des ailes sont noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-brun sur leurs bords : les grandes les plus proches du corps sont noirâtres & bordées de roux : les grandes les plus éloignées du corps sont pareillement noirâtres, & bordées de blanchâtre par le bout seulement. L'aîle est composée de vingt-deux plumes : les neuf premières sont d'un brun-noirâtre, cette couleur étant plus claire sur le côté intérieur, & bordées de blanchâtre par le bout seulement : les neuf suivantes, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc ; ces dix-huit plumes ont la tige blanche : les quatre plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de rouffâtre. Ces quatre dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun brillant, marquées vers leur extrémité d'une bande noirâtre parallèle à sa circonférence, & bordées de rouffâtre par le bout : les huit du milieu sont de plus tachées d'un peu de rouffâtre sur leur côté extérieur vers le bout. Le bec

tenent, pauco cinereo-fusco variegatis. Superiores alarum rectrices minores sunt in medio nigricantes, ad margines griseo-fuscae : majores corpori finitimae nigricantes, rufo fimbriatae : majores à corpore remotiores similiter nigricant, sed in apice tantum albedo marginantur. Alam componunt viginti duo remiges, quarum novem primores sunt fusco-nigricantes, attamen in latere interiore nonnihil dilutiores, & in apice tantum albedo marginatae : novem proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam octavam usque inclusivè ; cinereo-fuscae, albo fimbriatae ; quae octodecim remiges scapis albis praeditae sunt : quatuor corpori finitimae nigricantes, rufescente marginatae. Quatuor nuper descriptae remiges longae sunt & acutae, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices splendide griseo-fuscae, versus apicem tantum nigricante ipsius circumferentiae parallelâ notatae, rufescente in apice marginatae : octo intermediae pauco insuper rufescente in

latera exteriora versus apicem maculantur. Rostrum, unguisque plumbeo-nigricante colore imbuti. Pars crurum plumis denudata & pedes saturatè cinerei. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

& les ongles sont de couleur de plomb noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un cendré foncé. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

8. LE CHEVALIER BLANC.

Tringa candida, maculis transversis griseo-rufescentibus superne variegata; remigibus majoribus griseis; rectricibus candidis, griseo-rufescente transversim striatis; pedibus aurantiis **TOTANUS CANDIDUS.**

Beccassine blanche. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIX; avec une figure exacte Pl. 139. (fig. antérieure).*

Les Anglois l'appellent WHITE RED-SHANK, ou POOL-SNIPE. Edwards.

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad utriusque angulos usque duos ferè pollices longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices cum linea unica; trium digitorum anteriorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extremus undecim lineas, intimus decem lineas; posticus autem

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a près de deux pouces de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes, l'intérieur dix lignes; & celui de derrière trois lignes & de

mie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un blanc varié de petites taches transversales d'un gris-roussâtre. La partie antérieure de la tête, la gorge, le dessous du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, les côtés & le croupion sont blancs & sans taches. Les couvertures du dessous des aîles sont pareillement blanches, mais variées de quelques petites taches grises peu apparentes. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un blanc sale. Les grandes plumes de l'aîle sont grises : les moyennes sont blanches, & variées de taches transversales

tres tantùm cum semi lineas: Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alæ complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitîs & colli superiores, dorsumque vestiunt pennæ candidæ, minutis maculis transversis griseo-rufescentibus variegatæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Caput anterius, guttur, colli inferior pars, pectus, venter, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices, latera & uropygium albicans, maculisque destituuntur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt similiter candidæ, quibusdam tamen minutis maculis griseis non multùm conspicuis variegatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac scapulares ipsæ tinguntur : majores à corpore remotiores sordidè albæ. Remiges alarum majores griseæ : minores candidæ, maculis transversis griseo-rufescentibus variæ. Ex minoribus

minoribus corpori viciniore
longæ sunt & acutæ, & dum
ala complicatur, caudam
ferè extremam attingunt.
Cauda duodecim constat rec-
trixibus candidis, griseo-ru-
fescence transversim striatis.
Rostrum aurantium, atta-
men in extremitate nigrum.
Pars crurum plumis denu-
data, pedesque aurantii;
ungues verò nigricantes. Ha-
bitat in *Freto Hudsonis*.

d'un gris-rouffâtre. De ces
dernieres les plus proches du
corps sont longues & pointues,
& s'étendent, lorsque l'aîle
est pliée, presque jusqu'au bout
de la queue. La queue est com-
posée de douze plumes blan-
ches, rayées transversalement
de gris-rouffâtre. Le bec est
orangé, excepté son extrémi-
té, qui est noire. La partie des
jambes qui est dégarnie de
plumes & les pieds sont oran-
gés; & les ongles noirâtres.
On le trouve à la *Baye de
Hudson*.

9. LE CHEVALIER DE BENGALE.

Tringa superne viridis, infernè alba; capite ad latera, gut-
ture & collo saturatè fuscis; vertice, oculorum ambitu &
uropygio candidis; rectricibus purpureis, maculis auran-
tiis variegatis; pedibus luteo-viridescentibus
TOTANUS BENGALENSIS.

Rallus corpore vertice oculisque albis, capite colloque nigris, alis
dorsoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis. Rallus Ben-
ghalensis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 83. sp. 4.*

Rallus aquaticus Bengalensis. *Klein. Avi. pag. 104. N^o. 5.*

Râle d'eau de Bengale. *Alb. Tom. III. pag. 38; avec une figure mal-
coloriée Pl. 90.*

Les Anglois l'appellent BENGALL WATER RAIL. *Alb.*

Tringam crassitie circiter
æmulatur. Ipsi longitudo
ab apice rostri ad caudam
extremam octo pollices &
sex circiter lineas explet, &
ad extremos ungues decem
Tom. V.

Il est à peu près de la gros-
seur du *Beccasseau*. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est d'environ
huit pouces six lignes, & jus-
qu'à celui des ongles de dix
D d

pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long ; sa queue un pouce six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes ; son pied dix-huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes & demie ; & celui de derrière environ cinq lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est blanc. Le tour des yeux est de la même couleur : cette blancheur forme de chaque côté de la tête une petite bande, qui s'étend jusque vers l'occiput, en se terminant en pointe. Les côtés de la tête, la gorge & le col sont d'un brun-foncé. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont vertes. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont blancs. Les grandes plumes de l'aîle sont pourpres, & variées chacune de cinq grandes taches orangées, placées sur leur côté extérieur : les

pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & octo lineas longum est ; cauda unum pollicem cum sex lineis ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes octodecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus novem cum semi lineas ; posticus autem quinque circiter lineas. Alæ complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Capitis vertex albicat. Oculorum ambitus similiter candidus : qui candor in utroque capitis latere exiguum efformat taniam versùs occipitium usque productam, & in acumen desinentem. Caput ad latera, guttur & collum sunt saturatè fusca. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices virides. Dorsum inferum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores albi sunt coloris. Remiges alarum majores purpureæ ; qualibet autem quinque variegatur majusculis maculis aurantiis, in latere exteriore positis : minores

sunt virides; corpori tamen finitima candida. Remiges corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices purpureæ, majusculis maculis aurantiis variegatæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum quoque luteum. Pars crurum plumis denudata, pedesque luteo-viridescentes; ungues verò nigri. Habitat in *Bengalensi* Regno.

moyennes sont vertes; cependant la plus proche du corps est blanche. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes. La queue est composée de douze plumes pourpres, & variées de grandes taches orangées. L'iris des yeux est jaune. Le bec est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre; & les ongles noirs. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

** 10. L'ALOUETTE-DE-MER.

Voyez Pl. XIX. Fig. 1.

Tringa pennis in medio secundum scapum fuscis, ad margines griseis superne vestita, infernè alba; taniâ utrinque à rostro ad oculos candicante; gutture & collo inferiore albidis, maculis fuscis variegatis; rectricibus griseis, binis intermediis exterius saturatè fuscis CINCLUS.

Tringa pulla maculis minoribus rotundis albis variegata, ventre albicante. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 477.*

Trynga quarta. Jonst. Avi. pag. 112.

Cinclus. Gesn. icon. Avi. pag. 122, in qua hujus icon minimè accurata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 490. hujus icon minùs accurata pag. 491. Jonst. Avi. pag. 112.

Cinclus, seu Motacilla maritima. Gesn. Avi. pag. 616. hujus icon minimè accurata pag. 617.

Cinclus Ornithologi & Turneri. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 490. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 493.

Cinclus prior Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 110. N°. A. 13.

Gallinago minima ex fusco & albo varia. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 320. N°. XIV. hujus icon minimè accurata Tab. 265. fig. 4.

- Raj. Syn. Avi. pag. 190. N^o. 11.*
Schoeniclus. Moehr. Avi. Gen. 94.
*Schoeniclos, sive Junco Bellonii. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 487. hujus
 duæ icones minùs accuratæ pag. 489.*
Junco. Charlet. Exer. pag. 113. N^o. X.
Charlet. Onomazt. pag. 108. N^o. X.
Junco Bellonii. Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53.
Avis The Stint dicta. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
The Stint. Willugh. Ornith. pag. 226.
*Alouette de mer. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 217; dans laquelle il y a
 une figure très-peu exacte.*
Bel. Portr. d'Ois. pag. 50 a, dans laquelle est la même figure.
Bergeronette. Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 160.
*Sanderling d'Arbres. Alb. Tom. III. pag. 37; avec une figure mal coloriée
 Pl. 88.*
Les Grecs l'appellent Κικηλος. Gesn. Aldrov. Jonst. Σχοινικλος. Bel. Aldrov.
Les Boulonnois, GIAROLO; GIARONCELLO. Aldrov.
Les Allemands, STEIN-BICKER; STEIN-BEYSSER. Gesn.
Les Allemands aux environs de Straßbourg, LYSSKlicker. Gesn.
Les Hollandois, STRAND-LOOPER. Kolbe.
*Les Anglois, STINT. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. WATER-SWALLOW.
 Gesn. SPAR ou PERR. Charlet. TREE WIDDLE. Alb.*
Les Anglois qui habitent la Province de Suffex, OX-EYE. Raj.
Les Anglois de la Jamaïque, LEAST-SNIPE. Sloane. Raj. SNIPE. Browne.

Elle est beaucoup plus grosse que l'*Alouette hupée*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; sa queue un pouce onze lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, six lignes; son pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes

Alaudam cristatam nonnihil crassitie superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuordecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem cum undecim lineis; pars crurum plumis nudata sex lineas; pes decem lineas; trium digitorum anteriorum medius cum ungue

novem cum semi lineas, extimus octo lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem lineas tantummodo binas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad margines griseæ. Scapulares eodem imbutæ colore. Superiores caudæ teatrices fusconigricantes. In utroque capitis latere exigua extat tænia candicans, ab exortu rostri ad oculos usque producta. Guttur & collum inferius candicant, minutifque variegantur maculis fuscis, cujuslibet pennæ medium secundum ipsarum scapi longitudinem occupantibus. Pectus, venter, latera, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Crurum suprema pars exterius grisea, interiorius alba. Alarum margi-

& demie, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derrière deux lignes seulement. Tous les doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a treize pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. De chaque côté de la tête est une petite bande blanchâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'aux yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont blanchâtres, & variées de petites taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume selon la longueur de sa tige. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Le haut des jambes est gris du côté extérieur, & blanc du côté intérieur. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de

petites plumes grises, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun, bordées de gris clair, le milieu de chaque plume étant d'une couleur plus foncée : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & terminées pareillement de blanc ; mais dans les trois premières cette dernière couleur est peu apparente. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les neuf premières sont d'un brun assez foncé du côté extérieur & plus clair du côté intérieur ; leur tige est blanchâtre vers leur extrémité seulement ; de plus cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont bordées de blanc du côté extérieur, mais seulement vers le milieu de leur longueur : les onze suivantes, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées de blanc ; elles ont aussi la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, le blanc occupant cependant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps : ces vingt plumes sont d'un gris-blanc en-dessous : les

nes, infra articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumula grisea, albo fimbriata. Tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fusca, griseo diluto marginata, attamen in medio colore saturatiore tincta : majores corpori finitima griseo-fusca, apicibus albis praedita : majores a corpore remotiores saturate fusca, albo similiter terminata ; in tribus autem primoribus albedo non multum est conspicua. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : novem primores sunt in latere exteriori saturate, in interiori dilutius fusca, scapo versus ipsarum extremitatem tantum albedo praedita ; ex istis quinque, a quinta scilicet ad nonam usque inclusive, in latere exteriori albo insuper marginantur, sed tantum versus ipsarum mediam longitudinem : undecim proximè sequentes, a decima scilicet ad vigesimam usque inclusive, griseo-fusca, albo fimbriata, attamen in latere interiori maximâ parte candida, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : quæ viginti remiges sunt subtus cinereo-alba :

quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, fusco obscuriore in medio secundum ipsarum scapi longitudinem imbutæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ sunt in latere exteriori saturatè fuscæ, in latere interiore griseæ: laterales omnes in utroque latere simili griseo imbutæ. Binæ intermediæ in acumen desinunt, & laterales trium ferè linearum longitudine antecellunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusco-nigricantes. Maris, fluviorumque littora frequentat. Gregatim volat hæc species. *Ex museo Realmuriano.*

quatre plus proches du corps font d'un gris-brun, cette couleur étant plus obscure dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu font d'un brun foncé du côté extérieur, & grises du côté intérieur: toutes les latérales sont des deux côtés de cette dernière couleur. Les deux du milieu se terminent en pointe, & sont plus longues que les latérales de près de trois lignes. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-noirâtre. On la trouve sur les bords de la mer & des rivières. Cette espèce vole par troupe. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. LA PETITE ALOUETTE-DE-MER.

Cinclus minor.

Cinclus minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 490. hujus icon minus accurata pag. 492.*

Cincli congener prior. *Jonst. Avi. pag. 112.*

Les Boulonnois l'appellent GIAROLO; GIARONCELLO. *Aldrov.*

Coloribus & corporis figurâ præcedenti omnino

Elle ressemble tout-à-fait à la précédente soit pour la for-

me du corps, soit pour les couleurs; elle en diffère seulement en ce qu'elle est un peu moins grande. On la trouve dans les mêmes endroits.

respondet; ab illo tantum differt magnitudine, quâ ei cedit. Iisdem in locis habitat.

** 11. L'ALOUETTE-DE-MER A COLLIER.

Voyez Pl. XIX. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè alba; uropygio griseo-fusco, pennis in medio obscurioribus; gutture & collo inferiore maculis fuscis variegatis; pectore fusco, marginibus pennarum candidis; rectricibus griseis, binis intermediis interiùs saturatè fuscis, lateralibus interiùs albo marginatis, scapo albo præditis CINCLUS TORQUATUS.

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de six pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, six lignes; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes; l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derrière deux lignes seulement. Elle a douze pouces quatre lignes de vol; & ses aî-

Præcedenti crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sex pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues septem pollices. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim lineas longum est; cauda unum pollicem cum decem lineis; pars crurum plumis denudata sex lineas; pes novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem lineas tantummodo binas. Alis expansis, extremitates majorum remigum

gum duodecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Partem capitis superiorem, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares concolores. Quæ partem colli superiorem obtegunt, sunt in medio fuscæ, ad margines albo-rufescentes. Quæ dorsum infimum & uropygium cooperiunt, griseofuscæ, attamen in medio colore nonnihil obscuriore imbutæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, fuscæ sunt, quibusdam ex istis rufo variegatis: quæ ad latera positæ sunt, partim fuscæ, partim candidæ. Guttur & collum inferius albicant, minutisque variegantur maculis fuscis, cujuslibet pennæ medium secundum ipsarum scapi longitudinem occupantibus. Pectus, laterumque partem supremam vestiunt pennæ fuscæ, candido marginatæ. Venter, crurum suprema pars, laterum pars infima, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescent. Alarum margines, infra articu-

les, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête & celle du dos sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu, & rouffes sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie supérieure du col, sont brunes dans leur milieu, & d'un blanc-rouffâtre sur leurs bords. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un gris-brun, le milieu de chacune étant d'une couleur un peu plus obscure. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont brunes, & quelques-unes d'entr'elles sont variées de roux: celles qui occupent les deux côtés, sont en partie brunes & en partie blanches. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de petites taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume, selon la longueur de sa tige. La poitrine & le haut des côtés sont couverts de plumes brunes, bordées de blanc. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & le bas des côtés sont blancs. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est

couvert de petites plumes grises, bordées de blanc. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun un peu plus foncé dans leur milieu, selon la longueur de leur tige, qu'aileurs, & bordées de blanchâtre; les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, & terminées de blanc: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé; de ces dernières les plus intérieures sont terminées de blanc. L'aile est composée de vingt-quatre plumes: les neuf premières sont d'un brun assez foncé du côté extérieur & plus clair du côté intérieur; leur tige est blanchâtre vers leur extrémité seulement; de plus cinq de celles-là sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont bordées de blanc du côté extérieur, mais seulement vers le milieu de leur longueur: les onze suivantes, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées de blanc; elles ont aussi la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, le blanc occupant cependant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps: ces vingt plumes sont d'un

lum carpo humano respondentem, cooperiunt plumula grisea, albo fimbriata. Superiores alarum rectrices, minimae scilicet & mediae, griseo-fusca, in medio secundum ipsarum scapi longitudinem colore paulo saturatiore tincta, albido marginata: majores corpori viciniore griseo-fusca, ad apicem candida: majores à corpore remotiores saturate fusca; ex istis autem novissimis, intimae albo terminantur. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum novem primores sunt in latere exteriori saturate, in interiori dilutius fusca, scapo versus ipsarum extremitatem tantum albo praedita; ex istis quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, in latere exteriori albo insuper marginantur, sed tantum versus ipsarum mediam longitudinem: undecim proximè sequentes, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, griseo-fusca, albo fimbriata; atamen in latere interiori maximâ parte candida, candore scilicet eò majus spatium occupante, quo remix sit corpori vicinior: quae viginti remiges sunt subtus

cinereo - albæ : quatuor corpori finitimæ griseo - fuscæ , fusco obscuriore in medio secundum ipsarum scapi longitudinem imbutæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes , & dum ala complicatur , caudam ferè extremam attingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ in latere exteriorè griseæ , in interiorè saturatè fuscæ : laterales omnes in utroque latere griseæ , interiùs albo marginatæ , scapo albo præditæ. Binæ intermediæ duarum linearum longitudine laterales excedunt , & in acumen desinunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata , pedesque fusci ; ungues verò nigricantes. Juxta maris & fluviorum littora versatur. *Ex museo D. Aubry.*

gris-blanc en-dessous : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun , cette couleur étant plus obscure dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises du côté extérieur , & d'un brun foncé du côté intérieur : toutes les latérales sont grises des deux côtés , bordées intérieurement de blanc , & ont leur tige blanche. Les deux du milieu sont plus longues de deux lignes que les latérales , & se terminent en pointe. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes , & les pieds sont bruns ; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer & des rivières. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

** 12. L'ALOUETTE-DE-MER DE S. DOMINGUE,

Voyez Pl. XXIV. Fig. 1.

Tringa pennis in medio nigricantibus , ad margines rufis superne vestita , infernè albo-rufescens ; uropygio griseo-fusco , pennis in medio obscurioribus ; genis , gutture & collo inferiorè maculis fuscis variegatis ; rectricibus binis intermediis nigricantibus , rufo fimbriatis , lateralibus griseis , albo-rufescente marginatis . . . CINCLUS DOMINICENSIS.

E e ij

Elle est un peu plus grosse que la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; sa queue deux pouces une ligne; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, neuf lignes; son pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce de long, l'ex-térieur dix lignes & demie, l'intérieur dix lignes; & celui de derrière trois lignes seule-ment. Tous ses doigts sont sé-parés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a quinze pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, & le dos sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent le croupion, sont d'un gris-brun, le milieu de cha-que plume étant d'une couleur un peu plus obscure. Les cou-vertures du dessus de la queue sont d'un brun - noirâtre. Les

Crassitie Cinclum nostra-
tem paululum antecellit. Ip-
sius longitudo ab apice rostri
ad caudam extremam octo
pollices explet, & ad ex-
tremos unguis octo pollices
& novem lineas. Rostrum
ab ipsius apice ad oris an-
gulos usque tredecim lineas
longum est; cauda duos pol-
lices cum linea una; pars
crurum plumis denudata no-
vem lineas; pes unum pol-
licem; trium digitorum an-
ticorum medius cum un-
gue eadem longitudine pol-
let; extimus decem cum
semi lineas longus est; in-
timus decem lineas; post-
icus autem tres solummodo
lineas. Omnes digiti sunt ad
exortum usque à se invicem
discreti. Ab extremo ad ex-
tremum alarum extensarum
distancia est quindecim pol-
licum & sex linearum; ala
verò complicatæ ad duas us-
que lineas ultra caudam ex-
tremam protenduntur. Partes
capitis & colli superiores,
dorsumque vestiunt pennæ
in medio nigricantes, ad mar-
gines rufæ. Scapulares eo-
dem colore imbutæ. Quæ
uropygium cooperiunt, sunt
griseo - fusæ, unaquaque
pennâ in medio colore non-
nihil obscuriore tinctâ. Su-

p̄iores caudæ tectrices ex fusco nigricant. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur & collum inferius ex albo rufescunt, & minutis maculis fuscis variegantur. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt quidem albo-rufescentes, sed maculis destituuntur. Tectrices alarum inferiores minores griseo-fuscæ, albo-rufescente fimbriatæ : majores corpori finitimæ albo-rufescentes : majores à corpore remotiores dilutè cinereæ, strictissimis marginibus albo-rufescentibus præditæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniores, fuscæ, albo-rufescente marginatæ : majores à corpore remotiores penitè fuscæ. Alam componunt viginti tres remiges subtitè dilutè cinereæ, & scapo albo præditæ ; superne verò novem primores fuscæ sunt, at tamen in latere interiore maximâ parte griseo-fuscæ ; ex istis autem prior scapo donatur candido : decem proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt griseo-fuscæ, in latere exteriorè albo-

côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre, varié de petites taches brunes. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre & sans taches. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un gris-brun, & bordées de blanc-roussâtre : les grandes les plus proches du corps sont de cette dernière couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré clair, fort étroitement bordées d'un blanc-roussâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, & bordées de blanc-roussâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement brunes. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, qui sont en-dessous d'un cendré clair, & ont leur tige blanche ; mais en-dessus les neuf premières sont brunes, ayant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-brun ; la première de celles-ci a aussi sa tige blanche : les dix suivantes, savoir depuis la dixième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont d'un gris-brun, & bor-

dées extérieurement de blanc-rouffâtre : les quatre plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de roux. Ces quatre dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La première des plumes de l'aile est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de roux ; toutes les latérales sont grises, & bordées de blanc-rouffâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, & se terminent en pointe. Le bec est brun, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont bruns ; & les ongles noirâtres. On la trouve à *S. Domingue*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

rufescente fimbriatæ : quatuor corpori finitima nigricantes, rufo marginatæ. Quæ quatuor novissima longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem antecellit. Duodecimæ rectricibus cauda constat : binæ intermediæ nigricantes, rufo fimbriatæ : laterales omnes griseæ, albo-rufescente marginatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt, & in acumen desinunt. Rostrum fuscum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *Museum Realmurianum* missus à *D. Chervain*.

** 13. LA PETITE ALOUETTE-DE-MER DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. XXV. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufescentibus superne vestita, infernè albo-rufescens ; uropygio griseo-fusco, pennis in medio obscurioribus ; rectricibus binis intermediis exterius griseo-fuscis, interiùs nigricantibus, lateralibus griseis, tribus utrinque extimis scapo albedo præditis, binis proximis albo-rufescente in apice marginatis *CINCLUS DOMINICENSIS MINOR.*

Craffitie Passerem domesti-
*cum non excedit. Ipsi*us longi-
 tudo ab apice rostri ad cau-
 dam extremam quinque pol-
 lices & octo lineas æquat,
 & ad extremos ungues sex
 pollices cum linea unica.
 Rostrum ab ipsius apice ad
 oris angulos usque novem
 cum semi lineas longum est;
 cauda unum pollicem & octo
 lineas; pars crurum plumis
 denudata sex cum semi li-
 neas; pes novem cum semi
 lineas; trium digitorum anti-
 corum medius cum ungue
 novem lineas, extimus oc-
 to lineas, intimus septem
 cum semi lineas; posticus
 autem binas tantum cum
 semi lineas. Trium digito-
 rum anticorum medius cum
 extimo digito connectitur
 membranulâ ad primum us-
 que articulum extensâ, &
 digito intimo rudimento
 membranæ coadunatur. Alis
 expansis, extremitates ma-
 jorum remigum decem pol-
 licum & octo linearum in-
 tervallo distant; alæ verò
 complicatæ ad duas usque
 lineas ultra caudæ extremi-
 tatem protenduntur. Partes
 capitis & colli superiores,
 dorsumque vestiunt pennæ in
 medio nigricantes, ad mar-
 gines rufescentes. Scapulares

Elle n'est pas plus grosse
 qu'un *Moineau franc*. Sa lon-
 gueur depuis le bout du bec
 jusqu'à celui de la queue est
 de cinq pouces huit lignes, &
 jusqu'à celui des ongles de six
 pouces une ligne. Son bec de-
 puis son bout jusqu'aux coins
 de la bouche a neuf lignes &
 demie de long; sa queue un
 pouce huit lignes; la partie de
 ses jambes qui est dégarnie de
 plumes, six lignes & demie;
 son pied neuf lignes & demie;
 celui du milieu de trois doigts
 antérieurs, joint avec l'ongle,
 neuf lignes, l'extérieur huit
 lignes, l'intérieur sept lignes &
 demie; & celui de derrière
 deux lignes & demie seulement.
 Celui du milieu des trois doigts
 antérieurs est réuni avec le doigt
 extérieur par une petite mem-
 brane, qui s'étend jusqu'à la
 première articulation, & avec
 le doigt intérieur par un petit
 commencement de membrane.
 Elle a dix pouces huit lignes de
 vol; & ses ailes, lorsqu'elles
 sont pliées, s'étendent jusqu'à
 deux lignes au-delà du bout de
 la queue. Les parties supérie-
 res de la tête & du col, & le
 dos sont couverts de plumes
 noirâtres dans leur milieu, &
 rouffâtres sur leurs bords. Les
 scapulaires sont de la même
 couleur. Celles qui couvrent

le croupion, sont d'un gris-brun, le milieu de chaque plume étant d'une couleur un peu plus obscure. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont noirâtres; & celles qui occupent les deux côtés, sont en partie noirâtres & en partie blanchâtres. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc-rouffâtre. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un gris-brun, & bordées de blanc-rouffâtre: les grandes les plus proches du corps sont de cette dernière couleur; les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré clair, fort étroitement bordées d'un blanc-rouffâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, & bordées de blanc-rouffâtre: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres; & de ces dernières, les plus intérieures sont bordées de blanc-rouffâtre par le bout. L'aile est composée de vingt-quatre plumes: les dix premières sont noirâtres, ayant cependant la

concolores. Quæ uropygium obtegunt, sunt griseo-fuscæ, attamen in medio colore nonnihil obscuriore imbutæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum tenent, nigricant; quæ verò ad latera collocantur, sunt partim nigricantes, partim albidæ. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices ex albo-rufescunt. Tectrices alarum inferiores minores sunt griseo-fuscæ, albo-rufescente fimbriatæ: majores corpori viciniores albo-rufescentes: majores à corpore remotiores dilutè cineræ; strictissimis marginibus albo-rufescentibus præditæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ, albo-rufescente marginatæ: majores à corpore remotiores nigricantes; ex istis autem novissimis, intimæ albo-rufescente in extremitate marginantur. Viginti quatuor remigibus ala conflatur: decem primores nigricant, sunt tamen in latere interiore maximâ parte griseæ: decem quæ proximè sequuntur, ab undecima

undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in exortu candicantes, versus extremitatem fuscæ, interiorius & apice griseo marginatæ : quæ viginti remiges subtus sunt dilutè cineræ, & scapo candicante donantur : quatuor corpori viciniores nigricantes, rufescente marginatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Remix prima reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ in latere exteriori griseo-fuscæ, in interiori nigricantes : laterales omnes griseæ ; ex istis autem binæ duabus intermediis utrinque finitimæ alborufescente in apice marginantur ; & tres utrinque extremæ scapo albido præditæ sunt. Binæ intermediæ lateraliæ longitudinem paululum excedunt, & in acumen desinunt. Rostrum fuscum, exceptâ tamen extremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci ; ungues verò nigri.

plus grande partie de leur côté intérieur grise : les dix suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanchâtres à leur origine, brunes vers leur extrémité, & bordées de gris intérieurement & par le bout ; le dessous de ces vingt plumes est d'un cendré clair, & leur tige est blanchâtre : les quatre plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de rouffâtre. Ces quatre dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La première des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur : toutes les latérales sont grises ; mais les deux plus proches de chaque côté de celles du milieu sont bordées par le bout de blanc-rouffâtre ; & les trois plus extérieures de chaque côté ont leur tige blanchâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, & se terminent en pointe. Le bec est brun, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont bruns ; & les ongles noirs.

La femelle diffère du mâle en ce que ses couleurs sont un peu plus claires.

On les trouve à *S. Dominique*, d'où elles ont été envoyées à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

Fœmina à mare discrepat coloribus nonnihil dilutioribus.

Habitat in Dominicanſi Inſula, unde in muſeum Reaumurianum miſſi ſunt à D. Chervain.

** 14. LA MAUBÉCHE.

Voyez *Pl. XX. Fig. 1.*

Tringa ſuperne fuſco-nigricans, marginibus pennarum dilutè caſtaneis, infernè caſtanea; uropygio cinereo-fuſco, nigricante tranſverſim ſtriato, marginibus pennarum albidis; lateribus in parte infima fuſco-nigricante, albo & dilutè caſtaneo tranſverſim ſtriatis; rectricibus griſeo-fuſcis, lateralibus exterius albo marginatis CALIDRIS.

Ruſticula ſylvatica. Gefn. Avi. pag. 505. hujus icon minùs accurata pag. 504.

Gefn. icon. Avi. pag. 111, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 476. hujus icon minùs accurata pag. 477.

Jonſt. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31.

Les Allemands l'appellent WALD-SCHNEPF; HOLTZ-SCHNEPF. Gefn. Aldrov.

Elle eſt à peu près de la groſſeur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; ſa queue deux pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſept lignes;

Cum *Totano* craſſitie circiter convenit. Ipius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quindecim lineas longum eſt; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata ſeptem lineas; pes

unum pollicem ; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet ; extimus decem lineas longus, intimus novem cum semî lineas ; posticus autem tres solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & novem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores , dorsique partem supremam vestiunt pennæ fusconigricantes , castaneo diluto marginatæ. Scapulares concolores. Quæ dorsum infimum & uropygium obtinent , sunt cinereo-fuscæ , albido marginatæ , & taniâ transversâ nigricante terminatæ. Superiores caudæ tectrices sunt transversim striatæ , aliæ scilicet fusconigricante & castaneo diluto , aliæ albo & fusconigricante , aliæ tandem tribus simul suprâ dictis coloribus. Basim mandibulæ superioris ambiunt plumulæ griseæ. Syn-

son pied un pouce ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , a aussi un pouce de longueur , l'extérieur dix lignes , l'intérieur neuf lignes & demie ; & celui de derrière trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane , qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a un pied cinq pouces neuf lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête , du col & du dos sont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre , bordées de marron clair. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion , sont d'un cendré-brun , bordées de blanchâtre , & terminées par une bande transversale noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement , les unes de brun-noirâtre & de marron clair , d'autres de brun-noirâtre & de blanc , & d'autres de ces trois couleurs. La bête du demi-bec supérieur est entourée de petites plumes grises. Le synciput , les joues , la gorge , la partie inférieure du

col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & le haut des côtés sont d'un marron clair. Le bas des côtés est couvert de plumes rayées transversalement des mêmes couleurs que les couvertures du dessus de la queue. Les plus petites couvertures du dessous des ailes sont brunes, & bordées de blanc : toutes les autres sont blanches; cependant les grandes les plus proches du corps sont variées de taches transversales brunes. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun; les petites sont de plus bordées d'une couleur plus claire, & les moyennes sont variées de quelques taches, les unes d'un marron clair, & les autres d'un noirâtre-violet : les grandes les plus proches du corps sont pareillement d'un gris-brun, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé; & de ces dernières les deux plus intérieures sont terminées de blanc. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les vingt-une premières sont blanchâtres en-dessous; mais en-dessus les neuf premières sont d'un brun foncé, ayant cependant la plus grande

caput, genas, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crurum partem supremam, tectrices caudæ inferiores & latera in suprema parte tingit dilutus castaneus color. Latera in parte infima cooperiunt pennæ iisdem coloribus transversim striatæ ac superiores caudæ tectrices ipsæ striantur. Inferiores alarum tectrices minimæ fuscæ sunt, alboque fimbriatæ : reliquæ omnes candidæ; majores tamen corpori viciniore maculis transversis fuscis variegantur. Tectrices alarum superiores minimæ & mediæ sunt griseo-fuscæ, minimis insuper colore dilutiore fimbriatis, dum mediæ quibusdam variegantur maculis, aliis dilutè castaneis, aliis nigricante-violaceis : majores corpori finitimæ simili griseo-fusco imbutæ, sed apicibus albis præditæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ; ex istis autem novissimis, binæ intimæ albo terminatæ. Viginti quinque remigibus ala conflatur : viginti & una primores subtus candicant; superne verò novem primores sunt saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte griseæ;

ex istis infuper quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, in latere exteriorè mediam versùs longitudinem pauco marginantur candido: duodecim proximè sequentes, à decima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, griseo-fuscæ, strictissimâ margine albâ donatæ: quatuor tandem corpori viciniore fuscæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ griseo-fuscæ: laterales omnes concolores, exterius albo marginatæ. Rostrum, unguisque nigricant. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci sunt. Digni autem lati sunt & crassi. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

partie de leur côté intérieur grise; de plus cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont bordées d'un peu de blanc du côté extérieur vers le milieu de leur longueur: les douze suivantes, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont d'un gris-brun, & bordées fort étroitement de blanc: enfin les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun: toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées extérieurement de blanc. Le bec & les ongles sont noirâtres. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont bruns. Ses doigts sont larges & gros. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 15. LA MAUBÉCHE TACHETÉE.

Voyez Pl. XXI. Fig. 1.

Tringa superne cinereo-fusca, maculis nigricante-violaceis rufisque varia, infernè dilutè castanea; collo inferiore

albo-rufescente, maculis fuscis castaneisque variegato; uropygio cinereo-fulco, nigricante transversim striato, marginibus pennarum candidis; lateribus nigricante maculatis; rectricibus binis intermediis cinereis, albo marginatis, lateralibus cinereo-fuscis, scapo albo præditis; utrinque extrema lineâ longitudinali candidâ exterius notata CALIDRIS NÆVIA.

An Glareola castanea? *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 5.*

Elle est un peu moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes; & celui de derrière trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a un pied cinq pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un

Præcedenti paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas explet, & ad extremos unguis novem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes duodecim cum femi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extremus decem lineas, intimus novem lineas; posticus autem tres tantum lineas. Trium digitorum anticorum medius extremo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Partes ca-

pitis & colli superiores sunt cinereo-fuscæ, minutissimis maculis nigricantibus variæ. Dorsum & scapulares pennæ eodem imbuuntur cinereo-fusco, sed majusculis variegantur maculis, aliis rufis, aliis ex nigricante ad violaceum vergentibus. Uropygium vestiunt pennæ cinereo-fuscæ, albo marginatæ, & versùs ipsarum extremitatem tæniâ nigricante circumferentiæ parallelâ notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque cinereæ, in reliqua longitudine nigricante & cinereo-albo transversim striatæ. Synciput, caput ad latera, idque infra oculos, guttur & collum inferius sunt albo-rufescentia, minutis quibusdam maculis fuscis varia; pars colli inferior quibusdam insuper aliis majoribus maculis dilutè castaneis variegatur. Pectus, ventrem & latera tingit color castaneus dilutus; quædam tamen ex pennis latera cooperientibus versùs ipsarum apicem maculâ nigricante notantur. Crurum pars suprema griseo imbuuntur colore. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus

cendré-brun varié de très-petites taches noirâtres. Le dos & les plumes scapulaires sont pareillement d'un cendré-brun, mais varié d'assez grandes taches, les unes rouffes, & les autres d'un noirâtre tirant sur le violet. Le croupion est couvert de plumes d'un cendré-brun, bordées de blanc, & marquées vers leur bout d'une bande noirâtre parallele à sa circonférence. Les couvertures du dessus de la queue sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est rayé transversalement de noirâtre & de gris-blanc. Le synciput, les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-rouffâtre, varié de quelques petites taches brunes; la partie inférieure du col est de plus variée de quelques autres taches plus grandes & d'un marron clair. La poitrine, le ventre & les côtés sont de cette dernière couleur; mais quelques-unes des plumes des côtés sont marquées vers leur bout d'une tache noirâtre. Le haut des jambes est gris. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont blanches. Les petites du dessus des ailes sont d'un gris-brun: les gran-

des les plus proches du corps sont d'un cendré-brun, bordées de blanc, & variées de quelques taches, les unes d'un noirâtre tirant sur le violet, & les autres de couleur de marron : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un gris-brun : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur cendrée : les moyennes sont d'un cendré-brun très-clair du côté intérieur, un peu plus foncé du côté extérieur, & bordées extérieurement de blanc ; il faut cependant excepter les quatre plus proches du corps, qui sont du même cendré que celui du dos : toutes les autres plumes de l'aîle ont leur tige blanche. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont cendrées & bordées de blanc : toutes les latérales sont d'un cendré-brun assez clair du côté intérieur, un peu plus foncé du côté extérieur, & ont la tige blanche : la plus extérieure de chaque côté est

obtegentes albert. *Tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fusca : majores corpori viciniore cinereo-fusca, albo fimbriata, quibusdam variegata maculis, aliis ex nigricante ad violaceum inclinantibus, aliis castaneis : proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium obtinent locum, griseo-fusca : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores ex fusco nigricant, sunt tamen in latere interiore maximâ parte cinereæ : minores cinereo-fusca, idque in latere interiore dilutissimè, in exteriori nonnihil saturatiùs, exterioriùs insuper albo marginata ; ex istis tamen excipientæ sunt quatuor corpori finitimæ, quæ eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur : reliquæ omnes remiges scapo candido præditæ sunt. Quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermedia cinereæ, albo marginata ; laterales omnes cinereo-fusca, dilutè quidem in latere interiore, in exteriori verò nonnihil*

nonnihil saturatiùs , scapo albo præditâ : utrinque extrema lineâ infuper candidâ , per totam ipsius longitudinem ductâ , exterius notatur. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata , pedesque viridescentes ; ungues verò nigri. Maris littora frequentat. *Ex museo D. de Bandeville.*

de plus marquée sur son côté extérieur d'une ligne blanche, qui s'étend dans toute sa longueur. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégar- nie de plumes , & les pieds sont verdâtres ; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

** 16. LA MAUBÉCHE GRISE.

Voyez Pl. XXI. Fig. 2.

Tringa superne grisea , infernè alba , pennis in collo inferiore ; pectore & lateribus taniâ fuscâ undatâ circumferentiæ parallelâ notatis , in ventre lineolâ longitudinali fuscâ versùs apicem insignitis ; uropygio dilutè griseo , pennis duplici taniâ fuscâ circumferentiæ parallelâ notatis , albo marginatis ; rectricibus griseis , taniâ saturatiùs griseâ margini parallelâ insignitis , margine candidâ . . . CALIDRIS GRISEA.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim cum semî lineas longum est ; cauda duos pollices ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes tredecim lineas ; trium digito-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces ; la partie de ses jambes qui est dégar- nie de plumes , six lignes ; son pied treize lignes ; celui du milieu

des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes & demie, l'intérieur huit lignes & demie ; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a un pied six pouces quatre lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes grises, bordées d'un gris-blanchâtre. Celles qui couvrent le dessus du col, sont grises dans leur milieu, & blanches sur leurs bords. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont entièrement grises. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un gris clair, marquées de deux bandes brunes parallèles à leur circonférence, & bordées de blanc. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & marquées de bandes brunes, les unes longitudinales, & les autres transversales. La gorge est entièrement blanche. La partie inférieure du col, la poitrine & les côtés sont blancs, chaque plume

rum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem cum semi lineas, intimus octo cum semi lineas ; posticus autem tres tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis sex pollicum & quatuor linearum ; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ griseæ, griseo-candicante fimbriatæ. Quæ collum superius cooperiunt, sunt in medio griseæ, ad margines candidæ. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, penitus griseæ. Dorsum infimum & uropygium pennis obteguntur dilutè griseis, duplici taniâ fuscâ circumferentiâ parallelâ notatis, albo marginatis. Superiores caudæ tectrices sunt candidæ, taniis insignitæ fuscis, aliis longitudinalibus, alteris transversis. Guttur penitus albat. Pars colli inferior, pectus & latera albet ; quælibet autem penna taniâ fuf-

câ undatâ, circumferentiâ parallelâ notatur. Ventrem cooperiunt pennæ pariter albæ, lineolâ fuscâ, versus ipsarum apicem positâ, & secundum scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Crurum pars suprema & pennæ caudam subtus obtegentes eleganter albicant. Tectrices alarum inferiores minores sunt candicantes, maculis griseo-fuscis variæ : majores candicantes & immaculatæ. Alarum margines ab articulo carpo humano respondente ad alæ extremitatem usque vestiunt plumulæ griseo-fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores concolores : majores corpori viciniores dilutè griseæ, tæniâ fuscâ undatâ, circumferentiâ parallelâ notatæ, albo marginatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : decem primores sunt in latere exteriore saturatè, in interiore dilutiùs fuscæ, & scapo donantur candido ; ex istis septem, à quarta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo insuper exteriùs marginantur : novem proximè sequen-

étant marquée d'une bande brune en zigzags, parallele à sa circonférence. Le ventre est pareillement couvert de plumes blanches, marquées chacune d'une petite ligne brune, placée vers leur extrémité, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le haut des jambes, & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Les petites du dessous des ailes sont blanchâtres, & variées de taches de gris-brun : les grandes sont blanchâtres & sans taches. Le bord de l'aîle depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à l'extrémité de l'aîle est couvert de petites plumes d'un gris-brun, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris clair, marquées chacune d'une bande brune en zigzags, parallele à leur circonférence, & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premières sont d'un brun foncé du côté extérieur, d'un brun plus clair du côté intérieur, & ont leur tige blanche ; sept de celles-ci, sçavoir de-

puis la quatrième jusqu'à la dixième inclusivement, sont de plus bordées extérieurement de blanc : les neuf suivantes, savoir depuis l'onzième jusqu'à la dix-neuvième inclusivement, sont grises, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les cinq plus proches du corps sont grises, marquées chacune vers leur extrémité d'une bande brune parallèle à sa circonférence, & bordées de blanc vers le bout. Ces cinq dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes grises, bordées de blanc, & marquées chacune d'une bande d'un gris plus foncé parallèle à la bordure. Le bec, la partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer.

Du cabinet de M. de Reaumur.

tes, ab undecima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt griseæ, in tota circumferentia albo fimbriatæ: quinque corpori viciniore griseæ, versùs ipsarum extremitatem taniâ fuscâ ipsius circumferentiæ parallêlâ notatæ, & versùs apicem albo marginatæ. Quæ novissimæ quinque remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, mediam versùs caudæ longitudinem extenduntur. Cauda duodecim conflatur rectricibus griseis, margine candidâ præditis, & taniâ saturatiùs griseâ margini parallêlâ insignitis. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Reaumuriano.*

** 17. LA PETITE MAUBÉCHE GRISE.

Voyez Pl. XX. Fig. 2.

Tringa superne grisea, scapis pennarum nigris, infernè nivea; capite anteriore albo; taniâ utrinque à rostro ad oculos griseâ; uropygio dilutè griseo; tetricibus alarum superioribus minimis nigricantibus; tetricibus binis intermediis fuscis, lateralibus griseis, omnibus candicante marginatis CALIDRIS GRISEA MINOR.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 237

Arenaria, i. e. Sanderling aliàs etiam Curwilet Pensantix in Cornubia dicta. *Willugh. Ornith. pag. 225.*

Arenaria nostra, id est, Sanderling, aliis Curwillet. *Raj. Syn. Avi. pag. 109. N°. A. 11.*

Sanderling de Cornouaille. *Alb. Tom. II. pag. 48; avec une figure mauvaïse & mal coloriée Pl. 74.*

Les Habitans de la Province de Cornouaille l'appellent SANDERLING; CURWILET. *Willugh.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem septem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes undecim cum semî lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas, extimus octo lineas, & intimus septem cum semî lineas: digito postico caret; quod maximè singulare. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adneditur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied onze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur sept lignes & demie: elle n'a point de doigt derrière; ce qui est très-singulier. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a treize pouces huit lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col

font d'un gris varié de petites taches noires, qui occupent le milieu de chaque plume. Le dos est couvert de plumes grises, dont la tige est noire. Les scapulaires sont de la même couleur, & sont de plus bordées de blanc. Celles qui couvrent le croupion, sont d'un gris clair. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont grises; & celles des côtés sont blanches. La partie antérieure de la tête, ainsi que ses côtés au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc de neige. De chaque côté de la tête est une petite bande grise, qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'aux yeux. Le bord de l'aile, un peu au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes noirâtres, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont noirâtres: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur dans leur milieu, & blanches

extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores sunt griseæ, minutis variegatæ maculis nigris, uniuscujusque pennæ medium occupantibus. Dorsum obtinent pennæ griseæ, scapo nigro præditæ. Scapulares concolores, sed albo insuper marginatæ. Quæ uropygium vestiunt, sunt dilutè griseæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, griseæ sunt; quæ ad latera sunt positæ, candidæ. Caput anteriùs, sicut & ad latera, idque infra oculos, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes niveo candore nitent. In utroque capitis latere exigua extat tænia grisea, ab exortu rostri orta, & ad oculos usque producta. Alarum margines, paulò infra articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ nigricantes, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ, istæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, nigricant: mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, sunt in

medio similiter nigricantes, ad margines verò candidæ : majores à corpore remotiores quoque nigricantes, albo marginatæ. Viginti tribus remigibus ala conflatur : quatuor primores nigricant, & scapo donantur candido : sexdecim proximè sequentes, à quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in exortu candidæ, versus extremitatem nigricantes, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior ; ex istis autem quinque primores, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt insuper albo in apice fimbriatæ ; undecim reliquæ, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, albo terminatæ : tres corpori finitimæ fuscæ, albo marginatæ. Tres istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ fuscæ, candicante marginatæ : laterales omnes griseæ, candicante similiter fimbriatæ. Rostrum, pars crurum plumis denu-

sur leurs bords : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & bordées de blanc. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les quatre premières sont noirâtres, & ont leur tige blanche : les seize suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont blanches à leur origine, & noirâtres vers leur extrémité, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps ; les cinq premières de celles-ci, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont de plus bordées de blanc par le bout ; & les onze autres, sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont terminées de blanc : les trois plus proches du corps sont brunes, & bordées de blanc. Ces trois dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont brunes, & bordées de blanchâtre : toutes les latérales sont grises, & bordées pareillement de blanchâtre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles

sont noirs.

La femelle diffère du mâle en ce que les plus petites couvertures du dessus de ses ailes, & les grandes plumes de l'aile sont brunes, tandis que dans le mâle elles sont noirâtres.

Elles se tiennent sur les sables des bords de la mer; & volent par troupe. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

data, pedes, unguesque nigri.

Fœmina à mare discrepat superioribus alarum rectricibus minimis, & remigibus majoribus fuscis, dum istæ pennæ in mare nigricant.

In arenosis locis circa maris littora versantur; & gregatim volant. *Ex museo D. Mauduyt.*

** 18. LE COMBATTANT OU PAON-DE-MER.

Voyez Pl. XXII. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2:

Tringa versicolor; (capite anteriore papilloso; pennis in collo inferiore longissimis mas); reatricibus lateralibus griseo-fuscis . . . PUGNAX.

Tringa facie papillis granulatis minimis carnis; rostro pedibusque rubris. Faun. Suec. Linn. N^o. 145.

Tringa pedibus rubris, reatricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carnis. Pugnax. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 1.

Avis quædam, quam in Belgio Kemperken, id est, Pugnacem vocant. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 413. icones satis accuratæ, maris pag. 414, 415, 417, 418, 419 & 420; & femina pag. 416.

Avis pugnax. Jonst. Avi. pag. 105, maris & femina icones Tab. 51; & insuper quatuor maris icones Tab. 52, omnes ab Aldrovando mutuatæ.

Charlet. Exer. pag. 110. N^o. V.

Charlet. Onomazt. pag. 104. N^o. V.

Marfil. Danub. Tom. V. pag. 52. maris icon satis accurata Tab. 24.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 1.

Avis pugnax Aldrovandi, Willugh. Ornith. pag. 224. maris & femina icones satis accurate Tab. LVI.

Raj. Syn. Avi. pag. 107. N^o. A. 3.

Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 367.

Glareola pugnax. Klein. Avi. pag. 102. N^o. 10.

Philomachus

Philomachus. Moehr. Avi. Gen. 93.

An Ardea Americana, subcastanea, cucullata? Barr. Ornith. Class. IV.

Gen. I. sp. 18.

Héron étoilé ou blanc. Alb. Tom. I. pag. 64; avec des figures mal coloriées, du mâle Pl. 72, & de la femelle Pl. 73.

Les Allemands l'appellent HAUS-TEUFFEL. Rzac.

Les Flamands, KEMPERKEN. Aldrov. Jonst. Charlet.

Les Polonois, PTAK BITNY. Rzac.

Les Suédois, BRUSHANE. Linn. BRAUSZ-HAHN. Rzac.

Les Anglois, le mâle, RUFFE. Willugh. Raj. RUFF. Charlet. Alb. & la femelle, REEVE. Willugh. Raj. Charlet. Alb.

Totantum crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis duodecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes unum pollicem & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis, extimus quatuordecim lineas, intimus tredecim lineas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius extremo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius

Il est à peu près de la longueur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur treize lignes; & celui de derrière quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au

bout de la queue. La partie antérieure de la tête est couverte de petits mammelons charnus & de couleur de chair : la quantité de ces mammelons varie dans les différens individus ; les uns en ont beaucoup, & d'autres en ont fort peu. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un violet foncé très-brillant. La partie supérieure du dos est couverte de plumes noirâtres, bordées de gris, & variées de grandes taches du même violet foncé que le dessus du col. Les plumes scapulaires sont de la même couleur que celles de la partie supérieure du dos. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée d'une couleur plus claire : de plus les plus grandes des couvertures du dessus de la queue sont tachées de noirâtre vers leur extrémité. La bête du bec est entourée de petites plumes d'un blanc sale & rouffâtre. La partie inférieure du col est couverte de longues plumes d'un violet foncé & brillant, rayées transversalement de roux. La poitrine est variée de blanc & de noir mêlé de ce même violet. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de

pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput anterius exiguis oblitum est papillis carnosiss, carneo colore imbutis : quæ papillæ in variis individuis multum numero variant ; alia enim magnâ istarum papillarum copiâ, alia parvâ donantur. Partes capitæ & colli superiores sunt splendidissimè saturatè violaceæ. Partem dorsi supremam vestiunt pennæ nigricantes, griseo fimbriatæ, quasque variegant majusculæ maculæ eodem imbutæ violaceo saturato ac collum superius ipsum tingitur. Scapulares pennis dorsum supremum vestientibus concolores. Dorsum infimum ; uropygium, superioresque caudæ teatrices griseo-fuscæ, marginibus pennarum dilutioribus : majores insuper caudæ teatrices superiores versùs ipsarum extremitatem nigricante maculantur. Basim rostri circumdant plumulæ sordidè albo-rufescentes. Partem colli inferiorem cooperiunt pennæ longæ, saturatè violaceæ, splendentes, rufo transversim striatæ. Pectus albo & nigro

Variegatur, cum aliqua in nigro violacei supra dicti mixtura. Venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albert. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fusco imbutæ, colore nonnihil dilutiore fimbriatæ : majores à corpore remotiores fuscæ. Remiges majores similiter fuscescunt : minores, exceptis tamen quatuor corpori finitimis, sunt griseo-fusco colore tinctæ, qui color eò dilutior fit, quò remix fit corpori vicinior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ, maculis transversis nigricantibus versùs apicem insignitæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, nonnihil ultra majorum remigum extremitates protenduntur. Cauda duodecim conflatur reëtrici-bus griseo-fuscis : binas intermedias variegant maculæ quædam nigricantes. Oculorum irides avellanæ. Rostrium, pars crurum plumis denudata, pedesque grisei ; ungues verò nigricantes. *Ex museo D. de Bandeville.*

la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée d'une couleur un peu plus claire : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur : les moyennes, excepté les quatre plus proche du corps, sont d'un gris-brun, qui s'éclaircit d'autant plus, que la plume est plus proche du corps : enfin les quatre plus proches du corps sont brunes, & marquées vers leur bout de taches transversales noirâtres. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, un peu au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun : les deux du milieu sont variées de quelques taches noirâtres. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris ; & les ongles noirâtres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle n'a point de mamelons charnus à la partie antérieure de la tête, & que les plumes du dessous de son col ne sont pas plus longues que celles du dessus. Elle en diffère encore par ses couleurs. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. La partie supérieure du dos est couverte de plumes dont les unes sont blanches & les autres brunes; quelques-unes de ces dernières sont bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de même les unes blanches & les autres brunes, dont quelques-unes sont bordées de roussâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, bordées de roussâtre. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont brunes; & celles des côtés sont blanches. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont mêlées de plumes blanches & de plumes brunes: les grandes les plus éloignées du corps sont toutes brunes. Les grandes plumes de l'aile sont de cette

Fœmina à mare differt parte capitis anteriore papillis carnosis nequaquam obsitâ, & pennis collum inferius vestientibus pennarum collum superius obtegentium longitudinem non excedentibus. Ab illo quoque coloribus discrepat. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albi sunt coloris. Partem dorsi supremam vestiunt pennæ, quarum aliæ sunt candidæ, aliæ fuscæ, quibusdam ex fuscis rufescente marginatis. Ex scapularibus quoque aliæ albicant, aliæ fuscescunt; & quædam ex fuscis rufescente fimbriantur. Dorsum infimum & uropygium obtegent pennæ fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum tenent, fuscæ sunt; quæ ad latera collocantur, candidæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, pennis constant aliis albis, aliis fuscis: majores à corpore remotiores omnes fuscescunt. Remiges alarum majores sunt eodem fusco imbutæ: mi-

nores griseo - fuscæ , albo fimbriatæ ; ex istis tamen excipiendæ sunt binæ corpori viciniore penitus candidæ , & duæ proximè sequentes fuscæ , oris exterioribus rufescentibus præditæ. Caudæ rectrices rectricibus *maris* concolores. Rostrum rubrum , attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata , pedesque rubri ; ungues verò nigri. *Ex museo Realmuriano.*

Aves istæ multùm colore variant : rarò occurrunt binæ perfectè inter se similes. Plures in *museo Realmuriano* servabantur , mares scilicet & foeminæ , quarum descriptions hîc subjacent.

Una , quæ *mas* , cujusque descriptionem & iconem dedit *Albinus* , sic coloribus imbutur. Caput anterius & guttur albicant. Capitis posterior pars & colli superior rufi sunt coloris. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ longæ , nigro - violaceæ. Dorsû suprema pars & scapulares pennæ rufo & fusco variegantur , majusculis maculis nigro-violaceis admix-

derniere couleur : les moyennes sont d'un gris-brun , & bordées de blanc ; il faut cependant en excepter les deux plus proches du corps , qui sont entièrement blanches , & les deux qui les suivent immédiatement , qui sont brunes & bordées extérieurement de rouffâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du *mâle*. Le bec est rouge , excepté son bout , qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , & les pieds sont rouges ; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Ces Oiseaux varient beaucoup en couleur : il est difficile d'en trouver deux qui se ressemblent parfaitement. *M. de Reaumur* en conservoit dans son *cabinet* plusieurs mâles & femelles , dont voici les descriptions.

Un *mâle* , qui est celui qu'*Albin* a décrit & figuré , est ainsi coloré. La partie antérieure de la tête & la gorge sont blanchâtres. Le derriere de la tête & le dessus du col sont roux. La partie inférieure du col est couverte de longues plumes d'un noir-violet. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de roux & de brun , avec d'assez grandes taches d'un noir-violet. La par-

tie inférieure du dos & le croupion sont bruns. Les petites couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur : les grandes sont variées de brun & de roux, terminées par une grande tache de noir-violet, & bordées de roux par le bout ; cependant parmi ces couvertures, les latérales sont blanches & variées de noir. La poitrine, le haut du ventre & les côtés sont couverts de plumes noirâtres, bordées de noir-violet. Le bas-ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes. Les couvertures du dessus des ailes sont brunes, excepté quelques-unes des plus grandes proche le corps, qui sont rousses, variées de petits points bruns, & terminées par une tache d'un noir-violet. Quelques-unes des plumes de l'aile, sçavoir les plus proches du corps, sont colorées comme ces dernières couvertures : toutes les autres, ainsi que les plumes de la queue, sont de la même couleur que dans le mâle que j'ai décrit ci-dessus. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, & les pieds sont rouges ; & les ongles noirs.

tis. Dorsum infimum & uropygium fusca sunt. Superiores caudæ tectrices minores concolores : majores fusco & rufo variæ, majusculâ maculâ nigro-violaceâ terminatæ, & rufo in apice fimbriatæ ; ex istis tamen tectricibus, quæ ad latera posita sunt, albert, nigroque variegantur. Pectus, ventrem supremum & latera obtegunt pennæ nigricantes ; marginibus nigro-violaceis præditæ. Venter imus, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus cooperientes albicant. Tectrices alarum superiores sunt fuscæ ; ex illis tamen majores quædam corpori finitimæ rufæ, punctulis fuscis variegatæ, & maculâ nigro-violaceâ terminatæ. Ex remigibus quædam, corpori scilicet viciniore, novissimis istis tectricibus concolores : reliquæ omnes, sicut & caudæ tectrices, eodem imbuuntur colore ac in *mare* à me suprâ descripto. Rostrum rubrum, excepto apice nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri ; ungues verò nigri.

Alia, quæ *mas*, quæque ab Aldrovando quarto loco delineatur, cum priori, cujus descriptionem dedi, convenit, cum sequentibus tamen differentiis. Pennæ longæ collum inferius obtegentes rufescunt. Dorsum multo magis variegat color niger, qui color nonnihil ad violaceum inclinat. In superioribus alarum rectricibus quædam extant maculæ nigricantes. Quatuor remiges corpori viciniore, sicut & binæ rectrices intermedia, maculis transversis griseo-rufescentibus insigniuntur. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; unguis verò nigri.

Altera, quæ *mas*, priori à me descripto adhuc respondet, sequentibus differentiis exceptis. Partes capitæ & colli superiores sunt rufæ. Pennæ longæ collum inferius vestientes candidæ. Pars dorsi suprema & scapulares pennæ multo variegantur rufo. Remiges quatuor corpori finitimæ & binæ rectrices intermedia maculis transversis rufis notantur. Rostrum rubrum, exceptâ extremitate nigricante. Pars

Autre mâle, qui est le quatrième d'*Aldrovande*. Il ressemble au premier que j'ai décrit, cependant avec ces différences. Les longues plumes de la partie inférieure du col sont rouffâtres. Le dos est varié de beaucoup plus de noir, cette couleur tirant un peu sur le violet. Sur les couvertures du dessus des aîles sont quelques taches noirâtres. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, ainsi que les deux plumes du milieu de la queue, sont marquées de taches transversales d'un gris-rouffâtre. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs.

Autre mâle, qui ressemble encore au premier que j'ai décrit, avec ces différences. Les parties supérieures de la tête & du col sont rouffes. Les longues plumes de la partie inférieure du col sont blanches. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de beaucoup de roux. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, & les deux plumes du milieu de la queue sont marquées de taches transversales rouffes. Le bec est rouge, ex-

cepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs.

Autre *femelle*. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous des ailes & les côtés sont blancs: le dessus de la tête est cependant varié d'un peu de brun; de plus le ventre, les côtés & le haut des jambes sont variés d'un fauve sur lequel sont de petites taches noirâtres. La partie supérieure du dos est couverte de plumes, les unes brunes, & les autres fauves, ces dernières étant variées de taches noirâtres, dont les unes sont transversales & les autres irrégulières. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes fauves, rayées transversalement de noir. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont variées de brun, de gris & de fauve, cette dernière couleur étant elle-même variée de taches noires; celles des côtés de la queue sont d'un blanc mêlé d'un peu de fauve: celles du dessous sont d'un fauve clair, & marquées chacune vers leur extrémité d'une petite ligne longitudinale bru-

crurum plumis denudata, pedesque rubri coloris; ungues verò nigri.

Altera, quæ *fœmina*. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, alarumque tectrices inferiores candore nitent: caput tamen superius paucò variegatur fusco; venter insuper, latera & crurum pars suprema fulvo variegantur; qui color fulvus minutis maculis nigricantibus aspergitur. Dorsum supremum vestiunt pennæ alix fuscæ, alteræ fulvæ; quæ novissimæ maculis variegantur nigricantibus, aliis scilicet transversis, aliis irregularibus. Pennæ dorsum infimum & uropygium obtegentes sunt fulvæ, nigro transversim striatæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, sunt fusco, griseo & fulvo variegatæ, fulvo ipso colore maculis nigris vario: quæ ad caudæ latera positæ sunt, albicant, cum aliqua fulvi mixtura. Pennæ caudam subtus obtegentes dilutè fulvæ, lineolâ longitudinali fuscâ versùs ipsarum extremitatem insignitæ. Tectrices

trices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, pennis scapularibus concolores: majores à corpore remotiores penitus fusca. Remiges majores pariter fuscescunt: minores sunt griseæ, fusco in latere interiore, fulvo & nigricante in exteriori variæ, & exterius insuper fulvo fimbriatæ: ex remigibus autem corpori vicinioribus, quæ majorem obtinet longitudinem, ab exortu ad apicem fulva est & nigricante maculata. Caudæ rectrices eodem imbuuntur colore ac rectrices prioris *maris* à me descripti ipsæ tinguntur, cum aliqua tamen differentia; tres enim utrinque extremæ nigricante in latere exteriori maculantur. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque similis rubri sunt coloris; ungues verò nigri.

Præter suprà dictas, *Aldrovandus* sex alias descripsit & delineavit, *mares* scilicet quinque & *fæminam* unam.

Prioris, quæ *mas*, caput, pars colli superior, dorsum, venter supremus & crurum pars suprema ex rufescente

Tom. V.

ne. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes scapulaires: les grandes les plus éloignées du corps sont entièrement brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur: les moyennes sont grises, variées intérieurement de brun; extérieurement de fauve & de noirâtre, & bordées aussi extérieurement de fauve: de plus parmi les plus proches du corps la plus longue est entièrement fauve & tachetée de noirâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du premier *mâle* que j'ai décrit, avec cette différence cependant que les trois plus extérieures de chaque côté sont tachées de noirâtre sur leur côté extérieur. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont pareillement rouges; & les ongles noirs.

Outre ceux-ci, *Aldrovande* en a encore décrit & figuré six autres, sçavoir cinq *mâles* & une *femelle*.

Le premier qui est un *mâle*, a la tête, la partie supérieure du col, le dos, le haut du ventre & le haut des jambes d'un

rouffâtre tirant sur le marron, & varié de taches transversales noires. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre tirant sur le cendré, & varié de taches noires oblongues, & tendant vers le bas. Les couvertures du dessous des ailes & les plumes de l'aile sont d'un rouffâtre tirant sur le marron, & varié de même de taches noires, qui sont rondes sur les couvertures, & transversales sur les plumes de l'aile. La tête est ornée d'une espece de hupe. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

Le second, qui est encore un *mâle*, est hupé, comme le précédent. Le synciput & l'occiput sont blancs, ainsi que les longues plumes de la partie inférieure du col. Sous la gorge est une tache noirâtre. Le ventre est de cette dernière couleur. Tout le reste de son corps est d'un blanc sale ou rembruni. Le bec est noir, excepté à son origine, où il est blanc. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont bruns.

Le troisième, qui est une *femelle*, est presque par tout le

ad castaneum vergunt; & maculis transversis nigris variegantur. Guttur, collum inferius, pectus, venter imus & inferiores caudæ tectrices ex candicante ad cinereum inclinant, & maculis variegantur nigris, oblongis, deorsum tendentibus. Superiores alarum tectrices, sicut & remiges, sunt ex rufescente ad castaneum vergentes, maculis pariter variegatæ nigris, supra tectrices rotundis, supra remiges verò transversis. Caput quodammodo cristâ ornatur. Rostrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò nigri.

Secunda, quæ quidem *mas*, cristam gestat, ut præcedens. Synciput & occiput, longæque pennæ collum inferius obtegentes albicant. Sub gutture macula extat nigricans. Venter similiter nigricat. Totum reliquum corpus sordidè albet aut ex albo fuscescit. Rostrum nigrum, attamen in exortu candidum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci.

Tertio loco depicta, quæ *fæmina*, in universo ferè

corpore est rufa, maculis nigris lunulatis aspersa, at tamen in capitis vertice immaculata. Crurum suprema pars & venter imus ad castaneum inclinant. Remiges alarum majores sunt nigræ, colore croceo fimbriatæ & terminatæ. Oculorum irides simili croceo imbutæ; ipsorum verò pupilla nigra.

Quinta, quæ *mas*, coloribus multum convenit cum *mari* tertio à me descripto, quique quarto loco ab *Aldrovando* delineatur; ab illo tamen discrepat in eo quod longæ pennæ collum inferius vestientes sint candidæ, nigro terminatæ.

Sexta, quæ pariter *mas* est, præcedentis instar, in collo inferiore longis donatur pennis candidis, nigro terminatis; sed ab illo discrepat coloribus quibus reliquum corpus imbuitur. Caput ex cinereo-flavicat; at tamen in vertice pennis vestitur nigris. Guttur candidum. Totum reliquum corpus fuscum, exceptis tamen crurum parte supremâ, caudâque ex rufo ad castaneum vergentibus. Oculorum irides croceo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata,

corps d'un roux parsemé de taches noires, en forme de croissant, excepté sur le sommet de la tête, qui est sans taches. Le haut des jambes & le bas-ventre tirent sur le marron. Les grandes plumes de l'aile sont noires, bordées & terminées de couleur de safran. L'iris des yeux est de cette dernière couleur; leur prunelle est noire.

Le cinquième qui est un *mâle*, ressemble beaucoup par ses couleurs au troisième *mâle* que j'ai décrit, & qui est le quatrième d'*Aldrovande*; il en diffère cependant en ce que les longues plumes du dessous de son col sont blanches & terminées de noir.

Le sixième qui est pareillement un *mâle*, a comme le précédent, les longues plumes du dessous du col blanches & terminées de noir; mais il en diffère par les couleurs du reste de son corps. Sa tête est d'un cendré-jaunâtre, excepté son sommet, qui est couvert de plumes noires. Sa gorge est blanche. Tout le reste de son corps est brun, si l'on en excepte le haut des jambes & la queue, qui sont d'un roux tirant sur le marron. L'iris des yeux est de couleur de safran. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les

pies & les ongles sont bruns.

Le septième enfin qui est encore un *mâle*, a la tête jaune. Tout le reste de son corps est couvert de plumes dont les unes sont vertes, d'autres sont blanches, d'autres rouges, d'autres d'un violet d'Amethyste, & d'autres jaunes : & ce qu'il y a de singulier, c'est qu'aucune de ces plumes n'est mêlée de deux couleurs. La partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont jaunes.

On les trouve aux bords de la mer.

pedes, unguisque fusci.

Septima tandem, quæ similiter *mas*, caput habet luteum. In toto reliquo corpore pennis vestitur aliis viridibus, aliis candidis, aliis rubris, aliis violaceo-Amethystinis, aliis luteis : quodque maximè singulare, nulla penna binis coloribus immiscetur. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei sunt.

Juxta maris littora versantur.

** 19. LE MERLE-D'EAU.

Tringa superne fusco-nigricans; genis, gutture, collo inferiore & pectore niveis; ventre supremo fusco-rufescente; imo ventre, rectricibusque nigricantibus . . . MERULA AQUATICA.

Trynga. Charlet. Exer. pag. 112. N°. IX.

Charlet. Onomazt. pag. 108. N°. IX.

Merula aquatica. Gesn. Avi. pag. 608. hujus icon non satis accurata pag. 609.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 302.

Jonst. Avi. pag. 112. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 53.

Willugh. Ornith. pag. 104. hujus icon minùs accurata Tab. XXIV.

Raj. Syn. Avi. pag. 66. N°. A. 7.

Charlet. Exer. pag. 113. N°. XII.

Charlet. Onomazt. pag. 108. N°. XII.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen 82. sp. 3.

Merula aquatica, vel rivalis. Gesn. icon. Avi. pag. 123, in qua hujus icon non satis accurata.

Merula aquatica Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 485. hujus icon minùs accurata pag. 486.

Turdus aquaticus. Gesn. Avi. pag. 501.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 487.

Klein. Avi. pag. 68. N^o. 18.

An Gallinulæ aquaticæ species ? *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 559, in qua hujus icon minùs accurata.*

Cornix aquatica. Gefn. Avi. pag. 333.

Sturnus niger, pectore albo. Cinclus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 94. sp. 4.

Motacilla pectore albo, corpore nigro. Faun. Suec. Linn. N^o. 216.

Merle d'eau. Alb. Tom. II. pag. 26 ; avec une figure mal coloriée Pl. 39.

Les Grecs l'appellent Κόττυπος ήρωσπος. Schwenck.

Les Italiens aux environs de Belinzone, LERLICHIROLLO. Gefn. Aldrov.

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, FOLOT ou FALUNT D'ACQUA. Gefn. Aldrov.

Les Allemands WASSER-AMSEL. Gefn. Aldrov. Schwenck. Willugh. BACH-AMSEL. Gefn. Aldrov. Schwenck. Jonst. SEE-AMSEL. Schwenck.

Les Suisses, WASSER-TROSTLE. Gefn.

Les Suédois, WATN-STARE. Linn.

Les Anglois, WATER-OUZEL. Willugh. Raj. WATER-CRAKE. Raj.

Merulæ vulgari paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem lineas longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem & septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo cum semi lineas, intimus septem lineas; & posticus quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ferè ad primum usque articulum ex-

Il n'est pas tout-à-fait si gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, quatre lignes; son pied un pouce sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes & demie; l'intérieur sept lignes; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend presque

jusqu'à la première articulation. Il a onze pouces neuf lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un brun foncé. Le dos, le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues , la gorge , la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un blanc de neige. Le haut du ventre est d'un brun tirant sur le roux. Le bas-ventre , les couvertures du dessous de la queue , le haut des jambes & les côtés sont noirâtres. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un brun foncé. L'aile est composée de dix-huit plumes d'un brun-noirâtre. Les plus proches du corps sont longues & pointues , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noirâtres , à peu près d'égale longueur. Les paupières sont blanches. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec , la partie des jambes qui est dé garnie de plumes , les pieds & les on-

tensa. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est undecim pollicum & novem linearum ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem pertingunt. Partes capitis & colli superiores tingit color fuscus saturatus. Dorsum , uropygium , pennæ scapulares , alas superne vestientes , & superiores caudæ tectrices ex fusco nigricant. Caput ad latera , idque infra oculos , sive genæ , guttur , pars colli inferior & pectus niveo candore nitent. Venter supremus ex fusco ad rufum inclinat. Venter imus , inferiores caudæ tectrices , crurum suprema pars & latera nigricant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt saturatè fuscæ. Alam componunt octo-decim remiges fusco-nigricantes. Corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes , & dum ala complicatur , majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat reatricibus , nigricantibus , æqualem circiter longitudinem obtinentibus. Palpebræ sunt candidæ. Oculorum irides avellanæ. Rostrum , pars crurum plumis denudata , pedes , unguesque nigri,

Juxta fluviorum ripas verfatur, ibique *Pisciculis & Insectis aquaticis* victitat. Sub aquis quandoque mergit. Solitaria est, & pariendi tantum tempore cum foemina volat. *Ex museo Realmuriano.*

gles sont noirs. On le trouve sur le bord des rivières, où il se nourrit de petits Poissons & d'*Insectes aquatiques*. Il plonge quelquefois sous l'eau. Il est solitaire, & ne s'associe qu'avec sa femelle, & cela dans le temps de l'amour. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

20. LA GRIVE-D'EAU.

Tringa superne rufescente-olivacea, inferne alba, superne & inferne maculis nigricantibus varia; tæniâ supra oculos candidâ; fasciâ duplici in alis transversâ albâ; rectricibus binis intermediis rufescente-olivaceis, tæniâ transversâ fuscâ in apice notatis, lateralibus albis, nigricante transversim striatis TURDUS AQUATICUS.

Tringa tacheté. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 139. Chap. LXVII; avec une figure exacte Pl. 277. (fig. inférieure).*
Les Anglois l'appellent SPOTTED TRINGA. *Edwards.*

Cum *Turdo minori* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem septem pollices & novem circiter lineas æquat, & ad extremos unguis octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes undecim cum semi lineas; trium

Elle est à peu près de la grosseur de la *petite Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, quatre lignes; son pied onze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts anté-

rieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes; & celui de derriere trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, le dessus du col & le dos sont couverts de plumes d'un rouffâtre tirant sur l'olivâtre, marquées chacune dans leur milieu d'une tache noirâtre: ces taches sont fort petites sur la tête, & vont ensuite en augmentant de grandeur jusque sur le dos, où sont les plus grandes. Les plumes scapulaires sont aussi d'un rouffâtre tirant sur l'olivâtre, & variées de taches transversales noirâtres. Celles qui couvrent le croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont du même rouffâtre & sans taches. De chaque côté de la tête est une petite bande blanche, qui s'étend au-dessus des yeux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont

digitorum anticorum medius cum ungue novem cum semi lineas, extimus octo lineas, intimus septem lineas; posticus autem tres tantum cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsumque vestiunt pennæ ex rufescente ad olivaceum inclinantes, maculâ nigricante in medio insignitæ: quæ maculæ in capite valdè sunt exiguæ, deinde versùs dorsum procedendo, sensim atque sensim majorem obtinent magnitudinem, & in dorso majores fiunt. Scapulares pennæ ex rufescente quoque ad olivaceum vergunt, maculisque transversis nigricantibus variegantur. Quæ uropygium obtegunt, sicut & superiores caudæ tectrices, sunt eodem rufescente tinctæ & immaculatæ. In utroque capitatis latere exigua extat tænia candida, supra oculos protensa. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars,

pars, inferioresque caudæ
 tectrices albes, & maculis
 nigricantibus variegantur :
 quæ maculæ in pectore ma-
 jores sunt quàm in aliis præ-
 dictis partibus, & paululum
 cordatim emarginatæ. Pen-
 næ alas subtus cooperientes
 albæ, taniâ transversâ nigri-
 cante notatæ. Alarum mar-
 gines albicant. Superiores
 alarum tectrices minores
 sunt ex rufescente ad oliva-
 ceum vergentes, maculis
 transversis nigricantibus va-
 riæ : majores corpori finiti-
 mæ concolores, sed albo
 terminatæ : majores à cor-
 pore remotiores nigrican-
 tes, albo in apice fimbriatæ.
 Remiges majores nigricant ;
 ex istis autem intimæ albo
 in apice marginantur : me-
 diæ sunt nigricantes, albo
 terminatæ ; quæ albedo cum
 tectricum albore in utraque
 ala duplicem taniam trans-
 versam concolorem efficit :
 attamen excipiendæ sunt tres
 quatuorve remiges corpori
 viciniore ex rufescente ad
 olivaceum inclinantes, in
 utroque latere taniis obli-
 quis nigricantibus insignitæ.
 Quæ novissimè dictæ remi-
 ges longæ sunt & in acumen
 desinentes, & dum ala
 complicatur, majorum re-

blancs, & variées de taches
 noirâtres : ces taches sont plus
 grandes sur la poitrine que par-
 tout ailleurs, & sont un peu
 taillées en cœur. Les couvertu-
 res du dessous des aîles sont
 blanches, & marquées d'une
 bande transversale noirâtre. Le
 bord de l'aîle est blanc. Les
 petites couvertures du dessus
 des aîles sont d'un rouffâtre ti-
 rant sur l'olivâtre, & variées
 de taches transversales noirâ-
 tres : les grandes les plus pro-
 ches du corps sont de la même
 couleur, mais elles sont ter-
 minées de blanc : les grandes
 les plus éloignées du corps
 sont noirâtres, & bordées de
 blanc par le bout. Les grandes
 plumes de l'aîle sont noirâtres,
 & de celles-là les plus inté-
 rieures sont bordées de blanc
 par le bout : les moyennes sont
 noirâtres & terminées de blanc ;
 ce qui avec le blanc des cou-
 vertures forme sur chaque aîle
 deux bandes transversales de
 cette couleur : il faut cepen-
 dant excepter les trois ou qua-
 tre plumes de l'aîle les plus
 proches du corps, qui sont
 d'un rouffâtre tirant sur l'oli-
 vâtre, & marquées des deux
 côtés de rayes obliques noirâ-
 tres. Ces dernières plumes sont
 longues & pointues, & s'é-
 tendent, lorsque l'aîle est

pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un rouffâtre tirant sur l'olivâtre, & marquées vers leur extrémité d'une bande transversale brune : les latérales sont blanches, & rayées transversalement de noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est de couleur de chair depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un couleur de chair obscur ; & les ongles noirs. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'Europe & de l'Amérique.

migum extremitates pertinent. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermedix rufescente-olivaceæ, taniâ transversâ fuscâ versùs apicem notatæ : laterales albæ, nigricante transversim striatæ. Binæ rectrices intermedix lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque carneo colore imbutum, inde ad extremitatem fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque obscure carneo colore tincti ; ungues verò nigri. Habitat in *Europa & America* Septentrionali regione.

21. LE CANUT.

Tringa superne cinereo-fusca, marginibus penmarum dilutioribus, infernè alba, maculis nigricantibus varia ; taniâ supra oculos candidâ ; fasciâ in alis transversâ albâ ; uropygio albo & cinereo-fusco lunulatim variegato ; rectricibus decem intermediis cinereo-fuscis, utrinque extimâ candidâ CANUTUS.

Tringa cinerea, remigibus secundariis basi totaliter albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis. Faun. Suec. Linn. N^o. 150.

Tringa rostro lævi, pedibus cinerascens, remigibus primoribus ferratis. Canutus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 78. sp. 10.

Chalidris cinerea. Charlet. *Exer.* pag. 112. N^o. 1.

Calidris cinerea. Charlet. *Onomazt.* pag. 107. N^o. 1.

Canuti Avis. Linn. *Systh. Nat. ed. 6. Gen. 60. sp. 6.*

Canuti Avis, id est, Knot Lincolnienfibus. Raj. *Syn. Avi.* pag. 108. N^o. A. 5.

Knot agri Lincolnienfis. Willugh. *Ornith.* pag. 224. *hujus icon minimè accurata Tab. LVI, sub titulo, Callydris nigra.*

Canut. Edwards. *Glanur. Part. II.* pag. 137. *Chap. LXVI; avec une figure exacte Pl. 276.*


Les Anglois, & sur-tout ceux qui habitent la Province de Lincoln, l'appellent KNOT. Willugh. Raj. Charlet.

Calidrim cineream crassitie circiter æmulatur. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos unguis decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; posticus autem binas tantum cum semi lineas. Digni omnes sunt ad exortum usque à se invicem discreti. Alæ complicatæ ad extremitatem caudæ ferè pertingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ cinereo-fuscæ, colore nonnihil dilu-

Il est à peu près de la grosseur de la *Maubèche grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derrière deux lignes & demie seulement. Tous les doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes d'un cendré-brun, bordées

d'une couleur un peu plus claire. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ainsi que les couvertures du dessus de la queue, sont variées de blanc & de cendré-brun par taches transversales, & qui ont la forme d'un croissant. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend par-dessus les yeux : au-dessous de celle-là en est une autre d'un brun foncé, qui part de même d'auprès de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont blanches, & variées de petites taches brunes. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont du même blanc, & marqués de taches transversales noirâtres. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches & sans taches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos ; mais les grandes sont terminées de blanc ; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées

tiore marginatæ. Scapulares concolores. Quæ dorsi partem infimam & uropygium obtegunt, superioresque caudæ tectrices albo & cinereo-fusco variegatæ, duobus istis coloribus maculas transversas lunulatas efficientibus. In utroque capitis latere tænia extat candida ; prope rostri exortum orta, & supra oculos protensa : infra quam tæniam altera adest fascia saturatè fusca, prope rostri exortum pariter orta, & ad oculum usque producta. Guttur, collum inferius & pectus albicant ; eaque variegant minutæ maculæ fuscæ. Venter, latera ; crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores eodem albore nitent, & maculis transversis nigricantibus variegantur. Pennæ alas subtus obtegentes albæ sunt & immaculatæ. Superiores alarum tectrices minores ; sicut & majores corpori finitimæ, pennis dorsum vestientibus concolores ; majores verò albo terminantur ; quæ albedo in utraque ala tæniam transversam concolorem efficit : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges quatuor pri-



2. Guignette.






Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Beccaseau ou Cul-blanc.

2. Crignette.






Fig. 1.

ievahier cendre'.






Fig. 2.

Fig. 1.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Chevalier. 2. Chevalier cendré.






Fig. 1.

Echelle de 6. Pouces.

2. Chevalier tacheté.






Fig. 1.


Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces.

1. Chevalier rayé.

2. Chevalier tacheté.





2. *Alouette-de-mer à collier.*




Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Alouette-de-mer.*

2. *Alouette-de-mer à collier.*






Fig. 1.

2. *Petite Maubéche grise.*







Fig. 2.

Fig. 1.

Designé et Gravé par Martinet.

1. Maubéche.

2. Petite Maubéche grise.






Fig. 2.

Echelle de 3. pouces.

2 : Maubèche grise.






Fig. 1.


Fig. 2.

Echelle de 3. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Maubêche tachetée.

2. Maubêche grise.



7



Fig. 1.

2. Combattant ou Paon-de-mer, femelle.






Fig. 2.

Fig. 1.

Echelle de

6. Pouces.

Designé et Gravé par Martinet.

1. Combattant ou Paon-de-mer, mâle.

2. Combattant ou Paon-de-mer, femelle.



mores nigricant, & scapodonantur candido : quinque proximè sequentes, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt nigricantes, exterius albo marginatæ : quatuor quæ sequuntur, à decima scilicet ad decimam tertiam usque inclusivè, cinereo-fuscæ, albo in apice tantùm marginatæ : reliquæ omnes similiter cinereo-fuscæ, sed griseo fimbriatæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus, quarum decem intermediæ sunt cinereo-fuscæ : utrinque extrema candida. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum saturatissimo fusco imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusco-viridescentes. Facile pinguescit hæc Avis, & in cibis est delicatissima. Habitat in *Angliæ* Septentrionalibus Provinciis.

de blanc par le bout. Les quatre premières plumes de l'aîle sont noirâtres, & ont leur tige blanche : les cinq suivantes, savoir depuis la cinquième jusqu'à la neuvième inclusivement, sont noirâtres, & bordées extérieurement de blanc : les quatre qui suivent, savoir depuis la dixième jusqu'à la treizième inclusivement, sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc seulement par le bout : toutes les autres sont pareillement d'un cendré-brun, mais elles sont bordées de gris. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont d'un cendré-brun : & la plus extérieure de chaque côté est blanche. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un cendré très-foncé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. Cet Oiseau s'engraisse aisément, & est très-bon à manger. On le trouve dans les Provinces Septentrionales d'*Angleterre*.

LXXVI.

Genus Limosæ.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :

LXXVI.

Le genre de la Barge.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :	Crura in parte inferiore plumis denudata :
Le bec menu , très-long , plutôt recourbé en en-haut que droit , & dont le bout est obtus & lisse.	Rostrum gracile , longissimum , subrectum , sursum modicè tendens ; ipsius apice obtuso & levi.

** I. LA BARGE.

Limosa superne griseo-fusca , pennis nigricantibus , ad margines maculis rufis variegatis , intersertis , infernè alba ; gutture albo-rufescente ; collo griseo & rufescente vario , lineolis longitudinalibus fuscis in ima parte notato ; pectore griseo-candicante , tæniis transversis fuscis variegato ; uropygio fusco ; rectricibus in exortu albis , in extremitate nigris , octo intermediis apice griseis , tribus utrinque lateralibus albo in apice marginatis LIMOSA.

Numenius uropygio albo ; rectricibus nigris basi albis ; remigibus transversâ albâ maculâ , exceptis quatuor primis. Faun. Suec. Linn. N^o. 144.

Numenius medius. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 59. sp. 3.

Scolopax rostro recto lævi , pedibus fuscis , remigibus maculâ albâ : quatuor primis immaculatis. Limosa. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 16.

Scolopax , Rusticola Aldrovandi. Klein. Avi. pag. 100. N^o. 5.

An Elaphis? Gesn. Avi. pag. 333.

Totanus cinereus , rostro prælongo. Barr Ornith. Class. IV. Gen. IV. sp. 1.

Totanus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 431. hujus icon non satis accurata pag. 430.

Jonst. Avi. pag. 108. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 52.

Moehr. Avi. Gen. 88.

Fedoa secunda , quæ eadem esse videtur cum Totano Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 216. hujus icon non satis accurata Tab. LIII , sub titulo , Fedoa altera ; & insuper altera icon ab Aldrovando mutuata eâdem Tab. sub titulo , Totanus.

Fedoa nostra secunda , seu Totanus Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 105. N^o. A. 5.

Gallinago cinerea major. Marsil. Danub. Tom. V. Mas pag. 30 ; cum hujus icone non satis accurata Tab. 13 , & fœmina pag. 32 ; cum hujus icone non satis accurata Tab. 14.

Barge Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 434. hujus icon pessima pag. 436.*

Barge Gallorum, quam Ægocephalum facit Bellonius. *Jonst. Avi. pag. 106.*

Charlet. Exer. pag. III. N^o. X.

Charlet. Onomazt. pag. 104. N^o. X.

Barge. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 205; avec une mauvaise figure pag. 206.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 48 a, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs l'appellent *Ἄγροκέφαλος*. *Bel. Aldrov.*

Les Catalans, BEC-LLARG. *Barr.*

Les Italiens, CHARLOT. *Gesn. Aldrov.*

Les Vénitiens, VETOLA. *Willugh.*

Les Paysans Boulonnois, PIZZACCARA. *Aldrov.*

Les Anglois, GOAT-HEAD. *Charlet. GODWIT ou STONE-PLOVER. Raj.*

Craffitie Totanum multum antecellit. Ipsi-
tudo ab apice rostri ad cau-
dam extremam quindecim
pollices & sex lineas æquat,
& ad extremos unguis unum
pedem & septem pollices.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos usque tres pol-
lices & sex lineas longum
est; cauda duos pollices &
quinque lineas; pars crurum
plumis denudata unum pol-
licem & novem lineas; pes
duos pollices cum quinque
lineis; trium digitorum an-
ticorum medius cum ungue
unum pollicem & novem
lineas, extimus sexdecim li-
neas, intimus quindecim li-
neas; posticus autem quin-
que tantummodo lineas.
Trium digitorum anticorum
medius extimo digito coa-
dunatur membranulâ ad pri-

Elle est beaucoup plus grosse
que le *Chevalier*. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est de quinze
pouces six lignes, & jusqu'à
celui des ongles d'un pied sept
pouces. Son bec depuis son
bout jusqu'aux coins de la bou-
che a trois pouces six lignes de
long; sa queue deux pouces cinq
lignes; la partie de ses jambes
qui est dégarinée de plumes, un
pouce neuf lignes; son pied
deux pouces cinq lignes; celui
du milieu des trois doigts an-
térieurs, joint avec l'ongle, un
pouce neuf lignes, l'extérieur
seize lignes, l'intérieur quinze
lignes; & celui de derrière cinq
lignes seulement. Celui du mi-
lieu des trois doigts antérieurs
est réuni avec le doigt extérieur
par une petite membrane, qui
s'étend jusqu'à la première arti-
culation. Elle a deux pieds de

vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La bête du bec est entourée de petites plumes d'un blanc sale & roussâtre. La partie supérieure de la tête est couverte de petites plumes qui sont d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & rousses sur leurs bords. Les côtés de la tête, au-dessous des yeux, ou les joues sont roussâtres. La gorge est d'un blanc mêlé d'une très-légère teinte de roussâtre. Le col est varié de gris & de roussâtre, & marqué vers le bas de sa partie inférieure de petites lignes longitudinales brunes. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, le tout étant mêlé de quelques plumes noirâtres, variées sur leurs bords de grandes taches rousses. La partie inférieure du dos & le croupion sont bruns. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches; les plus grandes cependant sont terminées de noirâtre. La poitrine est d'un gris-blanchâtre, varié de bandes transversales brunes. Le haut des côtés est d'un gris clair. Le bas des côtés, le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du des-

mus usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Basim rostri ambiunt plumulæ sordidè alborufescentes. Capitis superior pars plumulis vestitur in medio secundùm ipsarum scapilongitudinem saturatè fuscis, ad margines rufis. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ rufescunt. Guttur abicat, & aliquid rufescentis admixtum habet. Collum griseo & rufescente varium, lineolis longitudinalibus fuscis versùs colli inferioris imam partem insignitum. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt griseo-fuscæ, pennis quibusdam nigricantibus, ad margines majusculis maculis rufis variegatis, interfertis. Dorsum infimum & uropygium fusca sunt. Superiores caudæ tectrices candidæ; ex istis tamen majores nigricante terminantur. Pectus est griseo-candicans, tæniis transversis fuscis varium. Laterum suprema pars dilutè grisea. Laterum pars infima, venter & crurum pars suprema

Suprema albicant. Tectrices caudæ inferiores concolores, maculis quibusdam nigricantibus variæ. Pennæ alas subtus obtegentes pariter candidæ, exceptis tamen minimis, illis scilicet quæ secundum alarum marginum longitudinem positæ sunt, fuscis, albo fimbriatis. Superiores alarum tectrices minimæ, illæ scilicet quæ alarum articulum carpo humano respondentem obtegent, fuscæ: mediæ, sicut & majores corpori viciniores, griseo-fuscæ, majoribus inter novissimas istas albido marginatis: majores à corpore remotiores nigricantes, apicibus albis præditæ. Alarum componunt viginti septem remiges, quarum primores quatuor nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versus duas tertias longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ, & scapo versus ipsarum extremitatem usque albo præditæ: novem proximè sequentes, à quinta scilicet ad decimam tertiam usque inclusivè, ab ipsarum exortu mediam versus longitudinem usque albæ, à medietate ad apicem nigricantes: tres quæ proximè sequun-

sous de la queue sont de la même couleur, & variées de quelques taches noirâtres. Celles du dessous des ailes sont pareillement blanches, si l'on en excepte les plus petites, sçavoir celles qui sont tout le long du bord de l'aile, qui sont brunes & bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont brunes: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, les plus grandes de ces dernières étant bordées de blanchâtre: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & terminées de blanc. L'aile est composée de vingt-sept plumes: les quatre premières sont noirâtres, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, & cela depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; elles ont aussi leur tige blanche jusque vers leur extrémité: les neuf suivantes, sçavoir depuis la cinquième jusqu'à la treizième inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de-là jusqu'à leur extrémité elles sont noirâtres: les trois qui suivent immédiatement ces dernières,

ſçavoir depuis la quatorzième juſqu'à la ſeizième inclusive-
ment, ſont blanches depuis
leur origine juſque vers les deux
tiers de leur longueur, le reſte
eſt d'un brun-noirâtre & bordé
de blanc : la dix-ſeptième &
la dix-huitième ſont blanches,
excepté leur bout, qui eſt d'un
brun-noirâtre, bordé & terminé
de blanc : les trois ſuivantes,
ſçavoir depuis la dix-neuvième
juſqu'à la vingt-unième incluſive-
ment, ſont blanches, & mar-
quées chacune d'une grande ta-
che brune, placée à leur extrémi-
té ſur le côté intérieur : enfin les
ſix plus proches du corps ſont
d'un gris-brun. Ces ſix dernie-
res ſont longues & pointues,
& s'étendent, lorſque l'aîle eſt
pliée, preſqu'auffi loin que les
plus grandes plumes de l'aîle.
La première des plumes de
l'aîle eſt la plus longue de tou-
tes. La queue eſt compoſée
de douze plumes blanches à
leur origine, & noires vers leur
extrémité : le blanc occupe
d'autant plus d'eſpace, que la
plume eſt plus extérieure ; de
ſorte que les deux du milieu
n'ont que fort peu de blanc ;
dans les autres plumes cette
couleur s'étend de plus en plus
loin, de façon que la plus ex-
térieure de chaque côté eſt
blanche juſque vers les trois

tur, à decima quarta ſcili-
cet ad decimam ſextam uſ-
que incluſivè, ab ipſarum
exortu verſus duas tertias
longitudinis partes uſque
candidæ, in reliqua longi-
tudine fuſco-nigricantes, al-
bo ſimbriatæ : decima ſepti-
ma & decima oſtava albæ,
excepto apice fuſco-nigri-
cante, albo marginato &
terminato : tres ſequentes,
à decima nona ſcilicet ad
vigefimam primam uſque in-
cluſivè, candidæ, majusculâ
maculâ fuſcâ, ad extremi-
tatem in latere interiore po-
ſitâ, notatæ : ſex tandem
corpori vicinioreſ grifeo-
fuſcæ. Sex iſtæ noviffimæ
longæ ſunt & in acumen
deſinentes, & dum ala com-
plicatur, majorum remigum
extremitates ferè pertin-
gunt. Remix prima reliqua-
rum omnium longitudinem
ſuperat. Cauda duodecim
conſtat rectricibus in exortu
albis, in extremitate nigris :
albus autem color eò majus
ſpatium occupat, quò rec-
trix exterior ſit ; ita ut in
binis intermediis non mul-
tùm ſit alboris ; in aliis verò
rectricibus albor magis ma-
giſque protenditur, ita ut
utrinque extrema verſus tres
quartas longitudinis partes

usque fit candida : binæ intermediae sunt insuper griseo terminatae ; tres utrinque proximè sequentes apice dilutiùs griseo , albo marginato , præditæ. Binæ rectrices intermediae lateralibus paululùm longitudine cedunt ; unde fit cauda nonnihil bifurca. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides candidantes. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque rubro-flavicans , in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata , pedes , unguesque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

quarts de sa longueur : de plus les deux du milieu sont terminées de gris ; & les trois suivantes de chaque côté sont terminées d'un gris plus clair , lequel est bordé de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus courtes que les latérales , ce qui rend la queue un peu fourchue. La prunelle des yeux est noire : leur iris est blanchâtre. Le bec est d'un rouge-jaunâtre depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur , le reste est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LA BARGE GRISE.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 1.

Limosa superne griseo-fusca , maculis nigricantibus varia , infernè alba ; capite & collo superioribus fusco-nigricantibus , marginibus pennarum albidis ; collo inferiore & pectore lineis longitudinalibus fusco-nigricantibus variegatis ; taniâ supra oculos & uropygio candidis ; rectricibus albis , fusco transversim striatis , lateralibus interiùs versùs exortum penitùs candidis LIMOSA GRISEA.

Totanus. *Gesn. Avi. pag. 518 , in qua hujus icon non satis accurata.*

Totanus Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 429. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 557.*

- Gallinulæ maritimæ genus aliud, Venetis Totanus. *Gesn. icon. Avi.* pag. 115, in qua hujus icon non satis accurata.
- Glareola, Barker, Albini. *Klein. Avi.* pag. 102. N°. 12.
- Crex. *Bell. Obs.* pag. 103.
- Jonst. Avi.* pag. 108.
- Crex Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III.* pag. 428.
- Willugh. Ornith.* pag. 220.
- Raj. Syn. Avi.* pag. 106. N°. 10.
- Charlet. Exer.* pag. 111. N°. III.
- Charlet. Onomazt.* pag. 106. N°. III.
- Oiseau nommé Crex. *Bel. Hist. Nat. des Ois.* pag. 207.
- Petit Corlieu ou Aboyeur des Anglois. *Alb. Tom. II.* pag. 45; avec une figure mal coloriée Pl. 71.
- Les Vénitiens l'appellent TOTANO. *Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, MEER-HOUN. *Gesn.*
- Les Allemands qui habitent les côtes de la mer, POL-SCHNEP ou PFUL-SCHNEPFF. *Gesn.*
- Les Anglois, BARKER. *Alb.*

Elle est à peu près de la longueur du Chevalier. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie

Cum Totano crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos unguis quatuordecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum quinque lineis; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas; extimus quatuordecim lineas, intimus duodecim cum

femi lineas ; posticus autem tres tantum cum femi lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extremo digito connectitur membranula ad primum usque articulum extensa, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis octo pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitæ & colli superiores vestiunt pennæ fusco-nigricantes, in utroque latere albido marginatæ. Dorsum suprema pars est griseo-fusca, majusculis maculis nigricantibus notata. Pennæ scapulares concolores, sed in utroque latere albido marginatæ ; qui albidus color griseo-fusco quasi dentatim admiscetur. Guttur albicat. In utroque capitæ latere tania extat similiter candida, prope rostri exortum orta, & supra oculos producta. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ albæ, lineâ fusco-nigricante, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices,

seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a un pied huit pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre, bordées des deux côtés de blanchâtre. La partie supérieure du dos est d'un gris-brun, marqué d'assez grandes taches noirâtres. Les plumes scapulaires sont de la même couleur, mais elles sont bordées des deux côtés de blanchâtre, qui est comme dentelé & engrené dans le gris-brun. La gorge est blanche. De chaque côté de la tête est une bande de la même couleur, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend jusqu'au-dessus des yeux. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes blanches, marquées chacune d'une ligne d'un brun-noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, la partie inférieure

du dos & le croupion sont blancs. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur, & rayées transversalement de brun. Celles du dessous des ailes sont pareillement blanches, & rayées de bandes brunes, placées obliquement sur chacun des côtés, & formant ensemble des angles, dont les sommets sont sur la tige de la plume. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont brunes; & de celles-ci, celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont bordées de blanchâtre: les moyennes sont d'un gris-brun: les grandes les plus proches du corps sont de cette dernière couleur, bordées extérieurement de gris clair, & intérieurement de blanc, ces deux couleurs étant comme dentelées & engrenées dans le gris-brun: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres; & de celles-là, les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-six plumes: les sept premières sont d'un gris-blanc en-dessous, mais en-dessus elles sont noirâtres, ayant une grande

dorsum infimum & uropygium albert. Superiores caudæ tectrices concolores, sed fusco transversim striatæ. Pennæ alas subtus cooperientes pariter candidæ, tanniis striatæ fuscis, in utroque latere obliquè positis, & simul efficientibus angulos, quorum apices scapis pennarum incumbunt. Margines alarum, infra articulum carpo humano respondentem, obtegunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ fuscæ sunt; ex istis autem, quæ alæ articulum carpo humano respondentem cooperiunt, albedo marginantur: mediæ sunt griseofuscæ: majores corpori finitimæ concolores, exteriùs griseo dilutiore, interiùs albo fimbriatæ, duobus istis coloribus griseo-fusco quasi dentatim immixtis: majores tandem à corpore remotiores nigricantes; ex istis verò intimæ albo in apice marginatæ. Alam componunt viginti sex remiges: septem primores sunt subtus cinereo-albæ, superne verò nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte griseæ, fusco nonnihil maculatæ; prioris insuper scapus

albicat : quatuordecim proximè sequentes, ab oëtava scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, griseo-fuscæ, albo exterius marginatæ, qui color albus griseo-fusco quasi dentatim immiscetur; quatuordecim istæ remiges sunt insuper in latere interiore maximâ parte candidæ, tæniis transversis & undatis griseo-fuscis striatæ : quinque corpori viciniore similitè griseo-fuscæ, griseo diluto fimbriatæ, qui novissimus color griseo-fusco quasi dentatim immiscetur; vigesima quarta & vigesima quinta sunt insuper in utroque latere versùs ipsarum margines tæniis transversis fusco-nigricantibus striatæ. Quinque remiges corpori finitimæ longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur : binæ intermediæ sunt in utroque latere fusco transversim striatæ : laterales omnes similitè striatæ, sed tantùm in latere exteriori & paululùm insuper in latere interiore solummodo versùs extremitatem. Rostrum fuscum. Pars crurum

partie de leur côté intérieur grise & un peu tachetée de brun; de plus la tige de la première est blanche : les quatorze suivantes, sçavoir depuis la huitième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées extérieurement d'un blanc qui est comme dentelé & engrené dans le gris-brun, & ayant de plus une grande partie de leur côté intérieur blanche, & rayée de bandes transversales & en zigzags d'un gris-brun; les cinq plus proches du corps sont de cette dernière couleur, & bordées de gris clair, lequel est comme dentelé & engrené dans le gris-brun; la vingt-quatrième & la vingt-cinquième sont de plus rayées des deux côtés vers leurs bords de bandes transversales d'un brun-noirâtre. Les cinq plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches : les deux du milieu sont des deux côtés rayées transversalement de brun : toutes les latérales sont rayées de même, mais seulement du côté extérieur & un peu vers le bout du côté intérieur. Le bec est brun. La

partie des jambes qui est dé-
garnie de plumes, & les pieds
font gris; & les ongles noirâ-
tres. On la trouve sur les bords
de la mer. *Du cabinet de M.*
l'Abbé Aubry.

plumis denudata, pedesque
grisei; ungues verò nigri-
cantes. Circa maris littora
versatur. *Ex museo D. Au-*
bry.

** 3. LA GRANDE BARGE GRISE.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 2.

Limosa superne saturatè fusca, marginibus pennarum albidis, infernè alba; gutture albo-rufescente; collo albido, maculis longitudinalibus fuscis vario; uropygio fusco, marginibus pennarum candidis; rectricibus albis, nigricante transversim striatis LIMOSA GRISEA MAJOR.

Gallinulæ maritimæ genus, quod Venetis vulgò Limosam vocant:

Gesn. icon. Avi. pag. 114, in qua hujus icon non satis accurata.

Limosa. Gesn. Avi. pag. 519, in qua eadem icon.

Limosa Venetorum. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 434. hujus icon pessima pag. 435.

Jonst. Avi. pag. 106.

Charlet. Exer. pag. 110. N° IX.

Charlet. Onomazt. pag. 104. N° IX.

Glottis. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 59. sp. 5.

Glottis; Lingulaca Gazæ. Gesn. Avi. pag. 520.

Glottis, seu Pluvialis major Aldrovandi. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 317. N° IX. hujus icon minimè accurata Tab. 268.

Pluvialis major. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 535, in qua hujus icon non satis accurata.

Pluvialis major Aldrovando. Jonst. Avi. pag. 114. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53.

Willugh. Ornith. pag. 220. hujus icon minimè accurata Tab. LV, sub titulo, Glottis, seu Pluvialis major Ald.

Raj. Syn. Avi. pag. 106. N° 4. 8.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. N° 6.

Charlet. Exer. pag. 114. N° 3.

Charlet. Onomazt. pag. 109. N° 3.

Pluvialis major Aldrovandi; Limosa Venetorum; Glottis Gesneri.

Rzac. Aucl. Hist. nat. Pol. pag. 415.

Pluvialis

LES OISEAUX, Classe III. Ordre XVII. 273

Pluvialis major Aldrovando ; Glottis Baltnero , Venetis Totano. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 48. hujus icon non satis accurata Tab. 22.*

Scolopax rostro recto basi inferiori rubro , pedibus virescentibus. Glottis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 9.*

Numenius pedibus virescentibus , urrhopygio albo , remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Faun. Suec. Linn. N^o. 142.*

Femelle du Chevalier aux pieds rouges. *Alb. Tom. II. pag. 43 ; avec une figure peu exacte Pl. 69.*

Les Grecs l'appellent Γλωτλις. *Gesfn.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur , GIRARDEL. *Gesfn. Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Vénitiens , LIMOSA. *Gesfn. Aldrov. Willugh. Rzac. TOTANO. Willugh. Marfil.*

Les Boulonnois , PLUIERO. *Aldrov.*

Les Napolitains , LEVERSINA. *Gesfn. Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Allemands , MEER-HOUN. *Gesfn. Aldrov. Jonst.*

Les Suédois , GLUTT. *Linn.*

Les Anglois , GREEN LEGGED HORSEMAN. *Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque , CURLEW. *Sloane. Raj.*

Limosæ vulgari nonnihil crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos unguis quindecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est ; cauda duos pollices & quatuor lineas ; pars crurum plumis denudata tredecim lineas ; pes unum pollicem cum decem lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas , extimus tredecim lineas , intimus duodecim cum semi lineas ; posticus autem quinque lineas. Trium

Tom. V.

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la *Barge ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces deux lignes de long ; sa queue deux pouces quatre lignes ; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, treize lignes ; son pied un pouce dix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , quatorze lignes & demie ; l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derriere cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts anté-

M m

rieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a deux pieds un pouce de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanchâtres sur les côtés. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, sont d'un brun foncé, bordées de blanchâtre. Les scapulaires sont de la même couleur; mais le blanchâtre est comme dentelé & engrené dans le brun. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, marquées d'une large bordure blanche. Les couvertures du dessus de la queue sont de cette dernière couleur, & variées de grandes taches transversales brunes. La gorge est d'un blanc très-légerement nuancé de roussâtre. Les côtés de la tête ou les joues sont de la même couleur, mais chaque plume est marquée dans son milieu d'une petite tache longitudinale brune. Celles qui couvrent la partie inférieure du col, sont blanchâtres, & marquées de même dans leur

digitorum anticorum medius digito intimo coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & pollicis unius intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores pennis vestiuntur in medio secundum ipsarum scapi longitudinem fuscis, ad latera albidis. Quæ partem dorsi supremam obtegunt, sunt saturatè fuscæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares concolores; in illis tamen color albidus in fusco quasi dentatim includitur. Dorsum infimum & uropygium cooperiunt pennæ fuscæ, latiusculâ margine candidâ donatæ. Superiores caudæ rectrices candido quoque colore imbutæ, & majusculis variegatæ maculis transversis fuscis. Guttur albicat, & rufescente paululùm adumbratur. Caput ad latera five genæ eodem imbuuntur colore; quælibet tamen penna minutâ maculâ longitudinali fuscâ in medio insignitur. Quæ partem colli inferiorem vestiunt, sunt albi-

dæ, minutâ maculâ fuscâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ; in medio similiter notatâ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes penitus albescent; pennæ tamen laterum partem supremam cooperientes scapo fusco donantur. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, cooperiunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores sunt fuscæ, cinereo-albo marginatæ; majores corpori viciniores fuscæ, latâ margine candidâ præditæ: majores à corpore remotiores nigricantes, paucò albido in apice fimbriatæ. Remiges majores in latere exteriori & extremitate nigricantes, in latere interiore versus scapum cinereo-fuscæ, maculis candidis aspersæ, & versus margines penitus candidæ; scapo similiter candido præditæ sunt; omnes istæ remiges, quinque primoribus exceptis, sunt insuper albo marginatæ: minores sunt dilutè cinereo-fuscæ, maculis quibusdam albis variæ, albo insuper in

milieu d'une petite tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont entièrement blancs; cependant les plumes qui couvrent le haut des côtés, ont leur tige brune. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessous des ailes sont brunes, & bordées de gris-blanc: les grandes les plus proches du corps sont brunes, & marquées d'une large bordure blanche: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées d'un peu de blanchâtre par le bout. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est, vers la tige, d'un cendré-brun parsemé de taches blanches, & vers les bords il est entièrement blanc; leur tige est de cette dernière couleur; toutes ces plumes, excepté les cinq premières, sont de plus bordées de blanc: les moyennes sont d'un cendré-brun assez clair, variées de quelques taches blanches, & bordées de la même couleur dans

toute leur circonférence : il faut cependant en excepter les quatre plus proches du corps, qui depuis la moitié de leur longueur jusqu'à leur extrémité sont marquées de bandes transversales, les unes noirâtres, & les autres grises; & de quelques autres bandes blanchâtres, placées vers leur bout. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de noirâtre. Le bec est brun à son origine; cette couleur devient de plus en plus foncée en approchant de son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un noir verdâtre; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer & des rivières. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

Limosa supérne fufco-nigricans

**** 4. LA BARGE BRUNE.**

Voyez Pl. XXIII. Fig. 2.

Limosa supérne fufco-nigricans, marginibus pennarum albidis, infernè saturatè cinerea, albo variegata; vertice cinereo-nigricante; uropygio candido; rectricibus binis intermediis

tota circumferentia fimbriatæ: ex istis tamen excipienda sunt quatuor corpori viciniore ab ipsarum media longitudine ad extremitatem usque tæniis insignitæ transversis, aliis nigricantibus, aliis griseis, & quibusdam insuper alteris tæniis albidis, versùs ipsarum apicem positis. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices albæ, nigricante transversim striatæ. Rostrum in exortu fusco imbitur; qui color, versùs apicem procedendo, sensim atque sensim fit saturatior; apex autem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigro-viridescentes; ungues verò nigri. Juxta maris & fluviorum littora versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

fusco-nigricantibus, candicante transversim striatis, lateralibus fuscis, albo transversim striatis. . . . LIMOSA FUSCA.

Crassitie *Limosam griseam* paululum antecellit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos unguës quatuordecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quatuor lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata octodecim cum semi lineas; pes duos pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem tres solummodo cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum entensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis septem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem attingunt, Ca-

Elle est un peu plus grosse que la *Barge grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces quatre lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, dix-huit lignes & demie; son pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derrière trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a un pied sept pouces trois lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le dessus de la tête est d'un cendré-noirâtre. La partie supérieure du col est couverte de plumes

d'un brun foncé, bordées d'un peu de blanchâtre par le bout. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, sont d'un brun - noirâtre, & bordées de blanchâtre. Les scapulaires supérieures sont aussi d'un brun-noirâtre, marquées sur les deux bords de taches blanchâtres, & bordées de la même couleur par le bout : les inférieures sont d'un gris-brun, marquées de même sur les deux bords de taches blanchâtres. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un cendré foncé. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont du même cendré, lequel s'éclaircit de plus en plus en approchant du bas-ventre ; le tout est mêlé çà & là de quelques plumes blanches ; & celles du bas-ventre sont bordées de blanc. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé, rayées transversalement de blanc. Celles du dessous sont blanches, & rayées transversalement de brun. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les couvertures du dessous des ailes

put superius ex cinereo nigricat. Partem colli superiorem vestiunt pennæ saturatè fusæ, paucò albido in apice marginatæ. Quæ dorsi supremam partem obtegunt, ex fusco nigricant, & albido marginantur. Scapulares superiores sunt quoque fusconigricantes, maculis albidis in utraque margine insignitæ, eodemque albido in apice fimbriatæ : inferiores griseo-fusæ, maculis albidis in utraque margine similiter notatæ. Dorsum infimum & uropygium albicant. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur & pars colli inferior saturatè cinerascunt. Pectus, venter, latera, crurumque suprema pars eodem tinguntur cinereo ; qui color, versùs imum ventrem procedendo, sensim atque sensim fit dilutior ; omnes autem partes istas variegant albæ quædam pennæ ; quæ verò infimum ventrem cooperiunt, albo fimbriantur. Tectrices caudæ superiores sunt saturatè fusæ, albo transversim striatæ. Pennæ caudam subtus obtegentes candidæ, tæniis transversis fuscis variæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, coo-

periunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Tectrices alarum inferiores candidæ. Superiores minimæ fuscæ : mediæ concolores, ad margines albo maculatæ : majores corpori finitimæ eodem fusco imbutæ, taniis transversis saturatiùs fuscis in utroque latere notatæ, ad margines maculis albidis variegatæ, & albo in extremitate fimbriatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ ; ex istis autem binæ intimæ albo in apice marginantur. Alam componunt viginti quinque remiges, quarum decem primores sunt subtus cinereo-albæ ; superne verò sex primores saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte candicantes, griseo-fusco maculatæ ; prioris insuper scapus albicat : quatuor reliquæ, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, fusco dilutiore tinctæ, & in latere interiore maximâ parte similiter candicantes, griseo-fusco maculatæ ; ad exteriorem marginem maculis insuper albis notantur, & albo in apice marginantur : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, quatuor nu-

font blanches. Les plus petites du dessus font brunes : les moyennes font de la même couleur, & tachetées de blanc sur les bords : les grandes les plus proches du corps font pareillement brunes, marquées des deux côtés de bandes transversales d'un brun plus foncé, tachetées de blanchâtre sur les bords, & bordées de blanc par le bout : les grandes les plus éloignées du corps font d'un brun foncé ; & de celles-là les deux plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les dix premières font d'un gris-blanc en-dessous ; mais en-dessus les six premières font d'un brun foncé, ayant une grande partie de leur côté intérieur blanchâtre, & tachetée de gris-brun ; de plus la tige de la première est blanche : les quatre autres, sçavoir depuis la septième jusqu'à la dixième inclusivement, font d'un brun plus clair, & ont de même une grande partie de leur côté intérieur blanchâtre, & tachetée de gris-brun ; elles font de plus tachetées de blanc sur le bord extérieur, & bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la quatorzième inclusivement, font de la même cou-

leur que les quatre dernières, avec cette différence cependant que leur côté intérieur est rayé transversalement de brun & de blanc : les sept qui suivent immédiatement ces dernières, sçavoir depuis la quinzième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont des deux côtés rayées transversalement de brun & de blanc : la vingt-deuxième est d'un gris-brun, & tachetée de blanchâtre sur ses bords : les trois plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & tachetées de même de blanchâtre sur leurs bords. Les quatre plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun-noirâtre, rayé transversalement de blanchâtre : les latérales sont brunes, & rayées transversalement de blanc. Le bec est noir, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui est blanchâtre. Le bout du bec est un peu courbé en en-bas. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

per descriptis concolores; ab illis tamen discrepantes in eo quod ad latus interius fusco & albo sint transversim striatæ : septem quæ novissimas istas proximè sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt in utroque latere fusco & albo transversim striatæ : vigesima secunda griseo-fusca; maculis albidis ad margines variegata : tres corpori viciniore fusco-nigricantes, ad margines albedo similiter maculatæ. Remiges quatuor corpori finitimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates fermè pertinent. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ sunt fusco-nigricantes, candicante transversim striatæ : laterales fuscæ, albo transversim striatæ. Rostrum nigrum, excepto tamen mandibulæ inferioris exortu albedo. Rostrum autem extremitas paululùm deorsum incurvatur. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusci. Juxta maris littora degit. *Ex museo D. Aubry.*

** 5. LA BARGE ROUSSE.

Voyez Pl. XXV. Fig. 1.

Limosa superne nigricans, marginibus pennarum rufescentibus, infernè ferruginea; taniâ supra oculos rufescente; uropygio albo-rufescente, maculis longitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus fuscis albo transversim striatis....
LIMOSA RUFA.

Scolopax rostro subrecurvato, pedibusque nigris, pectore ferrugineo.
Scolopax Lapponica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 12.
Scolopax rostro recto flavescente, pedibus fuscis, corpore subtus fulvo fusco-undato. *Hæmastica. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 14.*
Totanus fulvus, maculis fuscis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IV. sp. 2.*
Recurvirostra pectore croceo. *Faun. Suec. Linn. N°. 138.*
Francolin à poitrine rouge. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVIII; avec une figure assez exacte Pl. 138.*
Les Anglois l'appellent RED-BREADED GODWIT. Edwards.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos unguis quatuordecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices cum linea una longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes unum pollicem & decem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus unum pollicem; post-

Tom. V.

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, quinze lignes; son pied un pouce dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur un pouce; & celui de derrière quatre lignes seulement. Celui du

N n

milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a un pied onze pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes noirâtres, bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande roussâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un blanc mêlé d'une légère teinte de roussâtre, & marquées chacune d'une tache noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de blanc-roussâtre & de brun. La gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un beau ferrugineux. Le haut des jambes est de la même couleur, mais beaucoup plus claire. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches, & variées de taches brunes,

cus autem quatuor tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extremum digitum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & quatuor linearum; alarum verò complicatarum caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennae nigricantes, marginibus rufescentibus praeditae. Scapulares concolores. In utroque capitis latere tænia extat rufescens, ab exortu rostri orta, supra oculos ducta, & versus occipitium usque protensa. Dorsum inferum & uropygium pennae vestiuntur albo-rufescentibus, maculâ nigricante, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatis. Superiores caudae tectrices variegant tæniae transversae alternatim albo-rufescentes & fuscae. Guttur, collum inferius & ad latera, pectus, venter, latera, inferioresque caudae tectrices eleganti ferrugineo colore imbuuntur. Crurum partem supremam tingit idem color, sed multò dilutior. Pennae alas subtus

obtegentes sunt candidæ, easque variegant maculæ fuscæ, cujuslibet pennæ medium occupantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ, albo fimbriatæ : majores à corpore remotiores, fusco-nigricantes ; ex istis autem intimæ sunt in apice albo marginatæ. Alam componunt viginti septem remiges : sex primores ex fusco nigricant, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque sunt in latere interiore maximâ parte dilutè griseæ, albido maculatæ ; scapo insuper albo-rufescente donantur : septima & octava remigibus nuper descriptis concolores, sed albo insuper in tota ipsarum circumferentia marginantur : quindecim proximè sequentes, à nona scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, sunt in latere exteriorè griseo-fuscæ, in interiore griseæ, inque tota circumferentia albo fimbriatæ : quatuor corpori viciniores fusco-nigricantes, maculis rufescentibus ad margines variegatæ. Quæ quatuor novissimæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala com-

placées au milieu de chaque plume. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre ; & de celles-ci les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les six premières sont d'un brun-noirâtre, ayant cependant depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur d'un gris clair, tacheté de blanchâtre ; elles ont aussi leur tige d'un blanc-roussâtre : la septième & la huitième sont colorées comme ces dernières, mais elles sont de plus bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quinze suivantes, sçavoir depuis la neuvième jusqu'à la vingt-troisième inclusivement, sont d'un gris-brun du côté extérieur, grises du côté intérieur, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quatre plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & variées sur leurs bords de taches roussâtres. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée,

un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes brunes, rayées transversalement d'un blanc qui en quelques endroits tire un peu sur le rouffâtre. Le bec est d'un jaune-rougeâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont de cette dernière couleur; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer *Du cabinet de M. Mauduyt.*

plicatur, nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus fuscis, albo transversim striatis; quæ albedo quibusdam in locis paululum ad rufescentem inclinat colorem. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque ex luteo rubescit, à medietate ad apicem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter nigricantes, ungues verò nigri. Circa maris littora versatur. *Ex museo D. Mauduyt.*

6. LA GRANDE BARGE ROUSSE.

Limosa superne nigricans, marginibus pennarum rufescentibus, infernè sordidè alba, maculis transversis nigricantibus varia; taniâ supra oculos albo-rufescente; collo rufo, infernè nigricante transversim striato; uropygio candido, maculis nigricantibus vario; rectricibus nigricantibus, albo transversim striatis LIMOSA RUFA MAJOR.

Scolopax rostro recto, pedibus virescentibus, capite colloque rufescentibus, remigibus tribus nigris basi albis. *Ægocephala. Linn. Systh. Nat. et. 10. Gen. 77. sp. 13.*

Barge seu *Ægocephalus Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 215.*

Raj. Syn. Avi. pag. 105. N^o. A. 4.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 36. hujus icon non satis accurata Tab. 16.

Glareola *Ægocephalus. Klein. Avi. pag. 102. N^o. 11.*

Francolin. *Alb. Tom. II. pag. 44; avec une figure mal coloriée Pl. 70.*

Les Anglois l'appellent GODWIT. *Willugh. Atb. & en quelques endroits, STONE-POLOVER. Willugh.*

Les Anglois qui habitent l'Isle d'Ely & Cambridge, YARWHELP ou YARWIP. *Willugh. Raj.*

Præcedentem multum crassitie superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices explet, & ad extremos unguis unum pedem quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extremus duodecim cum semi lineas, intimus unum pollicem; posticus autem quatuor lineas tantum. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranula ad primum usque articulum extensa. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Pennæ partem capitis superiorem, sicut & dorsi supremam, obtegentes nigricant, & marginibus donantur rufescentibus. Scapulares concolores. In utroque capitis latere tænia extat albo-rufescens, pro-

Elle est beaucoup plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces quatre lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, treize lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur un pouce; & celui de derrière quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a deux pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du dos sont couvertes de plumes noirâtres, bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande d'un blanc-roussâtre, qui part d'après de l'origine du bec, & s'étend jusqu'au - dessus des

yeux. La gorge & le col sont roux; mais la partie inférieure du col est variée de taches transversales noirâtres. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un blanc varié de taches noirâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de blanc & de noirâtre. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc sale, varié de taches transversales noirâtres. Le haut des jambes est d'un blanc sale & sans taches. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & bordées de roussâtre: les grandes les plus éloignées du corps sont noires, & bordées de blanc seulement par le bout. Les grandes plumes de l'aile sont noires, & ont leur tige blanche; les trois premières sont de plus marquées vers le tiers de leur longueur d'une grande tache transversale blanche: toutes les moyennes sont noirâtres, bordées & terminées de roussâtre. De celles-ci les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes

pe rostri exortum orta, & supra oculos usque producta. Guttur & collum sunt rufa; colli tamen inferiorem partem variegant maculæ transversæ nigricantes. Dorsum infimum & uropygium albicant, & maculis nigricantibus variegantur. Superiores caudæ tectrices sunt albo & nigricante transversim striatæ. Pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores sordidè albert, maculisque variegantur transversis nigricantibus. Crurum suprema pars est pariter sordidè alba, sed immaculata. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, nigricant, & rufescente marginantur: majores à corpore remotiores sunt nigrae, albo in apice tantum fimbriatæ. Remiges majores nigro quoque imbutæ, scapo candido præditæ, tribus primoribus majusculâ insuper maculâ transversâ candidâ versùs ipsarum tertiam longitudinis partem insignitis: minores omnes nigricantes, rufescente fimbriatæ & terminatæ. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum

extremities ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, albo transversim striatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululum excedunt; laterales autem nonnihil gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum in exortu ex albo rubescens, versùs extremitatem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-viridescentes; ungues verò nigri. Maris arenosa littora frequentat.

noirâtres, rayées transversalement de blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un blanc-rougeâtre à son origine, & noir vers son extrémité. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre; & les ongles noirs. Elle se tient sur les sables des bords de la mer.

** 7. LA BARGE ROUSSE D'AMÉRIQUE.

Limosa superne fusco-rufescens, nigro transversim striata, infernè albo-rufescens; taniâ supra oculos, genis & gutture candidis; uropygio rufo, nigricante transversim striato; collo inferiore & pectore rufescentibus, collo inferiore maculis longitudinalibus nigris, pectore maculis transversis fuscis vario; rectricibus rufis, nigro transversim striatis . . .

LIMOSA AMERICANA RUFA.

Scolopax rostro recto longo, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctulatis. Fedoa. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 8.* Grand Francolin de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVII; avec une figure exacte Pl. 137.*

Les Anglois l'appellent GREATER AMERICAN GODWIT. *Edwards.*
Les Anglois de la Baye de Hudson, CURLEW. *Edwards.*

Crassitie præcedentem nonnihil excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sexdecim pol-

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize

pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces quatre lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégar- nie de plumes, un pouce cinq lignes; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur seize lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derrière six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite mem- brane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a deux pieds trois pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les plumes scapulaires sont d'un brun-rouffâtre, rayé trans- versalement de noir. La partie inférieure du dos & le crou- pion sont roux, & rayés trans- versalement de noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont de la même cou- leur. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part d'après de l'origine du bec,

lices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denu- data unum pollicem & quin- que lineas; pes duos polli- ces cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus sex- decim lineas, intimus qua- tuordecim lineas; posticus autem sex lineas. Trium di- gitorum anticorum medius digito extimo coadunatur membranulâ ad primum us- que articulum extensâ. Alis expansis, extremitates ma- jorum remigum duorum pe- dum & trium pollicum in- tervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex usque li- neas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capi- tis & colli superiores, sicut & dorsi suprema, scapula- resque pennæ sunt fusco-ru- fescentes, nigro transversim striatæ. Dorsum infimum & uropygium rufa, tæniis trans- versis nigricantibus varia. Superiores caudæ testrices concolores. In utroque ca- pitis

pitius latere tania extat candida, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genas, gutturque tingit idem candidus color. Collum inferius rufescit, maculisque variegatur longitudinalibus nigris. Pectus pariter rufescit, sed maculis transversis fuscis variegatur. Venter & crurum suprema pars ex albo rufescunt, & maculis destituuntur. Latera, inferioresque caudæ tectrices ex albo quoque rufescentes, maculis transversis fuscis variæ. Pennæ alas subtus obtegentes spadiceæ. Superiores alarum tectrices minimæ fuscæ, rufescente fimbriatæ: mediæ fusco-rufescentes, nigro transversim striatæ: majores corpori finitimæ concolores: sequentes, illæ scilicet quæ medium locum occupant, spadiceæ, punctulis nigris aspersæ: majores tandem à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges majores nigricant: proximè sequentes sunt spadiceæ, punctulis nigris aspersæ: corpori viciniore fusco-rufescentes, nigro transversim

& s'étend jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, & la gorge sont du même blanc. La partie inférieure du col est roussâtre, & variée de taches longitudinales noires. La poitrine est pareillement roussâtre, mais elle est variée de taches transversales brunes. Le ventre & le haut des jambes sont d'un blanc-roussâtre & sans taches. Les côtés, ainsi que les couvertures du dessous de la queue, sont de la même couleur, & variés de taches transversales brunes. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un rouge-bai. Les petites du dessus sont brunes, & bordées de roussâtre: les moyennes sont d'un brun-roussâtre, rayé transversalement de noir: les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur: les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un rouge-bai tout parsemé de petits points noirs: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres: les suivantes sont d'un rouge-bai tout parsemé de petits points noirs: & les plus proches du corps sont d'un brun-roussâtre,

rayé transversalement de noir. Ces dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes rousses, rayées transversalement de noir. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Le bec est d'un beau jaune depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, ensuite il est d'un brun qui devient de plus en plus foncé, en approchant vers son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve en différens endroits de l'Amérique. Elle a été envoyée de Canada à M. de Reaumur par M. Gautier.

striatæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus rufis, nigro transversim striatis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt. Rostrum ab ipsius exortu mediam versus longitudinem usque elegantè luteum, deinde fuscum; qui color, versùs apicem procedendo, sensim atque sensim fit saturatior; in extremitate autem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Habitat in variis Americæ regionibus. A Canada in musæum Realmurianum missa à D. Gautier.

8. LA BARGE BLANCHE.

Limosa candida; marginibus alarum, remigibus majoribus; rectricibusque albo-flavicantibus . . . LIMOSA CANDIDA.

Francolin blanc de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIX; avec une figure exacte Pl. 139. (fig. postérieure).*
Les Anglois l'appellent WHITE-GODWIT FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *Barge rousse*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatorze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles

Cum *Limosa rufa* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & tres circiter lineas explet, & ad extre-

mos unguis sexdecim pollices & novem lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata sexdecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus tredecim lineas, intimus unum pollicem; posticus autem tres tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alæ complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, crurum partem superam & latera vestiunt pennæ candidæ. Scapulares, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Inferiores alarum tectrices sunt dilutè fuscæ. Alarum margines per totam longitudinem obtegunt plumulæ albo - flavicantes. Remiges

de seize pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces deux lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, seize lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur un pouce; & celui de derrière trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un brun clair. Le bord de l'aile est couvert dans toute sa longueur de petites plumes d'un blanc-jau-

nâtre. Les grandes plumes de l'aîle font de la même couleur : les moyennes font blanches. De ces dernières, les plus proches du corps font longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes d'un blanc-jaunâtre. Le bec est orangé, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles font d'un brun foncé. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

maiores ex albo quoque flavicant : minores sunt candidæ. Ex minoribus autem, corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad caudam ferè extremam pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus albo-flavicantibus. Rostrum aurantium, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque saturatè fusci. Habitat in *Freto Hudsonis*.

LXXVII.

Le genre de la Beccasse.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec menu, très-long, droit, & dont le bout est obtus & raboteux.

LXXVII.

Genus Scolopacis.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum gracile, longissimum, rectum ; ipsius apice obtuso & rugoso.

** I. LA BECCASSE.

Scolopax superne castaneo, nigro & griseo variegata, infernè griseo-rufescens, nigricante transversim striata ; tæniâ utrinque rostrum inter & oculus nigrâ ; gutture candicante ; collo superiore tæniis quatuor transversis nigris insignito ; uropygio castaneo, nigricante transversim striato ; rectricibus nigris, apice griseis, maculis triangularibus castaneis in margine exteriori notatis SCOLOPAX.



Fig. 2.

2. Barge brune.






Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces.

1. Barge grise.

2. Barge brune.

Desseiné et Gravé par Martinet.








Fig. 2.

Echelle de 6. Pouce.

e.

2. Grande Barge grise.






Desiné et Gravé par Martinet.

1. Alouette-de-mer de S. Domingue.


2. Grande Barge grise.





Alouette-de-mer de S. Domingue.





Desmés et Gravé par Mabinet.

Echelle de 6. pouces pour la 1^{re} figure.

1. Barge rousse.

2. Petite Alouette-de-mer de S. Domingue.



LES OISEAUX, Classe III. Ordre XVII. 293

- Scolopax rostro recto lævi, pedibus cinereis, femoribus tectis, fasciâ frontis nigrâ. Rusticola. Linn. *Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 7.*
- Scolopax subtus fulva, superne cinerea. Barr. *Ornith. Class. III. Gen. XII. sp. 1.*
- Scolopax. *Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31, sub titulo, Scolopax sive Gallinago: & insuper altera icon non satis accurata Tab. 53, sub titulo, Rusticola.*
- Willugh. Ornith. pag. 213. hujus icon non satis accurata Tab. LIII.*
- Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.*
- Scolopax simpliciter Aristotelis, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag. 99. N^o. 1.*
- Scolopax, Gallinago maxima. *Raj. Syn. Avi. pag. 104. N^o. A. 1.*
- Scolopax, sive Perdix rustica. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 471. hujus icon non satis accurata pag. 473.*
- Scolopax, Rusticula major. *Charlet. Exer. pag. 112. N^o. VII. Charlet. Onomazt. pag. 108. N^o. VII.*
- Ascolopax. *Bell. Obs. pag. 18.*
- Rusticula. *Moehr. Avi. Gen. 97.*
- Rusticula, vel Perdix rustica major. *Gesn. Avi. pag. 501. hujus icon non satis accurata pag. 502. Gesn. icon. Avi. pag. 110, in qua eadem icon.*
- Perdix rustica major. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 329.*
- Perdix rustica major; Ascolopax; Scolopax; Gallinago Gazæ. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 292.*
- Perdix rustica major, feu Scolopax Aldrovandi; Gallina rustica; Rusticula major. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 409.*
- Gallina rustica. *Gesn. Avi. pag. 477.*
- Rukicola. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 59. sp. 4.*
- Numenius rostri apice lævi; capite lineâ utrinque nigrâ; rectricibus nigris apice albis. *Faun. Suec. Linn. N^o. 141.*
- Wood-Cock. *Borl. Nat. Hist. of Cornwall. pag. 245. hujus icon pessima Tab. XXIV. fig. XII.*
- Beccasse. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 272; avec une figure peu exacte pag. 273.*
- Bécasse, Bécasse grande, Béquasse, Videcocq. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 52 b, dans laquelle est la même figure.*
- Bécasse. *Alb. Tom. I. pag. 62; avec une figure peu exacte Pl. 70.*
- Les Grecs l'appellent Σκολόπαξ. *Bel. Gesn. Schwenck. Α'σκολόπαξ. Bel. Aldrov. Α'σκαλώπαξ. Schwenck. & vulgairement Ζυλόρνις. Jonst.*
- Les Grecs modernes, Χιλορνίθα. *Bell.*
- Les Turcs dans l'Asie mineure, TCHELUK. *Gesn. Aldrov.*
- Les Normands, VIDECOQ. *Gesn. Aldrov.*
- Les Catalans, BECADA. *Barr.*
- Les Italiens, BECCASSA; GALLINELLA; GALLINA ARCIERA. *Bel. Gesn.*

- Aldrov.* GALLINA RUSTICELLA ; GALLINA SALVATICA. *Aldrov.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur, GALLINAZA ; POLLA. *Bel.*
Gefn. *Aldrov.*
Les Italiens aux environs de Bresse, ARCIA. *Bel.* *Gefn.* *Aldrov.*
Les Boulonnois, PIZZACCARA. *Aldrov.*
Les Habitans de Parmes, PIZZACCARA ; BECCASSA. *Aldrov.*
Les Toscans, ACCEGGIA. *Gefn.* *Aldrov.*
Les Génois, RONZESA : & quelques-uns , ROPEZORA. *Aldrov.*
Les Allemands, SCHNEPFF. *Gefn.* *Aldrov.* GROSSER SCHNEPFF. *Gefn.*
 RIET-SCHNEPFF ; SCHNEPFF-HUN. *Gefn.* *Aldrov.* SCHNEPFFE ; SCHNEP-
 HUN ; PUSCH-SCHNEPPE, WALD-SCHNEPPE ; HOLTZ-SCHNEPPE ;
 BERG-SCHNEPPE. *Schwenck.* WALD-SCHNEPPE ; HOLTZ-SCHNEPPE ;
 BERG-SCHNEPPE. *Rzac.*
Les Flamands, SNEPPE. *Gefn.* *Aldrov.*
Les Brabançons, NEPPE. *Gefn.*
Les Polonois, SLOMKA. *Rzac.*
Les Suédois, MORKULLA. *Linn.*
Les Anglois, WOOD-COCK. *Gefn.* *Aldrov.* *Willugh.* *Raj.* *Charlet.* *Sibbald.*
Linn. *Alb.* *Borl.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *Perdrix grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces sept lignes de long ; sa queue trois pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes ; son pied dix-huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce sept lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur un pouce ; & celui de derrière cinq lignes & demie. Les trois doigts antérieurs sont réunis à leur origine par un

Perdicem cineream crassitie circiter æmulatur. Ipsi-
 us longitudo ab apice rostri ad
 caudam extremam tredecim
 pollices explet, & ad extre-
 mos unguis tredecim polli-
 ces & tres lineas. Rostrum
 ab ipsius apice ad oris an-
 gulos usque duos pollices &
 septem lineas longum est ;
 cauda tres pollices ; pars
 crurum plumis denudata li-
 neas binas ; pes octodecim
 lineas ; trium digitorum an-
 ticorum medius cum ungue
 unum pollicem cum septem
 lineis, extimus tredecim li-
 neas, intimus unum polli-
 cem ; posticus autem quin-
 que cum semi lineas. Digiti
 tres antichi in ipsarum exortu

rudimento membranæ valdè exiguo inter se connectuntur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi suprema, scapularesque pennæ castaneo, nigro, paucoque griseo eleganter variegantur. Collum superius latis quatuor tæniis transversis nigris insignitur. In utroque capitis laterè exigua extat tænia concolor, ab oris angulis orta, & ad oculos usque producta. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices tingit color castaneus, nigricante transversim striatus. Guttur candidat. Pars colli inferior rufescit, tæniisque transversis nigricantibus insignitur. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores alarum tectrices sunt griseo-rufescentes, pariter nigricante transversim striatæ. Pennæ caudam subtus obtergentes dilutè rufæ, nigricantibus variegatæ maculis, aliis transversis, alteris longitudinalibus. Superiores alarum tectrices minores castaneæ, très - petit commencement de membrane. Elle a un pied dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les plumes scapulaires sont joliment variées de marron, de noir & d'un peu de gris. Sur la partie supérieure du col sont quatre larges bandes transversales noires. De chaque côté de la tête est une petite bande de la même couleur, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusqu'aux yeux. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron rayé transversalement de noirâtre. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col est d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous des ailes sont d'un gris - roussâtre, rayé de même transversalement de noirâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair, varié de taches noirâtres, les unes transversales, d'autres longitudinales. Les petites du dessus des ailes sont d'un marron rayé transversalement de brun; les grandes les plus pro-

ches du corps sont variées & rayées transversalement de gris, de brun & de marron clair : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & marquées de taches triangulaires d'un beau marron, placées sur leur côté extérieur, & de taches de marron clair, placées obliquement sur leur bord intérieur; elles sont aussi bordées de marron clair par le bout. L'aile est composée de vingt-trois plumes : la première est brune, & variée sur le côté extérieur de taches blanchâtres, & sur le bord intérieur de taches de marron clair : les seize suivantes, sçavoir depuis la seconde jusqu'à la dix-septième inclusivement, sont brunes, & marquées de taches triangulaires d'un beau marron, placées sur leur côté extérieur, & de taches de marron clair, placées obliquement sur leur bord intérieur; elles sont aussi bordées de marron clair par le bout : les six plus proches du corps sont variées & rayées transversalement de gris, de brun & de marron clair. Ces six dernières sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noires, terminées de

fusco transversim striatæ : majores corpori viciniore griseo, fusco & castaneo diluto variæ & transversim striatæ : majores à corpore remotiores fuscæ, triangularibus notatæ maculis eleganter castaneis, in latere exteriori positis, maculifque dilutè castaneis, ad marginem interiorem obliquè collocatis, insignitæ ; sunt quoque castaneo diluto in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti tres remiges, quarum prior fusca est, maculis candicantibus in latere exteriori varia, maculis verò dilutè castaneis ad marginem interiorem notata : sexdecim proximè sequentes, à secunda scilicet ad decimam septimam usque inclusivè, fuscæ, triangularibus notatæ maculis eleganter castaneis, in latere exteriori collocatis, maculifque dilutè castaneis, ad interiorem marginem obliquè positis, insignitæ ; castaneo diluto in extremitate insuper marginantur : sex corpori viciniore griseo, fusco & castaneo diluto variegantur & transversim striantur. Quæ sex novissimæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur,

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 297

complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigrae, griseo terminatae, maculisque triangularibus eleganter castaneis in margine exteriori notatae. Rostrum in exortu ex griseo ad carneum colorem vergit, in extremitate nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque griseofusci. Sylvas humidas & rivulos juxta sepes frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

gris, & marquées sur leur bord extérieur de taches triangulaires d'un beau marron. Le bec est à son origine d'un gris tirant sur le couleur de chair, & noirâtre à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Elle fréquente les bois humides & les ruisseaux bordés de hayes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** A. LA BECCASSE BLANCHE.

Scolopax candida.

Scolopax alba. Klein. Avi. pag. 100. N°. 6.

Beccasse blanche. Alb. Tom. III. pag. 36; avec une figure passable Pl. 85, Les Anglois l'appellent WHITE WOOD-COCK. Alb.

A précédente differt colore in universo corpore candido. (Illa cujus descriptionem dedit *Albinus*, paucò variegatur castaneo). Rostrum ex albo flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt pallidè lutei; ungues verò candidi. *Ex museo Realmuriano.*

Elle diffère de la précédente par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. (Celle qu'*Albin* a décrite, est variée d'un peu de marron.) Son bec est d'un blanc-jaunâtre. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune pâle; & les ongles blancs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LA BECCASSINE.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 1.

Scolopax superne nigricante & fulvo diluto variegata, infernè alba; gutture fulvo; capite superiore triplici taniâ longitudinali dilutè fulvâ notato; dorso fasciis quatuor longitudinalibus dilutè fulvis insignito; uropygio fusco-nigricante, albo-fulvescente transversim striato; reatricibus in exortu nigricantibus, in extremitate fulvis, nigricante transversim striatis GALLINAGO.

Scolopax rostro recto apice tuberculato, pedibus fuscis, lineis frontis fuscis quaternis. Gallinago. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 11.*

Scolopax cinerea minor, rostro nigro. *Barr. Ornith. Class. III. Gen XII. sp. 2.*

Scolopax media. *Klein. Avi. pag. 99. N°. 2.*

Scolopax, quæ Capella cœlestis authorum. *Klein. Avi. pag. 100. N°. 3.*

Scolopax, seu Gallinago minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 476. hujus icon non satis accurata pag. 479.*

Scolopax, seu Gallinago minor, & Scolopax minor. *Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 31; & insuper altera icon à Gesnero mutuata Tab. XXVII, sub titulo, Rusticula minor.*

Gallinago. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 56. sp. 6.*

Gallinago, sive Rusticula minor. *Gesn. Avi. pag. 505, in qua hujus icon non satis accurata.*

Gallinago, vel Scolopax minor, sive Rusticula minor. *Gesn. icon. Avi. pag. 112, in qua eadem icon.*

Gallinago, Scolopax minor. *Charlet. Exer. pag. 112. N°. VIII.*

Charlet. Onomazt. pag. 108. N°. VIII.

Gallinago minor. *Raj. Syn. Avi. pag. 105. N°. A. 2.*

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.

Gallinago minor Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 484, in qua hujus icon pessima.*

Gallinago minor Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 214. hujus icon minùs accurata Tab. LIII.*

Gallinago minor Willughby. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 381.*

Gallinago vulgaris minor. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 34. hujus icon non satis accurata Tab. 15.*

Rusticula; Gallinago Gazæ; Scolopax minor aliis. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 295.*

Perdix rustica minor. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 330.*

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 299

Perdix rustica minor ; *Scolopax minor* ; *Rusticula minor* ; *Gallinago minor* ; *Capella cœlestis*. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 410.*

Numenius capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso, femoribus feminudis. *Faun. Suec. Linn. N^o. 143.*

Molliceps Aristotelis. *Jonst. Charlet.*

Bécassine. *Alb. Tom. I. pag. 63* ; avec une figure mal coloriée *Pl. 71.*

Bécassine ou Bécasseau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 215*, dans laquelle il y a une mauvaise figure.

Bécassine, Bécasseau, Bécasson, Bécasse petite. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 54 a*, dans laquelle est une figure passable.

Les Turcs l'appellent JELVÉ. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, PIZZARDELLA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, SCHNEPFPE ; HEER - SCHNEPFPE ; WASSER - SCHNEPFPE :

Rzac. HEER - SCHNEPFPE. Gesn. Aldrov. Schwenck. HAR - SCHNEPF ;

HAER - SNEFF ; GRASS - SCHNEPFPE ; SCHNEPFFLIN. Gesn. Aldrov. GRASE -

SCHNEPFPE ; BRUCH - SCHNEPFPE ; WASSER - SCHNEPFPE ; WASSER -

HEUNLIN. Schwenck.

Les Silésiens, HIMELS GEISZ ; HIMELS ZIEGE. *Schwenck. HIMELS - ZIEGE. Rzac.*

Les Polonois, BEKAS ; BARANEK ; KOZIELEK. *Rzac.*

Les Suédois, WALD-SNAEPPA ; MALL-SNAEPPA. *Linn.*

Les Anglois, SNIPE. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. SNITE. Willugh. Raj. Sibbald.*

Craffitie Coturnicem paululum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem decem pollices explet, & ad extremos unguis decem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quinque cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pars crurum plumis denudata quinque lineas ; pes quatuordecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & qua-

Elle est un peu plus grosse qu'une Caille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes & demie de long ; sa queue deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, cinq lignes ; son pied quatorze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize

lignes, l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derrière quatre lignes seulement. Tous ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a quinze pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir varié de petites taches fauves , & marqué de trois bandes longitudinales d'un fauve clair, l'une placée dans le milieu, & qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'à l'occiput , & une autre de chaque côté, qui part aussi de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'occiput , en passant immédiatement par-dessus les yeux. Sur les côtés de la tête l'espace contenu entre le bec & l'œil est fauve, & marqué d'une petite bande brune, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est fauve. La partie inférieure du col est variée de fauve très-clair & de brun. La partie postérieure de la tête, les parties supérieures du col & du dos, & les plumes scapulaires sont variées de noirâtre & de fauve clair, cette dernière couleur formant sur le dos quatre bandes longitudinales,

tuor lineas , extimus tredecim lineas , intimus duodecim cum semi lineas ; posticus autem quatuor tantummodo lineas. Omnes digiti sunt ad exortum usque à se invicem penitus discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quindecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput superius nigrum est , minutis maculis fulvis varium , & tribus notatum tæniis longitudinalibus dilutè fulvis , unâ scilicet in medio positâ , ab exortu rostri ad occipitium usque productâ , alterâ utrinque collocatâ , ab exortu rostri similiter ortâ , immédiatè supra oculos ductâ , & ad occipitium usque protensâ. Caput ad latera , in spatio scilicet rostrum inter & oculum contento , fulvum est , exiguâque tæniâ fuscâ , ab oris angulis ortâ , & ad oculum usque productâ , insignitum. Guttur quoque fulvum. Pars colli inferior fulvo dilutissimo & fusco variegata. Caput posterius , pars colli superior , sicut & dorsi suprema , scapularesque pennæ

nigricante & fulvo diluto variegantur; color autem dilutè fulvus quatuor efficit in dorso tæniæ longitudinales, utrinque binas, scilicet in dorso ipso unam, & in scapularium latere exteriore alteram. Dorsum inferum & uropygium obtinent pennæ fusco-nigricantes, tæniis transversis ex albo ad fulvum vergentibus notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt fulvæ, nigricante transversim striatæ. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera in parte infima albicant. Latera in parte suprema albent quidem, sed aliquid fulvi admixtum habent, & fusco transversim striantur. Tectrices caudæ inferiores sunt dilutè fulvæ, nigricante maculatæ. Pennæ alas subtus cooperientes fuscæ, albo fimbriatæ. Quæ alarum margines infra articulum carpo humano respondentem obtinent, concoloris. Superiores alarum tectrices minimæ sunt saturatè fuscæ: mediæ, sicut & majores corpori viciniore, fusco saturato & fulvo diluto variegatæ: majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ. Viginti quatuor remi-

deux de chaque côté, sçavoir une sur le dos même & une sur le côté extérieur des scapulaires. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un brun-noirâtre, marquées de bandes transversales d'un blanc tirant sur le fauve. Les couvertures du dessus de la queue sont fauves, & rayées transversalement de noirâtre. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & le bas des côtés sont blancs. Le haut des côtés est d'un blanc mêlé d'une légère teinte de fauve, & rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair, tacheté de noirâtre. Celles du dessous des ailes sont brunes, & bordées de blanc. Les plumes qui couvrent le bord de l'aile au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, sont de la même couleur. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun foncé: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont variées de brun foncé & de fauve clair: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de vingt-quatre plumes: les dix premières sont brunes; de celles-là,

la première a son côté extérieur blanc; la seconde est bordée extérieurement de blanc; les huit autres, sçavoir depuis la troisième jusqu'à la dixième inclusivement, sont bordées intérieurement d'un blanchâtre tacheté de brun; & dans cinq de ces dernières, sçavoir depuis la sixième jusqu'à la dixième inclusivement, la bordure blanchâtre s'étend aussi sur le bout: les huit suivantes, sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la dix-huitième inclusivement, sont brunes, terminées de blanc, & ont aussi une grande partie de leur côté intérieur rayée transversalement de blanc; de plus le blanc de leur extrémité borde leur côté extérieur d'autant plus haut vers leur origine, que la plume est plus proche du corps: la dix-neuvième & la vingtième sont brunes, bordées & terminées de blanc, & sont de plus variées de gris du côté intérieur: enfin les cinq plus proches du corps sont rayées de bandes obliques, alternativement noirâtres & d'un fauve clair, ces dernières bandes étant elles-mêmes tachetées de noirâtre. Ces cinq dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que

gibus ala conflatur: decem primores fusca; ex istis autem prior in latere exteriori albet; secunda margine exteriori donatur candida; octo reliquæ, à tertia scilicet ad decimam usque inclusivè, marginibus donantur interioribus albidis, fusco maculatis; & ex novissimis istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, margine candicante etiam in apice præditæ sunt: octo proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, fusca, albo terminata, & in lateris interioris maxima parte albo quoque transversim striata; albedo autem quæ terminantur, marginem efficit in latere exteriori concolorem eò magis versùs ipsarum exortum appropinquantem, quò remix fit corpori vicinior: decima nona & vigesima fusca sunt, albo fimbriata & terminata, inque latere interiori griseo insuper variegata: quinque tandem corpori finitimæ tanniis striata obliquis, alternatim nigricantibus & dilutè fulvis; quæ ipsa taniæ dilutè fulvæ nigricante maculantur. Quinque ista novissimè dicta remiges longæ

sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices in exortu nigricantes, in reliqua longitudine fulvæ, nigricante transversim striatæ: in sex intermediis rectricibus color nigricans, ipsarum exortum tingens versùs extremitatem magnopere protenditur; & utrinque extrema dilutissimo fulvo imbuatur. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque fuscum, inde ad apicem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-viridescentes; ungues verò nigricantes. Loca paludosa frequentat, & juxta rivulorum ripas versatur. *Ex museo Realmuriano.*

les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noirâtres à leur origine; le reste de leur longueur est fauve, & rayé transversalement de noirâtre: sur les six plumes du milieu le noirâtre de l'origine s'étend fort loin vers leur extrémité; & le fauve de la plus extérieure de chaque côté est très-clair. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est brun depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur; le reste est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds son d'un brun-verdâtre; & les ongles noirâtres. Elle se tient dans des endroits marécageux, & le long des petits ruisseaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. LA PETITE BECCASSINE.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

Scolopax superne nigro & fulvo variegata, nigro-violaceo & viridi-aureo colore variante, infernè fusco, fulvo obscuro & albido varia; ventre albo; gutture albo-fulvescente; capite superiore duplici taniâ longitudinali dilutè fulvâ notato; dorso fasciis quatuor longitudinalibus dilutè fulvis insignito; uropygio splendide violaceo, pennis albido in apice marginatis; rectricibus binis intermediis nigricanti-

bus, fulvo marginatis, lateralibus fuscis, fulvo variegatis GALLINAGO MINOR.

Scolopax minima, ex fulvo & castaneo colore maculata. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XII. sp. 3.*

Scolopax minima. *Klein. Avi. pag. 100. N^o. 4.*

Gallinago minima, seu tertia Bellonii. *Willugh. Ornith. pag. 214.*

Raj. Syn. Avi. pag. 105. N^o. A. 3.

Cinclus. *Charlet. Exer. pag. 113. N^o. XI.*

Charlet. Onomazt. pag. 108. N^o. XI.

Cinclus quartus, Gallinago minima Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III; pag. 493, in qua hujus icon pessima.*

Cinclus, Gallinago minima Bellonii. *Jonst. Avi. pag. 112. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 53.*

Plus petite espece de Bécassine. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 217.*

Mâle de la Beccassine. *Alb. Tom. III. pag. 36; avec une figure mal coloriée Pl. 86.*

Les François l'appellent DEUX-POUR-UN. *Bel. Willugh.*

Les François qui habitent les bords de l'Océan, FOUTON. *Bel. Aldrov.*

Les Catalans, BECADELL. *Barr.*

Les Flamands, HALF-SCHNEPF. *Charlet.*

Les Anglois, JUD-COCK; JACK-SNIPE. *Willugh. Raj. Alb. GID-SNIPE; Willugh. Raj. HALF-SNIPE. Charlet.*

Elle est de moitié plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur onze lignes,

Crassitie præcedenti mediâ parte cedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda unum pollicem & novem lineas; pars crurum plumis nudata quatuor lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extremus

mus undecim lineas, intimus decem lineas; posticus autem tres tantummodo lineas. Digni omnes sunt ad exortum usque à se invicem penitus discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput superius eleganti imbitur nigro minutis maculis fulvis vario, & binis notato tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, prope rostri exortum ortis, & ad occipitium usque productis. Partem colli superiorem vestiunt pennæ ex fulvo ad fuscum vergentes, maculis fuscis variæ, albido fimbriatæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt nigro & fulvo variegatæ, nigro tamen violaceo lucido & viridiaureo splendenti colore variante: dorsum insuper quatuor insignitur tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, binis utrinque, scilicet in dorso unâ, & in scapularium latere exteriori alterâ: ex scapularibus autem quædam albo in apice fimbriantur. Dorsum infimum & uropygium

l'intérieur dix lignes; & celui de derrière trois lignes seulement. Tous ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a treize pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau noir varié de petites taches fauves, & marqué de deux bandes longitudinales d'un fauve clair, qui partent d'après de l'origine du bec, & s'étendent jusqu'à l'occiput. Le dessus du col est couvert de plumes d'un fauve rembruni, variées de taches brunes, & bordées de blanchâtre. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de noir & de fauve, le noir changeant en violet brillant & en verd-doré éclatant. Le dos est de plus marqué de quatre bandes longitudinales d'un fauve clair, deux de chaque côté, sçavoir une sur le dos même, & une sur le côté extérieur des scapulaires: quelques-unes de ces dernières plumes sont bordées de blanc par le bout. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un violet brillant, & bordées de blanchâtre par le

bout. Les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, tachetées & bordées de fauve. Les côtés de la tête sont d'un fauve clair, & marqués d'une bande longitudinale noirâtre, qui part d'après de l'origine du bec, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est d'un blanc mêlé d'une légère teinte de fauve. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine & les côtés sont variés de brun, de fauve rembruni & de blanchâtre. Le ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le haut des jambes est couvert de plumes grises. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc varié de cendré : les grandes sont entièrement cendrées. Les plus petites du dessus sont brunes, & bordées de blanc : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont variées de brun, de fauve clair & d'un peu de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées de blanchâtre par le bout. L'aile est composée de vingt-quatre plumes : les dix premières sont brunes ; six de celles-là, savoir depuis la cinquième jusqu'à la dixième inclusivement, sont bordées de blanchâtre par le bout : les dix suivantes,

pennis vestiuntur splendide violaceis, albido in apice marginatis. Superiores caudæ tectrices sunt nigricantes, fulvo maculatae & fimbriatae. Caput ad latera est dilute fulvum, tæniâ longitudinali nigricante, prope rostri exitum ortâ, & ad oculum usque productâ, insignitum. Guttur albet, sed aliquid fulvi admixtum habet. Collum inferius & ad latera, pectus & latera fusco, fulvo obscuro & albido variegantur. Venter, inferioresque caudæ tectrices albicant. Crurum supremam partem vestiunt pennæ griseæ. Tectrices alarum inferiores minores sunt candidæ, cinereo variæ : majores penitus cinereæ. Superiores minimæ fusca, albo fimbriatae : media, sicut & majores corpori viciniore, fusco, fulvo diluto & pauco albido variegatae ; majores à corpore remotiores fusca, candidante in apice marginatae. Viginti quatuor remigibus ala constat : decem primores fusca ; ex istis autem sex, à quinta scilicet ad decimam usque inclusivè, albido in apice marginatae : decem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam

usque inclusivè, dilutè fuscæ, candicante obliquè terminatæ; quæ decem remiges in acumen desinunt: vigesima prima fusca, attamen in latere exteriori partim obscurè fulva, fusco maculata, & margine albâ prædita: tres tandem corpori viciniore in latere interiori fuscæ, in exteriori fulvæ, nigricante transversim striatæ & maculatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ nigricant, & marginibus fulvis præditæ sunt: laterales omnes fuscæ, in latere exteriori multò magis quàm in interiori fulvo variegatæ. Binæ rectrices intermediæ in acumen desinunt, & trium linearum longitudine laterales excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorum. Rostrum ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque fuscum, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque

sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingtième inclusivement, sont d'un brun clair, & terminées obliquement de blanchâtre; ces dix plumes se terminent en pointe: la vingt-unième est brune, ayant une partie de son côté extérieur d'un fauve rembruni, tacheté de brun, & bordé de blanc: enfin les trois plus proches du corps sont brunes du côté intérieur, tandis que leur côté extérieur est d'un fauve rayé transversalement & tacheté de noirâtre. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de fauve: toutes les latérales sont brunes, & variées de fauve, mais beaucoup plus du côté extérieur que du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue se terminent en pointe, & sont de trois lignes plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est brun depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur; le reste est

noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre; & les ongles noirâtres. On la trouve dans les endroits marécageux & couverts de joncs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

fusco-viridescentes; ungues verò nigricantes. In paludosis locis & juncetis habitat. *Ex museo Realmuriano.*

4. LA BECCASSINE DE MADRAST.

Scolopax superne nigricante & fulvo variegata, infernè alba; gutture & collo inferiore fulvis, maculis nigricantibus variis; capite superiore triplici tæniâ longitudinali fusco-nigricante notato; dorso fasciis duabus longitudinalibus fusco-nigricantibus insignito; tæniâ transversâ in pectore nigrâ; rectricibus nigro, fulvo & griseo variegatis . . .
GALLINAGO MADERASPATANA.

Gallinago Maderaspatana, Perdici colore. *Raj. Syn. Avi. pag. 193. N° 2. hujus icon pessima Tab. 1. fig. 2.*
Les Anglois l'appellent PARTRIDGE-SNIPE. Raj.

J'ignore quelle est sa grandeur. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont variés de noirâtre & de fauve. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. Le dessus de la tête est marqué de trois bandes longitudinales d'un brun-noirâtre, l'une placée dans le milieu, & qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'à l'occiput, & une autre de chaque côté placée derrière l'œil. Sur le dos sont aussi deux bandes

Quâ magnitudine polleat prorsus ignoro. Partes capitæ & colli superiores, dorsum & uropygium nigricante & fulvo variegantur. Pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ rectrices concolores. Caput superius tribus notatur tæniis longitudinalibus fusco-nigricantibus, unâ scilicet in medio positâ, ab exortu rostri ad occipitium usque productâ, alterâ utrinque ponè oculum collocatâ. Dorsum binis quoque fasciis longitudinalibus fusco-nigri-

cantibus est insignitum. Guttur & partem colli inferiorem tingit color fulvus maculis nigricantibus varius. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores albet; attamen tænia extat transversa in pectore nigra. Remiges nigro, fulvo & griseo eleganter variegantur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum rufescit. Hoc habet singulare hæc species, quod digitus posticus anticos digitos longitudine adæquet. Habitat circa *Maderaspatanum*.

longitudinales d'un brun-noirâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un fauve varié de taches noirâtres. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs; mais la poitrine est marquée d'une bande transversale noire. Les plumes de l'aile sont joliment variées de noir, de fauve & de gris. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des ailes. Le bec est rouffâtre. Ce qu'il y a de singulier dans cette espece, c'est que le doigt de derriere est aussi long que ceux de devant. On la trouve aux environs de *Madraff*.

5. LA BECCASSINE D'ANGLETERRE.

Scolopax superne rufa, maculis nigris & pauco albo variegata, infernè alba; gutture, collo inferiore & pectore maculis nigricantibus variis; medio ventre nigricante, albo undulato; rectricibus binis intermediis fuscis, rufo maculatis, lateralibus fusco-albicantibus GALLINAGO ANGLICANA.

Dunlin Septentrionalium Anglorum D. Johnson. *Willugh. Ornith.* pag. 226.

Raj. Syn. Avi. pag. 109.

Les Anglois Septentrionaux l'appellent DUNLIN. *Willugh. Raj.*

Cum *Gallinagine minori* crassitie & magnitudine convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropy-

Elle est de la grosseur & de la grandeur de la *petite Beccassine*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le crou,

pion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roux tout parsemé d'assez grandes taches noires, & varié d'un peu de blanc. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont blanches, & variées de taches noirâtres. Le milieu du ventre est noirâtre, & varié de blanc en zigzags. Le reste du ventre, les couvertures du dessous de la queue, le haut des jambes & les côtés sont blancs. Les ailes sont d'un bleu tirant sur le brun. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont brunes, & variées de quelques taches rouffes : toutes les latérales sont d'un brun clair ou blanchâtre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Le doigt de derriere est extrêmement court. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'Angleterre.

gium, penna scapulares & superiores caudæ rectrices sunt rufæ, majusculis maculis nigris aspersæ, & pauco albo variegatæ. Guttur, pars colli inferior & pectus albore nitent, quem variegant maculæ nigricantes. Medius venter nigricat, alboque est undulatus. Reliquus venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ rectrices albescent. Alæ ex cæsis ad fuscum vergunt. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediae fuscae, maculis quibusdam rufis variegatæ: laterales omnes dilute fuscae, aut fusco-albescentes. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Digitus posticus valde brevis. Habitat in Angliæ Septentrionali regione.

SECTION VI.

Ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas.

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui du *Courly*.

SECTIO VI.

Eæ quæ rostrum habent deorsum arcuatum.

UNICO genere, Nume-nii scilicet, constituitur hæc sectio.




2. *Petite Beccassine.*



Fig. 1.

Fig. 2.



Desiné et Gravé par Martinet.

1. Beccassine.

2. Petite Beccassine.



LXXVIII.

LXXVIII.

Genus Numenii.

Le genre du Courly.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:
 Rostrum deorsum arcuatum.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un
 derriere:
 La partie inférieure des jam-
 bes dénuée de plumes:
 Le bec courbé en arc en en-
 bas.

Omnes hujus generis Ali-
 tes rostro donantur apice
 obtuso.

Tous les Oiseaux de ce genre
 ont le bout du bec obtus.

** I. LE COURLY.

Numenius pennis in medio fusco-nigricantibus; in utraque
 margine fulvis superne vestitus, infernè albus; gutture al-
 bido, maculis griseis vario; pectore & lateribus ad fulvum
 vergentibus, maculis transversis fuscis insignitis; uropygio
 candido maculis longitudinalibus fuscis notato; rectricibus
 binis intermediis griseis, lateralibus albis, omnibus fusco
 transversim striatis NUMENIUS.

Numenius rostro arcuato, alis nigris: maculis niveis, pedibus cœru-
 lescentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 139.

Numenius. *Moehr. Avi. Gen.* 87.

Numenius veterum, vel ei cognatus. Arquata major. *Gesn. icon. Avi.*
pag. 113, in qua hujus icon non satis accurata.

Numenius, Arquata, Gesneri, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 109.
N°. 1.

Numenius, sive Arquata. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III.*
pag. 18. hujus icon non satis accurata *Tab.* 12. *fig.* 2.

Numenius Aldrovandi, sive Arquata. *Willugh. Ornith. pag.* 216. *maris*
icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.

Numenius Aldrovandi, sive Arcuata. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 38.
hujus icon satis accurata Tab. 17.

Numenius sive Arcuata major. *Raj. Syn. Avi. pag.* 103. *N°.* A. 1.

- Arquata albicans, maculis subcastaneis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp. 1.*
- Arquata. *Jonst. Avi. pag. 108. maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. 51. Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 59. sp. 1.*
- Arquata seu Numenius. *Gesn. Avi. pag. 221. hujus icon non satis accurata pag. 222. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 424. maris icon non satis accurata pag. 426. Mus. Worm. pag. 307.*
- Arquata, Arcuata, Numenius veterum, *Curlinus. Charlet. Exer. pag. III. N^o. II. Charlet. Onomazt. pag. 106. N^o. II.*
- Arquata Aldrovandi, Gesneri; Arcuata Cosmii; Numenius Jonstoni; Pardalus primus Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 365. Scolopax rostro arcuato, pedibus cœrulescentibus, alis nigris maculis niveis. Arquata. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 5. Pardalus primus. Schwenck. Avi. Sil. pag. 315.*
- Corlis & Corlieu. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 204; avec une figure peu exacte pag. 205.*
- Corlis, Corlieu. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 47 b, dans laquelle est la même figure.*
- Corlieu. *Alb. Tom. I. pag. 69, avec une figure mal coloriée Pl. 79.*
- Les Grecs l'appellent Ελωπίος. *Bel.*
- Les Catalans, POLIT. *Barr.*
- Les Italiens, TORQUATO; ARCASE; CHARLOT. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens qui habitent la Poëuille, TARLINO ou TERLINO. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Italiens aux environs du Lac Majeur, SPINZAGO. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Vénitiens, ARCUATO. *Aldrov.*
- Les Boulonnois, PIVIER. *Aldrov.*
- Les Milanois, CAROLI. *Bel. Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands, BRACH-VOGEL; WIND-VOGEL; WETTER-VOGEL. *Gesn. Aldrov. JUT-VOGEL. Rzac. GROSSER BRACH-VOGEL; BRACH-HUN; GILOCH; HIMEL-GEISZ. Schwenck.*
- Les Allemands aux environs de Strasbourg, REGEN-VOGEL. *Gesn. Aldrov.*
- Les Allemands aux environs du Lac de Constance, GRENY. *Gesn. Aldrov.*
- Les Silésiens, GEISZ-VOGEL. *Schwenck.*
- Les Hollandois, HANIKENS. *Gesn. Aldrov.*
- Les Frisons, SCHRYE. *Gesn. Aldrov.*
- Les Frisons Orientaux, WALLOP. *Gesn.*
- Les Anglois, CURLEW. *Gesn. Willugh. Raj. Charlet. WATER-CURLEW; Alb. KURLU. Gesn. Aldrov. WHAUPE. Gesn. Ils appellent le mâle, JACK-CURLEW. Willugh. Alb.*

Il est à peu près de la grosseur. Cum Capone crassitie cir-

citer convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues duos pedes totidem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & octo lineas longum est; cauda quatuor pollices cum octo lineis; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis, intimus octodecim lineas; posticus autem septem lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & quatuor pollicum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, collumque vestiunt plumulæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem

feur d'un *Chapon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces huit lignes de long; sa queue quatre pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce sept lignes, l'intérieur dix-huit lignes; & celui de derrière sept lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a trois pieds quatre pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête & le col sont couverts de petites plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & fauves sur les deux côtés. La gorge est blanchâtre, chaque plume étant marquée d'une pe-

tite tache grise. La partie supérieure du dos est couverte de plumes d'un brun-noirâtre dans leur milieu, & fauves sur les deux bords. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont blanches, & marquées chacune d'une bande brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur. Les couvertures du dessus de la queue sont blanchâtres, & marquées de bandes transversales brunes; les bords de ces bandes tirent un peu sur le fauve. La poitrine & les côtés sont d'un blanc tirant sur le fauve, chaque plume étant encore marquée de bandes transversales brunes, dont la plus proche du bout de la plume a la forme d'un fer de lance. Le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, mais chaque plume est marquée d'une bande transversale brune, placée vers les deux tiers de sa longueur, & d'une tache de même couleur, qui a la forme d'un fer de lance, & est placée vers le bout de la plume. Les petites couvertures du dessous des ailes sont blanches, & variées de brun : les gran-

fusca, in utroque latere fulva. Guttur candidat; quælibet autem penna minutâ insignitur maculâ griseâ. Dorsî supremam partem cooperiunt pennæ in medio fusco-nigricantes, in utraque margine fulvæ. Quæ dorsum infimum & uropygium obtegunt, candidæ, ab exortu versûs tres quartas longitudinis partes usque tæniâ fuscâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt candidantes, tæniis transversis fuscis insignitæ; quarum tæniarum margines ad fulvum colorem nonnihil inclinant. Pectus & latera ex albo ad fulvum vergunt; unaquæque autem penna tæniis pariter notatur transversis fuscis, quarum quæ versûs pennæ extremitatem collocatur, est lanceolata. Venter & crurum suprema pars albet. Pennæ caudam subtus obtegentes similiter candidæ, quælibet tamen insignitur tæniâ transversâ fuscâ, versûs duas tertias ipsius longitudinis partes positâ, & maculâ insuper concolore lanceolatâ, versûs pennæ extremitatem collocatâ. Inferiores alarum tectrices minores albæ, fusco

variegatæ : majores similiter candidæ , sed cinereo transversim striatæ. Scapulares pennæ minores pennis partem dorsi supremam vestientibus concolores : majores fusco-nigricantes , attamen ad latera griseo , in fusco-nigricante quasi dentatim incluso , variegatæ. Tectrices alarum superiores minimæ ex fusco nigricant , & candidante marginantur : mediæ sunt in medio fusco-nigricantes , ad margines fulvæ : majores corpori viciniore majoribus scapularibus concolores : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes , candidante in apice tantum fimbriatæ. Triginta remigibus ala conflatur : quinque primores nigricantes , tæniis transversis albis in latere interiore striatæ : quinque proximè sequentes , à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè , pariter nigricant , sed in margine exteriori maculis notantur candidis , griseo variegatis , & tæniis transversis albis interiori striantur : quatuordecim quæ proximè sequuntur , ab undecima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè , fuscæ sunt , & ad margines albo , in fusco quasi den-

des sont pareillement blanches , mais elles sont rayées transversalement de cendré. Les petites plumes scapulaires sont de la même couleur que celles qui couvrent la partie supérieure du dos : les grandes sont d'un brun-noirâtre , mais leurs côtés sont variés d'un gris comme dentelé & engrené dans le brun-noirâtre. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un brun-noirâtre , & bordées de blanchâtre : les moyennes sont d'un brun-noirâtre dans leur milieu , & fauves sur leurs bords : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur que les grandes scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre , & bordées de blanchâtre seulement par le bout. L'aile est composée de trente plumes : les cinq premières sont noirâtres , & rayées intérieurement de bandes transversales blanches : les cinq suivantes , sçavoir depuis la sixième jusqu'à la dixième inclusivement , sont pareillement noirâtres , marquées sur leur bord extérieur de taches blanches variées de gris , & rayées du côté intérieur de bandes transversales blanches : les quatorze qui suivent , sçavoir depuis l'onzième jusqu'à la vingt-quatrième

inclusivement, sont brunes, & variées sur leurs bords d'un blanc comme dentelé & engrené dans le brun, cette dernière couleur étant d'autant plus claire, que la plume est plus proche du corps : enfin les six plus proches du corps sont brunes, & variées sur leurs bords d'un gris comme dentelé & engrené dans le brun. Ces six dernières plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises : les latérales sont blanches ; & toutes sont rayées transversalement de brun. Le demi-bec supérieur est d'un brun qui se fonce de plus en plus en approchant de son extrémité, où il est noirâtre : le demi-bec inférieur est blanchâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur ; le reste est d'un brun qui devient noirâtre vers son bout. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve sur les bords de la mer, des rivières & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tatim incluso, variegata; color autem fuscus eò dilutior est, quò remix fit corpori vicinior : sex tandem corpori finitimæ fusca, ad margines griseo, in fusco quasi dentatim incluso, variegata. Sex istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediae griseæ : laterales albæ ; omnes autem sunt fusco transversim striatæ. Mandibula superior fusco imbutur, qui color, versùs ipsius extremitatem procedendo, sensim atque sensim fit saturatior ; extremitas autem nigricat : mandibula inferior ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque candidans, in reliqua longitudine fusca, qui color fuscus versùs apicem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Juxta maris, fluminum & stagnorum littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

** A. LE COURLY BLANC.

Numenius candidus.

A præcedente discrepat tantum colore in universo corpore albo. Rostrum dilute griseum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque ex albo flavicant.

Ex museo Realmuriano.

Il ne diffère du précédent que par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Son bec est d'un gris clair. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, ses pieds & ses ongles sont d'un blanc-jaunâtre.

Du cabinet de M. de Reaumur.

** 2. LE PETIT COURLY OU LE CORLIEU.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 1.

Numenius pennis in medio saturatè fuscis, ad margines griseis superne vestitus, infernè albus; capite superiore fusco, tæniâ in medio longitudinali, maculis cinereo-albis variâ, insignito; maculâ rostrum inter & oculos candidâ; pectore & lateribus ad fulvum vergentibus, maculis in pectore longitudinalibus, in lateribus transversis fuscis; uropygio candido; rectricibus sex intermediis griseo-fuscis, tribus utrinque extimis albis, exteriùs ad fulvum vergentibus; omnibus fusco transversim striatis . . . NUMENIUS MINOR.

Numenius rostro arcuato, dorso maculis fuscis rhomboidalibus; pedibus cœrulescentibus. *Faun. Suec. Linn. N^o. 140.*

Numenius minor. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 59. sp. 2.*

Klein. Avi. pag. 109. N^o. 2.

Arquata minor. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 366.*

Arquata minor nostras. *Willugh. Ornith. pag. 217.*

Raj. Syn. Avi. pag. 103. N^o. A. 2.

Scolopax rostro arcuato, pedibus cœrulescentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. Phæopus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 6.*

Phæopus altera, vel Arquata minor. *Gesn. Avi. pag. 499, in qua hujus icon minimè accurata.*

Phæopus alter. Arquata minor. *Gesn. icon. Avi. pag. 103, in qua eadem icon.*

Phæopus altera, seu Arquata minor Gesneri. *Willugh. Ornith. pag. 217.*

Gallinula Phæopus altera, seu Arquata minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 458. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 460.*

Wimbrel ou petit Corlieu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag. 204. Chap. XCVII; avec une figure assez exacte Pl. 307.*

Les Italiens l'appellent TARANGOLO. Gesn. Aldrov. Willugh.

Les Vénitiens, TARANIOLO. Willugh. Raj.

Les Allemands, REGEN-VOGEL. Gesn. Aldrov. Willugh.

Les Anglois, WHIMBREL. Raj. WHIMBREL. Willugh. Klein. Edwards.

LESSER CURLEW. Edwards.

Les citations qui suivent appartiennent à la même espèce, ou du moins à une variété.

Sequentes citationes ad eandem speciem, aut saltem ad ipsius varietatem attinent.

Phæopus. Gesn. icon. Avi. pag. 102, in qua hujus icon minimè accurata.

Phæopus Gallinula Gesneri. Willugh. Ornith. pag. 217.

Gallinula quam nostri vocant Brach-hun; vel Phæopus. Gesn. Avi. pag. 498, in qua hujus icon minimè accurata.

Gallinula Phæopus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 458. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 459.

Les Milanois l'appellent GIRARDELLO. Gesn. Aldrov.

Les Suisses, BRACH-HUN. Gesn.

Les Allemands aux environs de Strasbourg, BRACH-VOGEL. Gesn. Aldrov. Willugh.

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de seize pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces quatre lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes; son pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'inté-

Præcedenti multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues sexdecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longum est; caudam quatuor pollices; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas; pes duos pollices cum linea una; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus qua-

tuordecim lineas, intimus tredecim lineas; posticus autem sex lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum quinque pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ferè ad extremitatem caudæ pertingunt. Caput superius fuscum est, taniâ longitudinali, maculis cinereo-albis variâ, à rostro ad occipitium usque productâ, in medio insignitum. Guttur albicat. In utroque capitis latere macula extat pariter candida, rostrum inter & oculum posita. Caput ad latera, collum & pectus obtegunt pennæ ex cinereo-albo ad fulvum vergentes, taniâ fuscâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Quæ partem dorli supremam vestiunt, sicut & scapulares, sunt in medio saturatè fuscæ, ad margines griseæ. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars,

rieur treize lignes; & celui de derriere six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds cinq pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est brune, & marquée dans son milieu d'une bande longitudinale variée de taches de gris-blanc, qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'occiput. La gorge est blanche. De chaque côté de la tête est une tache de la même couleur, placée entre le bec & l'œil. Les côtés de la tête, le col & la poitrine sont couverts de plumes d'un gris-blanc tirant sur le fauve, & marquées chacune d'une bande brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un brun foncé dans leur milieu, & grises sur leurs bords. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, le haut des

jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs; quelques-unes des longues plumes des côtés tirent cependant un peu sur le fauve, & sont rayées transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-blanc tirant sur le fauve, & rayées de même transversalement de brun. Les petites du dessous des ailes sont blanches: les grandes sont de la même couleur, & rayées transversalement de cendré-brun. Le bord de l'aile est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, & marquées sur leurs bords de taches transversales d'un gris-blanc: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur, & marquées vers les bords du côté intérieur de bandes transversales blanchâtres: les suivantes sont d'un gris-brun, & marquées sur leurs bords de taches transversales blanchâtres: les quatre ou cinq plus proches du corps sont colorées comme ces dernières, avec cette différence, qu'elles n'ont pas de taches

inferioresque caudæ tectrices alben; quædam tamen ex longiusculis pennis latera cooperientibus paululum ad fulvum inclinant, & fusco transversim striantur. Pennæ caudam superne vestientes sunt cinereo-albæ ad fulvum vergentes, fusco similiter transversim striatæ. Inferiores alarum tectrices minores candidæ: majores concolores, cinereo - fusco transversim striatæ. Alarum margines cooperiunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fuscæ, maculis transversis cinereo-albis ad margines insignitæ: majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores quoque nigricant, & tæniis transversis candicantibus versùs ipsarum margines in latere interiore notantur: proximè sequentes sunt griseo-fuscæ, maculis transversis candicantibus ad margines insignitæ: quatuor aut quinque corpori viciniore novissimè dictis concolores, ab illis tamen discrepantes in eo quod maculis candicantibus in latere interiore destituantur. Remiges omnes sunt subtus cineræ, albo eodem

eadem modo variegata ac candicante superne variegantur. Remiges corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum sex intermediæ sunt subtus cineræ, superne verò griseo-fuscæ, fusco transversim striatæ: tres utrinque extremæ albæ, paululum in latere exteriori tantùm ad fulvum vergentes, & taniis transversis fuscis in utroque latere notatæ. Rostrum nigricans, exceptâ mandibulæ inferioris basi candicante. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-viridescentes; ungues verò nigricantes. Præcedentis instar, juxta maris, fluminum & stagnorum littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

blanchâtres sur leur côté intérieur. Le dessous de toutes les plumes de l'aîle est cendré, & variée de blanc de la même façon que ces plumes le sont de blanchâtre en-dessus. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes: les six du milieu sont cendrées en-dessous, & en-dessus elles sont d'un gris-brun rayé transversalement de brun: les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches, cette couleur tirant un peu sur le fauve du côté extérieur seulement, & marquées des deux côtés de bandes transversales brunes. Le bec est noirâtre, excepté la bête du demi-bec inférieur, qui est blanchâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-ver-

dâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve comme le précédent, sur les bords de la mer, des rivières & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. LE COURLY DE MADAGASCAR.

Voyez Pl. XXVIII.

Numenius pennis in medio saturatè fuscis, ad margines griseis superne vestitus, infernè albus; pectore & lateribus ad

fulvum vergentibus, maculis in pectore longitudinalibus, in lateribus transversis fuscis; rectricibus griseis, fusco transversim striatis NUMENIUS MADAGASCARIENSIS.

Il est de la grosseur du nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six pouces neuf lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derrière huit lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a trois pieds trois pouces quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête,

Cum *Numenio nostrate* crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes & totidem pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices & novem lineas longum est; cauda quatuor pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices; pes tres pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem octo cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum totidem pollicum & quatuor linearum intervallo distant;

alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partem capitis superiorem, collum superius & dorsum vestiunt pennæ in medio saturatè fuscæ, ad margines griseæ. Quæ uropygium obtegunt concolores; attamen in illis color fuscus minus spatium occupat; griseus verò paulò dilutior est. Scapulares sunt quoque in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem saturatè fuscæ, ad margines griseæ; fusco transversim striatæ. Superiores caudæ tectrices griseo-rufescentes, tæniis insignitæ fuscis, aliis transversis, alteris circumferentiæ pennæ parallelis. Guttur albicat. Pars colli inferior pennis vestitur cinereo-albis, lineâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatis. Pectus & latera ex albo nonnihil ad rufescentem inclinant colorem; quem colorem variegant maculæ fuscæ in pectore longitudinales, in lateribus verò transversæ. Venter & crurum suprema pars albet, maculisque destituuntur. Pennæ caudam subtus obtegentes ex albo paululùm ad rufescentem colorem vergunt, & lineis fuscis, aliis longi-

le dessus du col & le dos sont couverts de plumes d'un brun foncé dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Celles qui couvrent le croupion sont de la même couleur; mais le brun occupe moins d'espace, & le gris est un peu plus clair. Les scapulaires sont aussi d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige; leurs bords sont gris, & rayés transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-rouffâtre, marqué de bandes brunes, dont les unes sont transversales, & d'autres sont parallèles à la circonférence de la plume. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-blanc, marquées chacune d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine & les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le rouffâtre; cette couleur est variée sur la poitrine de taches longitudinales brunes, & sur les côtés de taches transversales de la même couleur. Le ventre & le haut des jambes sont blancs & sans taches. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant un peu sur le rouffâtre, varié de lignes brunes, dont les unes sont lon-

gitudinales, & les autres transversales. Les petites couvertures du dessous des ailes sont blanches, & rayées transversalement de brun foncé : les grandes sont blanches, & rayées transversalement de cendré clair. Les plus petites du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le bord de l'aile, sont d'un brun foncé, & bordées de blanchâtre : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires : les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont grises, bordées de blanc, & marquées d'une ligne brune, qui s'étend tout le long de leur tige : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres ; & de celles-là les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aile est composée de trente plumes : les trois premières sont d'un noirâtre plus foncé du côté extérieur que du côté intérieur, ayant de plus une grande partie de leur côté intérieur tachetée de blanchâtre, & leur tige blanche : la quatrième est de la même couleur, mais son côté intérieur est marqué vers ses bords de taches transversales blanches : les cinq suivantes, sçavoir depuis la cinquié-

tudinalibus, alteris transversis variegantur. Inferiores alarum tectrices minores sunt candidæ, fusco saturato transversim striatæ : majores pariter albæ, tæniis transversis dilutè cinereis variæ. Tectrices alarum superiores minimæ, illæ scilicet quæ alarum margines obtegunt, sunt saturatè fuscæ, candicante fimbriatæ : majores corpori viciniores pennis scapularibus concolores : proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum obtinent, griseæ, albo marginatæ, lineâque fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ : majores tandem à corpore remotiores nigricant ; ex istis autem intimæ albo in apice marginantur. Alam componunt triginta remiges, quarum tres primores sunt nigricantes, in latere exteriori saturatiùs, in interiori dilutiùs, interiùs insuper maximâ parte candicante maculatæ, & scapo albo præditæ : quarta novissimè descriptis concolor, sed in latere interiori maculis transversis albis versùs margines insignita : quinque proximè sequentes, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè ;

nigricantes , maculis transversis albis in utroque latere notata : septemdecim quæ sequuntur , à decima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè , griseæ , maculis transversis candidis in utroque latere insignita : quatuor corpori finitimæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem saturatè fusca , ad margines griseæ , fuscoque transversim striata. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes , & dum ala complicatur , ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus griseis , fusco transversim striatis. Mandibula superior ex fusco rubescit , versùs extremitatem tamen nigricat : mandibula inferior ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque candicans , in reliqua longitudine fusca , attamen versùs extremitatem nigricans. Pars crurum plumis denudata , pedesque fusco-rubescens ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Madagascaria* , unde in *musæum Reaumurianum* allatus est à *D. Poivre*.

me jusqu'à la neuvième inclusivement , sont noirâtres , & marquées des deux côtés de taches transversales blanches : les dix-sept suivantes , sçavoir depuis la dixième jusqu'à la vingt - fixième inclusivement , sont grises , & marquées des deux côtés de taches transversales blanches : les quatre plus proches du corps sont d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige ; leurs bords sont gris , & rayés transversalement de brun. Ces quatre dernières plumes sont longues & pointues , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes grises , rayées transversalement de brun. Le demi-bec supérieur est d'un brun-rougeâtre , qui devient noirâtre vers son bout : le demi-bec inférieur est blanchâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur ; ensuite il est d'un brun qui devient noirâtre vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , & les pieds sont d'un brun rougeâtre ; & les ongles noirâtres. On le trouve à *Madagascar* , d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre*.

** 4. LE COURLY VERD.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 2.

Numenius superne obscurè viridi-aureus, cupri puri colore varians, infernè cinereo-fuscus; capite superiore fusco, lineis longitudinalibus albidis vario; gutture & collo fusco-castaneis, gutture & colli inferioris parte supremâ lineis longitudinalibus albidis variegatis; reëtricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus; caudâ nonnihil bifurcâ
NUMENIUS VIRIDIS.

Numenius subaquilus. *Klein. Avi. pag. 110. N° 8.*

Numenius sive Falconellus puniceo-viridis; Ardeæ species Marfilli. *Klein. Avi. pag. 100. N° 7.*

Falcinellus puniceo-viridis; Ardeæ species. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 44. hujus icon non satis accurata Tab. 20.*

Falcinellus. *Gesn. Avi. pag. 220, in qua hujus icon minùs accurata.*

Falcinellus, sive Avis falcata. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 422. hujus icon non satis accurata pag. 423.*

Falcinellus, sive Falcata. *Jonst. Avi. pag. 105. hujus duæ icones, una à Gesnero, altera ab Aldrovando mutuata Tab. 51.*

Charlet. Exer. pag. 110. N° 7.

Charlet. Onomazt. pag. 103. N° 7.

Falcinellus Gesneri & Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 218. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 103. N° 3.

Falcinellus Gesneri & Aldrovandi, colore furvo. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 42. hujus icon satis accurata Tab. 19.*

Falcata. *Gesn. icon. Avi. pag. 116, in qua hujus icon minùs accurata. Les Italiens l'appellent FALCINELLO. Gesn. Aldrov. AYRON NEGRO. Gesn. Aldrov. Willugh. Marfil.*

Les Allemands, WELTSCHER-VOGEL. SICHLER; SAGISER. Gesn. Aldrov. Les Anglois, SCYTHE-BILL'D HERON. Charlet.

Il est à peu près de la grosseur du Corlieu. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied sept pouces, & jusqu'à celui

Numenium minorem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & septem pol-

lices explet, & ad extremos unguis unum pedem & undecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & decem lineas longum est; cauda eadem longitudine pollet; pars crurum plumis nudata unum pollicem & undecim lineas longa; pes tres pollices cum linea una; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & decem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus viginti quinque lineas; posticus autem unum pollicem & quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque productâ, adnectitur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremitatem pertingunt. Partem capituli superiorem obtegunt pennæ fuscæ, in utroque latere albido fimbriatæ; unde caput superius lineolis longitudinalibus albidis varie-

des ongles d'un pied onze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces dix lignes de long; sa queue a aussi trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, un pouce onze lignes; son pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derrière un pouce quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds dix pouces de vol, & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes brunes, bordées des deux côtés de blanchâtre; ce qui rend le dessus de la tête varié de petites lignes longitudinales de cette couleur. La gorge & le haut de la partie inférieure du col sont d'un brun tirant un peu sur le marron, chaque plume étant de même bor-

dée des deux côtés de blanchâtre ; ce qui produit la même variété que dessus la tête. Le reste du col est d'un brun tirant un peu sur le marron & sans taches. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus de la queue sont d'un verd-doré obscur, & changeant, selon les différentes expositions aux rayons de lumière, en une couleur de cuivre de rosette assez brillante. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un cendré-brun : on aperçoit cependant sur la poitrine & les couvertures du dessous de la queue un peu du même verd-doré que celui du dos. Les moyennes plumes de l'aile sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette : les grandes sont d'un verd-doré un peu plus foncé. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Les deux du milieu sont un peu plus courtes que les latérales, qui vont tou-

gatum apparet. Guttur & colli inferioris suprema pars ex fusco nonnihil ad castaneum colorem inclinant, & qualibet penna est pariter in utroque latere albido fimbriata; unde fit eadem ac in capite superiore varietas. Reliquum collum ex fusco paululum ad castaneum colorem vergit, & maculis destituitur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne & inferne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt obscure viridi-aureæ, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, cupri puri colore satis splendido variantes. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ tectrices ex cinereo fuscescunt : in pectore tamen & tectricibus caudæ inferioribus aliquid admiscetur ejusdem viridi-aurei quo dorsum perlustratur. Remiges minores sunt viridi-aureæ, cupri puri colore variantes : majores similiter imbutæ viridi-aureo, sed nonnihil saturatiore. Remiges corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duode-

cim rectrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermedia lateralibus paululum longitudine cedunt ; laterales autem sensim atque sensim majorem obtinent longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias trium linearum longitudine excedentem ; unde cauda explicata nonnihil bifurca apparet. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata , pedes , unguesque nigricantes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo D. Mauduyt.*

tes en augmentant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté qui est plus longue de trois lignes que les deux du milieu ; ce qui fait paroître la queue un peu fourchue , lorsqu'elle est étendue. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

5. LE COURLY MARRON.

Numenius splendide castaneus ; pectore viridi ; rectricibus splendide castaneis NUMENIUS CASTANEUS.

Arcuata minor , puniceo colore , pectore virescente. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 40. hujus icon satis accurata Tab. 18.

Cum præcedente magnitudine & crassitie circiter convenit. Caput , guttur , collum , dorsum , uropygium , venter , latera , crurum suprema pars , pennæ scapulares , alas superne & inferne vestientes , rectricesque caudæ superiores & inferiores splendide imbuuntur castaneo. Pectus elegantiter tingitur viridi. Remiges eodem imbuuntur castaneo ac

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du précédent. La tête , la gorge , le col , le dos , le croupion , le ventre , les côtés , le haut des jambes , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus & du dessous des ailes , & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un marron brillant. La poitrine est d'un beau verd. Les plumes de l'aile sont du même marron que celui du

reste du corps. Les plus proches du dos sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les plumes de l'aîle. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve sur les bords du *Danube*.

reliquum corpus ipsum tingitur. Corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Cujus coloris sint rostrum & pedes, prorsus melatet. Juxta *Danubii* ripas versatur.

** 6. LE COURLY BRUN D'AMÉRIQUE.

Numenius castaneo-fuscus; capite, gutture & collo fuscis, lineolis longitudinalibus albidis variegatis; uropygio, penis scapularibus & tectricibus alarum superioribus splendè fuscis, viridi colore variantibus; rectricibus superne concoloribus, subtus penitus fuscis NUMENIUS AMERICANUS FUSCUS.

Rusticola maritima minor. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 147.*

Guarauna. *Pison. Hist. Nat. pag. 91*, in qua hujus icon à *Marcgravo mutuata*.

Guarauna Brasiliensibus, *Rusticola* aquatica. *Marcgr. Hist. Br. pag. 204*, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 139. hujus icon à *Marcgravo mutuata Tab. 59*, sub titulo, *Guara*.

Guarauna Brasiliensibus *Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 104. N^o. 7.*

Guarauna Brasiliensibus *Marcgravii*; *Rusticula* aquatica Brasiliensis. *Willugh. Ornith. pag. 215*. hujus icon à *Marcgravo mutuata Tab. LIII.*

Les Brasiliens l'appellent *GUARAUNA*. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Il est à peu près de la grosseur du *petit Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux

Cum *Numenio* minori crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad cauda extremitatem unum pedem & novem pollices æquat, & ad extremos

ungues duos pedes & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices, & sex lineas longum est; cauda quatuor pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes tres pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices & sex lineas, intimus duos pollices & quatuor lineas; posticus autem sexdecim lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque protensâ, connectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & septem pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Caput, guttur & collum vestiunt plumulæ in medio fuscæ, in utroque latere albidæ; quò fit ut partes istæ lineolis longitudinalibus albidis variegatæ appareant. Dorsum, pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera obtegunt pen-

pieds neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces six lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes; son pied trois pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derrière seize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds sept pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont couverts de petites plumes brunes, dans leur milieu, & blanchâtres sur les deux côtés; ce qui rend ces parties variées de petites lignes longitudinales blanchâtres. Le dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un marron-brun. Les plumes scapulaires, le croupion, & les couvertures

du dessus & du dessous de la queue sont d'un brun brillant & changeant en verd, selon les différentes directions des rayons de lumiere. Les couvertures du dessous des ailes sont brunes. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun brillant & changeant en verd, comme les scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur : du côté extérieur, & tout-à-fait brunes du côté intérieur. Les plumes de l'aîle sont entièrement brunes, excepté en-dessus du côté extérieur, où elles sont d'un brun brillant & changeant en verd. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un brun brillant & changeant en verd en-dessus, & tout-à-fait brunes en dessous. Le bec est jaunâtre à son origine, & brun vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un gris-brun ; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Bresil*, & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Réaumur* par *M. des Essars*.

*næ castaneo - fusca. Scapulares, uropygium, tectricesque caudæ superiores & inferiores sunt splendide fusca, & secundum varios ad lucem objectus, viridi colore variantes. Pennæ alas subtus cooperientes sunt fusca. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, splendide fusca, & scapularium instar, viridi variantes : majores à corpore remotiores in latere exteriori concolores, in interiore penitus fusca. Remiges quoque fusca, superne tamen in latere exteriori splendide fusciscunt & viridi colore variant. Corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat reatricibus superne splendide fuscis, viridi colore variantibus, subtus penitus fuscis. Rostrum in exortu flavicans, versùs extremitatem fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo - fusci ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Brasilia & Cayana*, undè in *musæum Realmuriani* missus à *D. des Essars*.*

7. LE COURLY VARIÉ DU MEXIQUE.

Numenius superne purpureo, viridi & nigricante varius, infernè fuscus, rubro variegatus; capite anteriore nudo, albo-rubescente; collo fusco, albo, viridi & fulvescente vario; rectricibus viridibus, cupri puri colore variantibus; rostro cyaneo; pedibus nigricantibus NUMENIUS MEXICANUS VARIUS.

Corvus aquaticus. Euf. Nieremb. pag. 215.

Acacalotl; seu Corvus aquaticus. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 15. Cap. IX. Jonst. Avi. pag. 127.

Acacalotl, seu Corvus aquaticus Nierembergii. Willugh. Ornith. pag. 218.

Acacalotl, seu Corvus aquaticus Hernandezii, Nierembergii. Raj. Syn. Avi. pag. 104. N^o. 5.

Ies Mexiquains l'appellent ACACALOTL. Fern.

Crassitie præcedentem multum antecellit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres circiter pedes æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo pollices longum est. Crura, pedesque, simul commensurati, tredecim pollicum & sexlinearum longitudinem obtinent. Capitis anterior pars, à rostro scilicet ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo albo-rubescente obtegitur. Caput posterius & collum vestiunt pennæ fuscæ, albæ & virides, quibusdam ad fulvum vergentibus admixtis. Dorsum & uropygium purpureo, viridi & ni-

Il est beaucoup plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ trois pieds. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit pouces de long. Ses jambes & ses pieds sont, pris ensemble, longs de treize pouces six lignes. La partie antérieure de la tête, depuis le bec jusqu'au-delà des yeux, est dé-garnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un blanc-rougeâtre. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes brunes, blanches & vertes, & de quelques-unes qui tirent sur le fauve. Le dos & le croupion sont variés de pourpre, de verd &

de noirâtre, mêlés confusément ensemble, le tout étant fort brillant. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées des mêmes couleurs. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes brunes, auxquelles sont mêlées quelques plumes rouges. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement brunes, & mêlées de quelques plumes rouges. Le dessous des aîles est d'un verd brillant & changeant, selon les différens jours auxquels il est exposé. Les couvertures du dessus des aîles sont vertes. Les plumes de l'aîle sont d'un verd brillant, & changeant en couleur de cuivre de rosette. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Les yeux sont noirs : leur iris est d'un rouge de sang. Le bec est bleu. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont noirâtres; & les ongles noirs. On le trouve au *Méxique*. Il se tient sur les bords des Lacs, & se nourrit de *Poissons*.

gricante confusè mixtis variegantur; omnes autem colores isti sunt valdè splendentes. Scapulares pennas & superiores caudæ rectrices iidem colores variegant. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera cooperiunt pennæ fuscæ, pennis quibusdam rubris intersertis. Inferiores caudæ rectrices fusco quoque imbutæ, pennis quibusdam rubris similiter admixtis. Alæ subtus splendè virides, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, variantes. Superiores alarum rectrices virides. Remiges splendè virides, cupri puri colore variantes. Corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Alam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculi sunt nigri: ipsorum irides sanguineæ. Rostrum cyaneum. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigricantes; ungues verò nigri. Habitat in *Mexico*. Juxta Lacuum ripas versatur, & *Piscibus* victitat.

** 8. LE GRAND COURLY D'AMÉRIQUE.

Numenius albidus ; capite anteriore nudo, nigro - cœrulescente ; capite posteriore, & collo griseis ; uropygio nigro-virescente ; remigibus majoribus & rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus nigris ; rostro fusco-rubescente ; pedibus nigris . . . NUMENIUS AMERICANUS MAJOR.

Numenius niger. *Klein. Avi. pag. 109. N^o. 6.*

Tantalus ; Loculator. *Klein. Avi. pag. 127. Lit. C.*

Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 75. sp. 1.

Curicaca. *Pifon. Hist. Nat. pag. 88, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Curicaca Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 191, in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 131. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 57.

Curicaca Brasiliensium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 218. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 103. N^o. 4.

Curicaca, Oiseau de Riviere. *Des March. Tom. III. pag. 326.*

Pélican Américain. *Catesb. Tom. I. pag. 81 ; avec une très-bonne figure Pl. 81.*

Les Portugais l'appellent MASARINO. *Marcgr. Pifon. Jonst. Willugh. Raj. Klein.*

Les Anglois, WOOD PELICAN. *Catesb.*

Les Brasiliens, CURICACA. *Marcgr. Jonst. Willugh, Raj.*

Ad *Anseris* crassitiem accedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & octo pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & tres lineas. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque novem pollices & sex lineas longum est ; cauda quatuor pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata tres polli-

Il est presqu'aussi gros qu'une Oye. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf pouces six lignes de long ; sa queue quatre pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces ; son pied

quatre pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derrière dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a trois pieds onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dé-garnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un noir-bleuâtre. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes grises. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, ainsi que les plumes scapulaires & les couvertures du dessous de la queue, sont blanchâtres. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-verdâtre. Les couvertures du dessous des

ces; pes quatuor pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & totidem lineas, extimus duos pollices & tres lineas, intimus duos pollices cum linea unica; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ; & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & undecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denu-datur, & cute tantummodo nigro-cœrulescente obtegitur. Caput posterius & collum pennis vestiuntur griseis. Quæ partem dorsi supremam, pectus, ventrem, crurum supremam partem & latera obtegunt, sicut & scapulares, inferioresque caudæ tectrices, sunt albidæ. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ tectrices ex nigro virescunt.

Pennæ

Pennæ alas subtus obtegentes sunt candicantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, candidæ: majores à corpore remotiores nigro-virescentes. Remiges majores superne ex nigro quoque virescunt, subtus sunt penitus nigra: minores candicantes. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus penitus nigris. Oculi sunt nigri: ipsorum irides rufescentes. Rostrum, quod versùs caput crassissimum, ex fusco rubescit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. *Piscibus & Animalibus aquaticis* victitat. Habitat in *Carolina, Brasilia & Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Artur.*

aîles sont blanchâtres. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches: les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un noir-verdâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont en-dessus de cette dernière couleur, & tout-à-fait noires en-dessous: les moyennes sont blanchâtres. De ces dernières, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont noirs; & leur iris est rouffâtre. Le bec, qui est très-gros vers la tête, est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Il se nourrit de *Poissons & d'Animaux aquatiques.* On le trouve à la *Caroline*, au *Bresil & à Cayenne*; d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

9. LE PETIT COURLY D'AMÉRIQUE.

Numenius albidus; capite anteriore nudo, nigro; capite posteriore, & collo griseis; uropygio nigro-virescente; re;
Tom. V. V u

migibus majoribus & rectricibus superne nigro-virescentibus, subtus nigris; rostro fusco-rubescente; pedibus pallidè rubris. . . . NUMENIUS AMERICANUS MINOR.

Matuitui. *Pison. Hist. Nat. pag. 83.*

Curicacæ alia species, Matuitui dicta. *Marcgr. Hist. Br. pag. 191.*

Jonst. Avi. pag. 131.

Willugh. Ornith. pag. 218.

Les Brasiliens l'appellent MATUITUI. *Marcgr. Jonst. Willugh.*

Il est à peu près de la grosseur d'une Poule. La partie antérieure de sa tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dépourvue de plumes, & couverte seulement d'une peau noire. Le derrière de la tête & le col sont couverts de plumes grises. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, sont blanchâtres. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessous des ailes & celles du dessous de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-verdâtre. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un noir-verdâtre. Les grandes plumes de l'aile sont en-dessus de cette dernière couleur, & tout-à-fait noires en-dessous :

Crassitie Gallinam circiter æmulatur. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo nigrâ obtegitur. Caput posterius & collum vestiunt pennæ griseæ. Quæ partem dorsi supremam, pectus, ventrem, crurum supremam partem & latera cooperiunt, sunt albidæ. Scapulares, quæ alas subtus obtegunt, inferioresque caudæ tectrices eodem colore imbutæ. Dorsi pars infima, uropygium & superiores caudæ tectrices sunt nigro-virescentes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniore, candidæ : majores à corpore remotiores nigro-virescentes. Remiges majores superne ex nigro quoque virescunt, subtus verò sunt penitus nigræ : minores candidantes. Ex minoribus autem corpori finitimæ lon-

gæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices superne nigro-virescentes, iubtus penitus nigra. Oculi sunt nigri: ipsorum irides rufescentes. Rostrum fusco-rubescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri: ungues verò nigri. Præcedentis instar, *Piscibus & aquaticis Animalibus* victitat. Habitat in *Brasilia*.

les moyennes sont blanchâtres. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont noirs; leur iris est roussâtre. Le bec est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles noirs. Il se nourrit, comme le précédent, de *Poissons & d'Animaux aquatiques*. On le trouve au *Bresil*.

** 10. LE COURLY BLANC DU BRÉSIL.

Numenius albus; capite anteriore nudo, pallidè rubro; remigibus quatuor majoribus apice nigro-virescentibus; rectricibus candidis; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . .
NUMENIUS BRASILIENSIS CANDIDUS.

Numenius albus. *Klein. Avi. pag. 109. N^o. 3.*

Scolopax rostro arcuato, pedibus rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus. *Scolopax alba. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 2.*

Corlieu blanc. *Catesb. Tom. 1. pag. 82; avec une figure exacte Pl. 82.*

Les Anglois l'appellent WHITE CURLEW. *Catesb.*

Crassitie *Numenium* minore nostratem multum superat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem unde-

Il est beaucoup plus gros que notre petit Courly. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces trois lignes, & jus-

qu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue trois pouces neuf lignes; la partie des ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derrière quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds huit pouces de vol; & ses ailes; lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un rouge pâle. Le derrière de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du

cim pollices & tres líneas explet, & ad extremos ungue duos pedes & totidem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda tres pollices & novem líneas; pars crurum plumis denudata quindecim líneas; pes duos pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex líneas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; posticus autem quatuordecim líneas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & octo pollicum; alæ verò complicatæ ferè ad extremitatem caudæ pertinent. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obducitur. Caput posterius, collum, universumque corpus vestiunt pennæ

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 347

albæ. Scapulares, quæ alas superne & infernè obtegunt, rectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Remiges quatuor primores sunt candidæ, attamen in apice ex nigro obscurè virefcunt : reliquæ omnes penitùs albent. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Oculorum irides eleganter griseæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque pallidè rubri. *Fœmina à mare nullo modo discrepat. Habitat in variis Americæ regionibus. A Cayana in museum Real-murianum missus à D. des Essars.*

dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les quatre premières plumes de l'aile sont blanches, excepté leur extrémité, qui est d'un noir - verd obscur : toutes les autres sont entièrement blanches. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est d'un joli gris. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un rouge pâle. La femelle ne diffère point du mâle. On le trouve en différens endroits de l'Amérique. Il a été envoyé de Cayenne à M. de Reaumur par M. des Essars.

** II. LE COURLY BRUN DU BRÉSIL.

Numenius superne fuscus, infernè albus ; capite anteriore nudo, pallidè rubro ; capite posteriore & collo dilutè fuscis ; uropygio candido ; rectricibus fuscis ; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . . NUMENIUS BRASILIENSIS FUSCUS.

Numenius fuscus. *Klein. Avi. pag. 109. N^o. 4.*

Arquata cinerea. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 126.*

Arquata Americana cinerea. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp. 5.*

Scolopax rostro arcuato, pedibus rubris, corpore fusco, cauda basi

alba. *Scolopax fusca. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 3.*

Corlieu brun. *Catesb. Tom. I. pag. 83 ; avec une figure exacte Pl. 83.*

*Les François de la Guiane l'appellent FLAMANT GRIS. Barr.
Les Anglois, BROWN CURLEW. Catesb.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue trois pouces sept lignes; la partie de ses jambes qui est dégarée de plumes, quatorze lignes; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derrière quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds sept pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices explet; & ad extremos ungues duos pedes unum pollicem & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda tres pollices & septem lineas; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas; pes duos pollices cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extremus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum septem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extre-

nam attingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrà obtegitur. Caput posterius & collum pennis vestiuntur dilutè fuscis. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices sunt fusca. Dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutè fusca. Remiges fusco saturatiore tinctæ. Corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda conflatur. Oculorum irides eleganter griseæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri; ungues verò fusci. *Fœmina* cum *mare* satis benè convenit. Habitat in variis *Americæ* regionibus. A *Cayana* in *musæum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un rouge pâle. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes d'un brun clair. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont brunes. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un brun clair. Les plumes de l'aile sont d'un brun plus foncé. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes brunes. L'iris des yeux est d'un joli gris. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles bruns. La *femelle* ressemble assez bien au *mâle*. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

** 12. LE COURLY ROUGE DU BRÉSIL:

Voyez Pl. XXIX. Fig. 1. & celui du moyen âge Fig. 2.

Numenius coccineus; capite anteriore nudo, pallidè rubro; remigibus binis majoribus apice nigro-chalybeis; rectricibus coccineis, scapis primâ medietate albis; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . . NUMENIUS BRASILIENSIS COCCINEUS.

Numenius ruber. Klein. Avi. pag. 109. N^o. 5.

Numenius Indicus. Clus. exot. Actuar. pag. 366, in qua hujus icon non satis accurata.

Arquata phoenicea. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 126.

Arquata Americana phoenicea. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp. 6.

Scolopax rostro arcuato; pedibus rubris, corpore sanguineo, alarum apicibus nigris. Scolopax rubra. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 77. sp. 1.

Guara. Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 575.

Jonst. Avi. pag. 151.

Guara Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 203, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 139. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Guara Brasiliensibus Marcgravii. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 317. N^o. VIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 104. N^o. 6.

Guara Brasiliensibus Marcgravii; Numenius Indicus Clusii. Willugh. Ornith. pag. 219. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIV.

Guara Brasiliensis dicta. Charlet. Exer. pag. 119. N^o. III.

Charlet. Onomast. pag. 116. N^o. III.

Avis Brasiliensis Guara dicta. Mus. Worm. pag. 308, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Ibis. Moehr. Avi. Gen. 80.

Ardea porphyrio. Klein. Avi. pag. 124. N^o. 11.

Avis porphyrio, Amboinensis; seu Ardea rubra, Carollina, Ibis species. Seb. Vol. I. pag. 98. hujus icon satis accurata Tab. LXII. fig. 3.

Corlieu rouge. Catesb. Tem. I. pag. 84; avec une figure exacte Pl. 84.

Les François de la Guiane l'appellent FLAMANT ROUGE. Barr.

Les Anglois, SCARLET CURLEW OF BRASIL. Charlet. RED-CURLEW. Catesb.

Les Brasiliens, GUARA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Charlet.

Numenio

Numenio Brasiliensi candido paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem novem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis unum pedem undecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices & novem lineas longum est; cauda tres pollices & decem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices & octo lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum sex lineis; extimus duos pollices, intimus unum pollicem & decem lineas; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensa, connectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum septem pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Courly blanc du Brésil*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces dix lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces neuf lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derrière quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds sept pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un

rouge pâle. Le derrière de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un rouge très-vif & très-éclatant. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Toutes les plumes de l'aile sont du même rouge que celui du corps ; mais les grandes ont leur tige blanche depuis leur origine jusque vers leur extrémité ; & les moyennes ont aussi leur tige blanche, mais seulement depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur : de plus les deux premières plumes de l'aile sont terminées d'un noir brillant comme l'acier poli, & cela dans l'espace de deux pouces du côté extérieur, & d'un pouce neuf lignes du côté intérieur. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes du même rouge que celui des plumes de l'aile, & qui ont leur tige blanche depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur. Les yeux sont noirs. Le bec, la partie des jambes

Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrà obtegitur. Capitis pars posterior, collum, univèrsisque corpus pennis vestiuntur splendidissimè coccineis. Scapulares, quæ alas superne & infernè obtegit, teçtricesque caudæ superiores & inferiores eodem colore perlustrantur. Remiges alarum omnes eodem imbuuntur coccineo ac corpus ipsum tingitur ; majores tamen scapis donantur ab ipsarum exortu versùs extremitatem usque candidis ; minores verò scapis quidem albis præditæ sunt, sed tantummodo ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque : binæ insuper primores remiges sunt in apice nigro-chalybeæ, idque in latere exteriori per spatium duorum pollicum, in interiori verò per unius pollicis & novem linearum intervallum. Remiges corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices eodem imbutæ coccineo ac

ipsæ remiges, & quarum scapi ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albert. Oculi sunt nigri. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri; ungues verò griseo-fusci.

Hæc Avis primùm exclusæ coloris est in universo corpore saturatè fusci; hinc evadit grisea; deinde, ætate proVectâ, alba efficitur, & tandem sensim atque sensim rubescit; ita tamen ut rubescere incipiat antequam griseus color penitùs deleatur; unde fit ut secundo ætatis anno griseo, albo & rubro sit variegata: & tandem, dum magis magisque senescit, splendidissimum illum colorem coccineum acquirit.

Habitat in variis *Americæ* regionibus inter Tropicos positis, præsertim *Brasilia* & *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. des Effars*.

Cet Oiseau, en naissant, est entièrement d'un brun foncé; ensuite il devient gris; après quoi, à mesure qu'il avance en âge, il passe à la couleur blanche, & enfin peu à peu devient rouge; mais de façon que le rouge commence à paroître avant que le gris soit entièrement disparu; de sorte que dans la seconde année de son âge il est varié de gris, de blanc & de rouge: enfin en vieillissant il devient d'un rouge très-vif & très-éclatant.

On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*, entre les Tropiques, sur-tout au *Bresil*, & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Effars*.

13. L'IBIS.

Numenius niger; capite anteriore nudo, rubro; rectricibus nigris; rostro, pedibusque rubris. . . . IBIS.

Numenius holosericus. *Klein. Avi. pag. 110. N^o. 9.*

Ardea capite lævi, corpore albo, rostro flavescente apice pedibusque nigris. *Ibis nigra*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 18. var. β.*

Gallinago sylvestris aquatica. *Gaz. Rup. Best. hujus icon non satis accurata Tab. 19.*

Mus. Best. pag. 31. N°. 2. hujus icon non satis accurata Tab. VIII. N°. 2.

Jonst. Avi. pag. 160.

Ibis. Gesn. Avi. pag. 567.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 312. hujus icon non satis accurata pag. 313.

Jonst. Avi. pag. 101. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 50.

Presp. Alp. Egypt. Vol. 1. pag. 199.

Moehr. Avi. Gen. 80.

Ibis nigra. Bell. Obs. pag. 103.

Charlet. Exer. pag. 108. N°. II.

Charlet. Onomazt. pag. 102. N°. II.

Ibis nigra Bellonii. Raj. Syn. Avi. pag. 98.

Ibis Bellonii. Willugh. Ornith. pag. 212. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLIX.

Ibis. Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 199, avec une figure peu exacte pag. 200.

Espece de Cigogne noire. Bel. Portr. d'Ois. pag. 44 b, dans laquelle est la même figure.

Les Grecs l'appellent Ἰβίς. Bel. Gesn. Aldrov.

Les Egyptiens, LEHERAS ou JEHERAS. Aldrov.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Courly*. La partie antérieure de sa tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau rouge. Le derrière de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes noires. Les plumes de l'aile & celles de la queue sont de la même couleur. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, &

Numenio paululum crassitie cedit. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo rubra obducitur. Capitis posteriorem partem, collum & corpus universum vestiunt pennæ nigrae. Remiges, sicut & rectrices, eodem imbuuntur colore. Remiges corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque rubri sunt coloris;

ungues verò nigri. Habitat les pieds sont rouges ; & les
in *Ægypto.* ongles noirs. On le trouve en
Ægypte.

14. L'IBIS BLANC.

Numenius sordidè albo - rufescens ; capite anteriore nudo ,
rubro ; lateribus rubro-purpureo & carneo colore macula-
tis ; remigibus majoribus nigris ; rectricibus sordidè albo-
rufescentibus ; rostro in exortu dilutè luteo , in extremitate
aurantio ; pedibus griseis. . . . IBIS CANDIDA.

Ardea capite lævi , corpore albo , rostro flavescente apice pedibusque
nigris. Ibis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 18.*

Ardea capite lævi , corpore albo , remigibus duabus primis margine ex-
teriore fuscis. Ardea æquinoctialis. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76.*
sp. 19.

Ibis non ex toto nigra. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.*

Ibis blanc. *Hist. de l'Acad. Tom III. Part. III. pag. 61 ; avec une figure*
assez exacte Pl. 13.

Ciconia albæ crassitie ce-
dit. Ipsius longitudo ab apice
rostri ad caudam extremam
duos pedes sex pollices &
quatuor lineas æquat , & ad
extremos ungues tres pedes
& sex pollices. Rostrum ab ip-
sius apice ad oris angulos us-
que septem pollices longum
est ; cauda tres pollices & sex
lineas ; pars crurum plumis
denudata quatuor pollices
cum quinque lineis ; pes sep-
tem pollices ; trium digito-
rum anticorum medius cum
ungue tres pollices & novem
lineas , extimus duos polli-
ces & octo lineas , intimus
duos pollices cum tribus li-

Il n'est pas si gros que la
Cigogne blanche. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue est de deux
pieds six pouces quatre lignes,
& jusqu'à celui des ongles de
trois pieds six pouces. Son bec
depuis son bout jusqu'aux coins
de la bouche a sept pouces de
long ; sa queue trois pouces
six lignes ; la partie de ses jam-
bes qui est dégarnie de plu-
mes , quatre pouces cinq lignes ;
son pied sept pouces ; celui
du milieu des trois doigts an-
térieurs , joint avec l'ongle ,
trois pouces neuf lignes , l'ex-
térieur deux pouces huit lignes ,
l'intérieur deux pouces trois lig-

nes ; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'un peau rouge & ridée. Le derriere de la tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les plumes scapulaires, les ouvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc sale & roussâtre. Les côtés sont de la même couleur, & variés de taches, dont les unes sont d'un rouge-pourpré, & les autres de couleur de chair. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont d'un blanc sale & roussâtre. De celles-ci, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La

nelis; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, tantummodo ad primum usque articulum protensâ, coadunatur. Alæ complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo rubrâ & rugosâ obtegitur. Caput posterius, collum, dorsum, uropygium, pectus, venter, crurum suprema pars, pennæ scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, rectricesque caudæ superiores & inferiores ex sordidè albo rufescunt. Latera eodem colore tinguntur, & maculis variegantur, aliis rubro-purpureis, alteris carneo colore imbutis. Remiges alarum majores sunt nigrae : minores sordidè albo-rufescentes. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus





Fig. 2.

3 4 5 6
de 6. pouces.

2. Courby verd.







Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. pouces.


1. Petit Courby ou Corlieu.


2. Courby verd.






Madagascar.





Designé et Gravé par Martinet.

Courby de Madagascar.






Fig. 2.

2. Courly rouge du Brésil, du moyen âge.






Fig. 1.

Fig. 2.

Designé et Gravé par Martinot.

1. Courly rouge du Brésil.

2. Courly rouge du Brésil, du moyen âge.



sordidè albo - rufescentibus. Rostrum, quod in exortu sesquipollicis diametrum obtinet, estque in extremitate quasi truncatum, est in exortu dilutè luteum; qui color magis magisque fit saturior, & tandem versùs rostri extremitatem aurantius evadit. Pars crurum plumis denudata rubra. Pedes sunt grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ægypto*.

queue est composée de douze plumes d'un blanc sale & roussâtre. Le bec, qui a à son origine un pouce & demi de diamètre & est comme tronqué à son extrémité, est d'un jaune clair à son origine; cette couleur devient de plus en plus foncée, & est orangée vers l'extrémité du bec. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, est rouge. Les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Égypte*.

SECTIO VII.

SECTION VII.

Eæ quæ rostrum habent rectum, horizontaliter planum; ipsius apice ampliato, subrotundo, spathæformi.

Ceux qui ont le bec droit, plat horizontalement; & dont le bout est plus large & arrondi en forme de spatule.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Plateæ*.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Spatule*.

LXXIX.

LXXIX.

Genus Plateæ.

Le genre de la Spatule.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranibus destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plumis denudata:

Son caractère est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derrière:
 La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec droit, plat horizontalement; & dont le bout est plus large & arrondi en forme de spatule.

Rostrum rectum, horizontaliter planum; ipsius apice ampliato, subrotundo, spathæformi.

** LA SPATULE.

Platea cristata, in toto corpore candida; oculorum ambitus & gutture nudis, nigris. . . . PLATEA.

Platea candida. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIX. sp. 1.*

Platea. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 48. sp. 1.*

Schwenck. Avi. Sil. pag. 341.

Platea, Leucorodius Willughbeii. *Klein. Avi. pag. 126. N^o. 1.*

Platea, sive Pelecanus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 212. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 102. N^o. 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.

Platea, sive Pelicanus Aldrovandi; Leucorodius, seu Albardeola Willughbei. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 28. hujus icon satis accurata Tab. 12.*

Platalea corpore albo. Leucorodia. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 73. sp. 1.*

Pelecanus. *Gesn. Avi. pag. 665. hujus icon non satis accurata pag. 666.*

Moehr. Avi. Gen. 60.

Pelecanus, Platea, vel Platalea. *Gesn. icon. Avi. pag. 92, in qua hujus icon non satis accurata.*

Pelicanus Gesneri; Platea Plinii; Platelea Ciceronis; Anser Cochlearius; Cochlearia; Anser platyrinchos; Albardeola; Leucorodius.

Rzac. Auç. Hist. nat. Pol. pag. 407.

Albardeola. *Mus. Worm. pag. 310.*

Albardeola, Platea Plinii, Platelea Ciceronis, quam Pelecanum facit Ornithologus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 384. hujus icon satis accurata pag. 385; & altera icon minus accurata pag. 386.*

Platyrinchos. *Mus. Best. pag. 36. N^o. 4. hujus capitis icon satis accurata Tab. IX. N^o. 4.*

Ardea alba. *Jonst. Avi. pag. 103. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 46, sub titulo, Pelicanus, sive Platea.*

Ardea alba, Cochlearia, Platelea. *Charlet. Exer. pag. 109. N^o. 2.*

Charlet. Onomast. pag. 103. N^o. 2.

Anas rostro plano, apice dilatato, rotundatoque. *Favn. Suec. Linn. N^o. 87.*

Πελεκάιος,

Πελεκάνος, Arist. *Schwenck. Klein.*

Palette. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 23; avec une figure exacte Pl. 5.*

Pale, Poche & Cueiller. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 194, dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Pale, Poche, Cueiller, Truble. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 43 a, dans laquelle est la même figure.*

Pélican. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 173; avec une figure passable pag. 172. N^o. 4.*

Petit Héron, ou Bec à Cuiller. *Alb. Tom. II. pag. 42; avec une mauvaise figure Pl. 66.*

Les Hébreux l'appellent KAATH. *Gesn.*

Les Grecs, Πελεκαν. *Gesn. Schwenck. Λευκοράσιος. Bel. Aldrov. Λευκοροσιός. Jonst.*

Les Catalans, PELLICANO. *Bar.*

Les Italiens, BECQUAROVEGLIA. *Bel. BECCAROVEGLIA. Gesn. Aldrov. Marsil. Klein.*

Les Allemands, PELECAN. *Schwenck. PELICAN. Rzac. LOEFFLER. Gesn. Aldrov. Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Cologne, LEFLER. *Gesn. Aldrov.*

Les Silésiens, LOEFFEL-GANS. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Worm. Best. Rzac.*

Les Suisses, SCHUFLER. *Aldrov.*

Les Hollandois, LEEPELAER. *Aldrov.*

Les Flamands, LEPELAER. *Willugh. Raj. Sibbald. Klein.*

Les Frisons, LEPLER. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, BUCACZ. *Gesn.*

Les Polonois, PELIKAN; PLASKONOS. *Rzac.*

Les Russiens, CALPETRE. *Klein.*

Les Suédois, PELEKAN. *Linn.*

Les Anglois, PELLICANE. *Raj. SPOON-BILL. Willugh. Raj. Alb. WHITE AND SPOON-BILL'D HERON; SCHOVELER; MIRE-DRUMBEL. Charlet. SCHOVELARD; SCHOFER. Aldrov.*

Les Hollandois du Cap de Bonne Espérance, SLANGEN-VREETER. *Kolbe.*

Cum *Ardea vulgari* crassitie circiter convenit. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri
ad caudæ extremitatem
duos pedes & octo pollices
æquat, & ad extremos un-
gues tres pedes & duos pol-
lices. Rostrum ab ipsius ex-

Elle est à peu près de la gros-
seur du Héron ordinaire. Sa lon-
gueur depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue est de
deux pieds huit pouces, & jus-
qu'à celui des ongles de trois
pieds deux pouces. Son bec de-
puis son bout jusqu'aux coins

de la bouche a six pouces cinq lignes de long; il est large de sept lignes vers le milieu de sa longueur, & d'un pouce sept lignes vers son extrémité, qui est la partie arrondie en forme de spatule. Sa queue a quatre pouces neuf lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces six lignes; son pied quatre pouces sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne, l'extérieur deux pouces sept lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derrière dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend presque jusqu'à la seconde articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui s'étend seulement jusqu'à la première articulation. Elle a quatre pieds quatre pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La gorge & le tour des yeux sont dégarnis de plumes, & couverts seulement d'une peau noire. Le reste de la tête, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les ouvertures du dessus & du dessous

trimitate ad oris angulos usque sex pollices & quinque lineas longum est; versus mediam longitudinem septem lineas latum, & versus ipsius extremitatem, quæ pars est subrotunda & spathæformis, unius pollicis & septem linearum latitudinem obtinens. Cauda quatuor pollices & novem lineas longa; pars crurum plumis denudata tres pollices cum sex lineis; pes quatuor pollices & septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea una, extimus duos pollices & septem lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ferè ad secundum usque articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & totidem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Guttur & oculorum ambitus plumis denudantur, & tantum

modo cute nigrâ obfiti funt. Reliquum caput, collum & univerfum corpus veftiunt pennæ candidæ. Scapulares, alas fuperne & infernè veftientes, tectricefque caudæ fuperiores & inferiores concolores. Pennæ in occipitio funt ftrictiffimæ, quatuor pollices & tres lineas longæ, elegantemque criftam, collo incumbentem, efformant. Remiges omnes funt candidæ. (In quibusdam majores nigro terminantur). Secunda reliquas omnes longitudine excedit. Duodecim rectricibus candidis cauda conftat. Rofttrum in quibusdam grifeo-fufcum; in aliis nigrum; in alteris verfus ipfius exortum grifeo-fufcum, maculis nigris afperfum, & verfus extremitatem flavicans, maculis rubefcentibus refperfum. Mandibulæ fuperioris extremitas paululùm deorfum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem obtegit. Supra mandibulam fuperiorem in toto ambitu canaliculus extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedefque in aliis nigri, in alteris grifeo-fufci; ungues verò nigri. *Pifcibus* victitat, & in excelfarum arborum cacuminibus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

des aîles, & celles du deffus & du deffous de la queue font de la même couleur. Les plumes qui couvrent l'occiput, font fort étroites, longues de quatre pouces trois lignes, & forment une jolie hupe, qui retombe fur le col. Toutes les plumes de l'aîle font blanches. (Dans quelques-unes les plus grandes font terminées de noir). La feconde eft la plus longue de toutes. La queue eft compofée de douze plumes blanches. Le bec eft d'un gris-brun dans quelques-unes; dans d'autres il eft noir; & dans d'autres il eft vers fon origine d'un gris-brun femé de taches noires, & vers fon extrémité il eft jaunâtre, femé de taches rougeâtres. Le bout de la mandibule fupérieure eft un peu recourbé en - deffous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec fupérieur regne tout autour une rainure parallele à fa circonférence. La partie des jambes qui eft dégarnie de plumes, & les pieds font noirs dans les unes & d'un gris-brun dans d'autres : les ongles font noirs. Elle fe nourrit de *Poiffons*, & fait fon nid au fommet des grands arbres.

Du cabinet de M. de Reaumur.

** 2. LA SPATULE COULEUR DE ROSE:

Voyez Pl. XXX.

Platea rosea ; capite anteriore & gutture nudis ; candicantibus ; collo supremo candido ; rectricibus caudæ superioribus & inferioribus coccineis ; rectricibus roseis. . . .
 PLATEA ROSEA.

Platea Americana, albo roseoque colore mixta. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIX. sp. 2.*

Platea Brasiliensis. *Klein. Avi. pag. 126. N^o. 2.*

Platea Brasiliensis Ajaia dicta Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 102. N^o. 3.*

Platea Brasiliensis, Ajaia dicta, Lusitanis Colherado, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 213.*

Platalea corpore sanguineo. Ajaja. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 73. sp. 2.*

Ardea rosea, Spatula dicta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 124.*

Ajaia Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 204.*

Jonst. Avi. pag. 139.

Ayaya. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag. 575.*

Jonst. Avi. pag. 150.

Les François de la Guiane l'appellent SPATULE ; ESPATULE. Barr.

Les Portugais, COLHERADO. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Klein.

Les Flamands, LEPELAER. Marcgr. Jonst.

Les Brasiliens, AJAIA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Elle n'est pas si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds huit pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces cinq lignes de long ; il est large de huit lignes & demie vers le milieu de sa

Præcedenti crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes tres pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes octo pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque quinque pollices & totidem lineas longum est, versus mediam longitudinem

Ordo cum semi lineas latum, & versùs ipsius extremitatem, quæ pars est subrotunda & spathæformis, unius pollicis & decem linearum latitudinem obtinens. Cauda tres pollices & novem lineas longa; pars crurum plumis denudata duos pollices & quatuor lineas; pes tres pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea una, extremus duos pollices & novem lineas, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ ferè ad secundum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertinent. Capitis universâ pars anterior, ab exortu rostri ultra oculos usque, sicut & guttur, plumis denudatur, & tantummodo cute candicante obsita est. Caput pos-

longueur, & d'un pouce dix lignes vers son extrémité, qui est la partie arrondie en forme de spatule. Sa queue a trois pouces neuf lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces quatre lignes; son pied trois pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne; l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derrière dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend presque jusqu'à la seconde articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui s'étend seulement jusqu'à la première articulation. Elle a trois pieds onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Toute la partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, & la gorge sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau blanchâtre. Le derrière de la tête, & le col depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, sont couverts de très-petites plumes blanches. Le

reste du col & la poitrine sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de couleur de rose, avec un peu de couleur de rose plus foncé à la partie inférieure du col immédiatement au-dessus de la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du dessus des ailes sont de couleur de rose; il y a cependant vers le bas des côtés quelques plumes d'un rouge très-vif. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les plus petites couvertures du dessus des ailes sont de ce même rouge vif: les moyennes & les grandes, ainsi que toutes les plumes de l'aile, sont de couleur de rose. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est d'un gris-blanc. Comme dans la précédente, le bout de la mandibule supérieure est un peu recourbé en-dessous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec supérieur regne aussi tout autour une rainure parallèle à sa circonférence. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve au *Bresil* & dans la *Guiane*. Elle a été envoyée de

terius, collumque ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque vestiunt minutissimæ plumulæ candidæ. Reliquum collum & pectus albicant, & aliquid rosei admixtum habent; qui color roseus in parte colli inferiore immediatè supra pectus est paulò saturatior. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices roseo colore tinguntur; attamen versùs laterum partem infimam quædam extant pennæ splendide coccineæ. Quæ caudam superne & infernè cooperiunt, & tectrices alarum superiores minimæ sunt similiter coccineæ: mediæ & majores, sicut & remiges omnes, roseæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Rostrum cinereo-album. Præcedentis instar, mandibulæ superioris extremitas paululùm deorsum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem obteggit. Supra mandibulam superiorem in toto ambitu canaliculus similiter extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt grisei; ungues verò ni-

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 359
 gricantes. Habitat in *Brasilia & Guiana*. A *Cayana* *M. Artur.*
 in *musæum Reaumurianum*
 missa est à *D. Artur.*

3. LA SPATULE ROUGE.

Platea coccinea; capite anteriore & gutture nudis, candidantibus; torque nigro; collo supremo candido; rectricibus coccineis. . . . PLATEA COCCINEA.

Platea incarnata. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 316. N°. VII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 189. N°. 5.

Platea Americana Phœnicea. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIX.*
sp. 3.

Platea sanguinea tota. *Klein. Avi. pag. 126. N°. 3.*

Platalea corpore sanguineo. Tlahquechul s. Platea Mexicana. *Linn.*
Systh. Nat. ed. 10. Gen. 73. sp. 2. var. β.

Ardea phœnicea, Spatula dicta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 125.*

Avis vivivora. *Euf. Nieremb. pag. 214.*

Tlahquechul. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 49. cap. CLXXVIII.*
Jonst. Avi. pag. 126.

Tlahquechul, seu Platea Mexicana Nierembergii. *Willugh. Ornith.*
pag. 213.

Tlahquechul, seu Platea Mexicana Hernandezii, Nierembergii.
Raj. Syn. Avi. pag. 102. N°. 2.

Tlahquechul. *Charlet. Exer. pag. 119. N°. II.*
Charlet. Onomazt. pag. 116. N°. II.

Les François de la Guiane l'appellent SPATULE ROUGE; ESPATULE
 ROUGE. *Barr.*

Les Portugais, COLHERADO. *Sloane. Raj.*

Les Flamands, LEPELAER. *Sloane. Raj.*

Les Anglois, AMERICAN SCARLET PELECAN; AMERICAN SCARLET
 SPOON-BILL. *Sloane. Raj.* SCARLET SPOON-BILL'D BIRD OF AMERICA.
Charlet.

Les Mexiquains, TLAHQUECHUL. *Fern.*

Les Brasiliens, AIAIA. *Sloane. Raj.*


Cum præcedente crassitie
 convenit, & forsan illius est
 varietas. Caput anterius, ab
 exortu rostri ultra oculos

Elle est de la grosseur de la
 précédente, & en est peut-être
 une variété. La partie antérieure
 de la tête, depuis l'origine du


bec jusqu'au-delà des yeux, & la gorge sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau blanchâtre & ridée. Le derrière de la tête, & le col depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, sont couverts de petites plumes blanches; il y a cependant une assez large bande noire, qui sépare la tête du col, & forme une espece de collier. Le reste du col & tout le corps, ainsi que les aîles & la queue, sont d'un rouge très-vif. La prunelle des yeux est noire: leur iris est rouge. Le bec est gris. Le bout de la mandibule supérieure est un peu recourbé en-dessous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec supérieur regne tout autour une rainure parallèle à sa circonférence. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve dans *la Guiane* au *Mexique* & à *la Jamaïque*.


usque, & guttur plumis denudantur, & tantummodo candicante & rugosâ cute obsita sunt. Capitis posteriorem partem, collumque ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes, vestiunt plumulæ candidæ; at tamen latiuscula extat tænia nigra, caput à collo distinguens, & torquem quodammodo efformans. Reliquum collum, universumque corpus, sicut & alas caudamque, tingit color splendide coccineus. Oculorum pupilla nigra: ipsorum irides rubræ. Rostrum griseum. Mandibulæ superioris extremitas nonnihil deorsum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem cooperit. Supra mandibulam superiorem in toto ambitu canaliculus extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedesque grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana*, *Mexico* & *Jamaica*.






ur de rose .





Designé et Gravé par Martinet.

Spatule couleur de rose.



SECTIO VIII.

SECTION VIII.

Eæ quæ rostro donantur crasso & longo.

Ceux qui ont le bec gros & long.

IN illa sectione tria continentur genera Avium, formâ rostri à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostrum habent rectum, acutum; inter quas aliæ rostro donantur levi, ut *Ciconia*: alteræ mandibulâ superiore sulco longitudinali utrinque exaratâ præditæ sunt, ut *Ardea*: aliæ rostrum habent rectum, lateraliter planum, mandibulæ superioris apice adunco, ut *Scopus*.

CETTE Section contient trois genres d'Oiseaux; qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec droit & pointu; & parmi ceux-là les uns ont le bec lisse, comme la *Cigogne*: & les autres ont une rainure longitudinale de chaque côté sur la mandibule supérieure, comme le *Héron*: d'autres ont le bec droit, aplati par les côtés, le bout de la mandibule supérieure étant crochu, comme l'*Ombrette*.

LXXX.

LXXX.

Genus Ciconiæ.

Le genre de la Cigogne.

Hujus character est
 Digni quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plumis denudata:
 Rostrum crassum, longum, rectum, acutum, leve,

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
 La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
 Le bec gros, long, droit, pointu & lisse.

** I. LA CIGOGNE BRUNE.

Voyez Pl. XXXI.

Ciconia superne fusca, violaceo & viridi-aureo varians, infernè alba; gutture & collo fuscis, maculis candicantibus variegatis; reatricibus fuscis, violaceo & viridi colore variantibus CICONIA FUSCA.

Ciconia nigra. *Gesn. Avi. pag. 273, in qua hujus icon non satis accurata.*

Gesn. icon. Avi. pag. 122, in qua eadem icon.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 310. hujus icon non satis accurata pag. 311.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 236.

Mus. Worm. pag. 306.

Jonst. Avi. pag. 101. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 50.

Willugh. Ornith. pag. 211. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LII.

Raj. Syn. Avi. pag. 97. N^o. 2.

Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 372.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 55. sp. 5.

Ciconia nigra Willughbeii. *Klein. Avi. pag. 125. N^o. 2.*

Ciconia fusca Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 372.*

Ardea nigra; pectore abdomineque albo. *Faun. Suec. Linn. N^o. 135.*

Ardea nigra, pectore abdomineque albo. Ciconia nigra. *Linn. Systh.*

Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 8.

Ardea ventre subalbo, dorso nigro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I.*

sp. 9.

Cigogne noire. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 45 b; dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*

Alb. Tom. III. pag. 34; avec une figure mal coloriée Pl. 82.

Les Grecs l'appellent Πύλαργος μέλας. *Bel.*

Les Allemands, SCHWARTZER STORCK. *Gesn. Aldrov. SCHWARTZER*

STORCH. Schwenck. Rzac. BRAUN-SCHWARTZER STORCH. Rzac.

Les Polonois, BOCIAN CZARNY; BOCIAN SNIDY. *Rzac.*

Les Suédois, ODENSWALA. *Linn.*

Les Anglois, BLACK STORK. *Willugh. Alb.*

Elle est à peu près de la longueur d'un Dindon femelle. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue

Cum Gallo. - pavone femina crassitie circiter convenit. Iplius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam

Duos pedes novem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos unguis tres pedes duos pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & septem lineas longum est; cauda novem pollices; pars crurum plumis denudata tres pollices cum novem lineis; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum totidem lineis, extimus duos pollices & octo lineas, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem tredecim cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protendantur. Capitis superior pars fusca est, violaceo & viridi-aureo perlustrata. Guttur & collum vestiunt plumulæ

est de deux pieds neuf pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces sept lignes de long; sa queue neuf pouces; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, trois pouces neuf lignes; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces huit lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derrière treize lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Elle a cinq pieds six pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un brun mêlé d'un lustre de violet & de verd-doré. La gorge & le col sont couverts de petites plumes brunes, terminées chacune par une petite tache blanche; il faut cependant en

excepter les plumes qui couvrent le bas du col, qui sont d'un brun lustré de violet, & terminées de brun-grisâtre. (Quelques-unes n'ont point au col & à la gorge de taches blanchâtres). Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, toutes les couvertures du dessus des ailes & les plus petites du dessous sont d'un brun changeant en violet & en verdoré. Toutes les couvertures du dessus de la queue, ainsi que les grandes & les moyennes du dessous des ailes, sont pareillement brunes, mais sans aucun brillant. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. L'aile est composée de trente plumes d'un brun changeant en verd & en violet : le verd est plus apparent dans les dix premières plumes, & le violet l'est davantage dans les vingt autres. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aile. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en

fuscæ, minutâ maculâ candidante in apice præditæ; ex istis tamen excipiendæ sunt pennæ partem colli infimam obtegentes, quæ quidem fuscæ sunt, sed violaceo perlustratæ, & fusco-griseo terminatæ. (Quædam in collo & gutture maculis candidantibus destituuntur). Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes omnes & tectrices alarum inferiores minimæ sunt fuscæ, violaceo & viridi-aureo colore variantes. Pennæ caudam superne vestientes, inferioresque alarum tectrices majores & mediæ penitus fuscæ & nullomodo splendentes. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores alben. Alam componunt triginta remiges fuscæ, viridi & violaceo colore variantes: viridis autem color in primoribus decem remigibus, violaceus verò in viginti reliquis magis est conspicuus. Remiges corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim retrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermedia lateralium

longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Rostrum griseo-viridescens, at tamen in extremitate candidans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque in quibusdam obscurè rubri, in aliis viridescētes. Ungues lati sunt & plani. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur; & *Ranis* maximè delectatur. *Ex museo Reaumuriano.*

diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un gris-verdâtre, excepté son bout, qui est blanchâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un rouge sombre dans quelques-unes & verdâtres dans d'autres. Les ongles sont larges & plats. Elle se tient sur les bords des rivières & des étangs; & mange beaucoup de *Grenouilles*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LA CIGOGNE BLANCHE.

Voyez Pl. XXXII.

Ciconia alba; oculorum ambitu nudo, nigro; remigibus nigricantibus; rectricibus candidis. . . . CICONIA ALBA.

- Ciconia. *Gesn. Avi. pag. 262, in qua hujus icon non satis accurata.*
Gesn. icon. Avi. pag. 121, in qua eadem icon.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 291.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 234.
Jonst. Avi. pag. 100. hujus duæ icones non satis accuratæ Tab. 50.
Charlet. Exer. pag. 108. N°. I.
Charlet. Onomazt. pag. 102. N°. I.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 26. hujus icon satis accurata Tab. 11.
Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.
 Ciconia alba. *Willugh. Ornith. pag. 210. hujus icon à Jonstone mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 97. N°. A. 1.
Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 371.
Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 55. sp. 6.
Klein. Avi. pag. 125. N°. 1.

- Ciconia; Crotaliftria, Avis Hospita, peregrina, pietatis cultrix; Exul hyemis, Titulus tepidi temporis Petronio. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 274.*
- Ardea cirrata, alba, alis nigris, longiori gracilique rostro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 8.*
- Ardea alba, remigibus nigris. *Faun. Suec. Linn. N°. 136.*
- Ardea alba, remigibus nigris, cute sanguinea. Ciconia. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 7.*
- Ardea. *Moehr. Avi. Gen. 81.*
- Ibis alba Herodoto. *Gesn.*
- Cigogne. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 201; avec une figure très-peu exacte pag. 202.*
Bel. Portr. d'Ois. pag. 45 a, dans laquelle est la même figure.
Hist. de l' Acad. Tom. III. Part. III. pag. 61; avec une figure passable Pl. 13.
- Cigogne ordinaire ou blanche. *Alb. Tom. II. pag. 41; avec une figure passable Pl. 64.*
- Les Hébreux l'appellent CHASIDA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Chaldéens, CHARADITA; CHORATA. *Gesn. CHAVARITA; DEIUTHA; MACHUAUTHA; MACUARTA. Aldrov.*
- Les Arabes, ZAKID. *Gesn.*
- Les Perses, CHASIDA. *Gesn.*
- Les Grecs, Πελαγίς. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Raj. Charlet. Πιλαγος: & quelques-uns, Κινυψ; Κυκκφα. Jonst.*
- Les Turcs, LEGLÉK. *Gesn. Aldrov.*
- Les Espagnols, CIGUENNA. *Gesn. Aldrov.*
- Les Catalans, SEGONYA; GANTA. *Barr.*
- Les Italiens, CIGOGNA; ZIGOGNA. *Bel. Gesn. Aldrov. & le jeune, CICOGNINO. Aldrov.*
- Les Allemands, STORCK. *Gesn. Aldrov. Schwenck. STORCH. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. WEISSER STORCH. Rzac. ELBIGER. Schwenck.*
- Les Saxons, EBEHER. *Gesn. Aldrov.*
- Les Bas Saxons aux environs de Rostock, ADEBAR ou ODEBOER. *Gesn. Aldrov.*
- Les Illyriens, CZIAP. *Gesn. Aldrov.*
- Les Polonois, BOCZAN. *Gesn. Aldrov. BOCIAN; BOCIAN BIALY. Rzac.*
- Les Flamands, HOVARE. *Gesn. Aldrov. OYEVAERT; OUWEWAER. Aldrov.*
- Les Suédois, STORCK. *Linn.*
- Les Anglois, STORK. *Willugh. Charlet. Alb. WHITE STORK. Willugh. Raj.*

Elle est plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui

Præcedentem crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extre-

mam tres pedes totidem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes undecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem pollices & novem lineas longum est; cauda octo pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata quinque pollices; pes octo pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & quinque lineas, extimus duos pollices cum novem lineis, intimus duos pollices & sex lineas; posticus autem sexdecim cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertinent. Caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris infimam partem obtegunt, sex pollices

de la queue est de trois pieds trois pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds onze pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept pouces neuf lignes de long; sa queue huit pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq pouces; son pied huit pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces cinq lignes, l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces six lignes; & celui de derrière seize lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Elle a six pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, ont jusqu'à six pouces de longueur; sont larges de dix lignes, & se terminent en pointe. Les

couvertures du dessus & du dessous de la queue, toutes celles du dessous des ailes, les plus petites & les moyennes du dessus, & les petites plumes scapulaires sont pareillement blanches : les grandes scapulaires sont d'un brun-noirâtre ; quelques-unes cependant sont d'un noir changeant en violet. Les grandes couvertures du dessus des ailes sont aussi d'un brun-noirâtre, excepté les quatre plus proches du corps, qui sont d'un noir changeant en violet. L'aile est composée de trente plumes noirâtres. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. Le tour des yeux est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau noire. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. Les ongles sont larges & plats. Elle se tient, comme la précédente, sur les bords des rivières & des étangs ; & mange volontiers des *Grenouilles*, des *Limaçons*, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

longæ sunt, decem lineas latae, & in acumen desinentes. Pennæ caudam superne & infernè cooperientes, omnes istæ quæ alas subtus obtegunt, superiores alarum rectrices minimæ & mediæ, sicut & scapulares minores, similiter albicant. Scapulares majores sunt fusco-nigricantes ; quædam tamen ex nigro violaceo colore variant. Rectrices alarum superiores majores ex fusco quoque nigricant ; quatuor tamen corpori viciniores sunt nigræ, violaceo colore variantes. Tringinta remigibus nigricantibus ala conflatur. Corpori finitimæ longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum ambitus plumis denudatur, & tantummodo cute nigrâ obtegitur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque rubri. Ungues lati sunt & plani. Præcedentis instar ; juxta fluminum & stagnorum ripas versatur ; & *Ranas*, *Limaces*, &c. libenter devorat. *Ex museo Realmuriano.*

3. LA CIGOGNE D'AMÉRIQUE.

Ciconia alba ; oculorum ambitu nudo, coccineo ; rectricibus caudæ superioribus nigris ; remigibus nigro-virescentibus ; rectricibus candidis CICONIA AMERICANA.

Ciconia Americana. *Klein. Avi. pag. 125. N° 3.*

Ciconia Americana, Maguari Brasiliensibus *Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 211.*

Raj. Syn. Avi. pag. 97. N° 3.

Maguari Brasiliensibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 204.*

Jonst. Avi. pag. 139.

Les Brasiliens l'appellent MAGUARI. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Cum præcedente magnitudine circiter convenit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem pollices longum est ; collum unum pedem. Cauda brevis est, & alarum complicatarum extremitates non excedit. Pars crurum plumis denudata, pedesque eadem ac in præcedente longitudinem obtinent. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Caput, guttur, collum, universumque corpus obtegunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris partem infimam cooperiunt, reliquas

Tom. V.

Elle est à peu près de la grandeur de la précédente. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf pouces de long ; son col un pied. Sa queue est courte, & ne s'étend pas au-delà de l'extrémité des ailes, lorsqu'elles sont pliées. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont longs comme dans la précédente. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie in-

A a a

férieure du col, sont un peu plus longues que les autres. Les couvertures du dessus de la queue sont noires. Celles du dessous de la queue, toutes celles du dessous des ailes, les plus petites & les moyennes du dessus & les petites plumes scapulaires sont blanches. Les grandes scapulaires, les grandes couvertures du dessus des ailes & les plumes de l'aile sont d'un noir qui a un certain lustre de verd. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, à peu près aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. Le tour des yeux est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un rouge très-vif. Entre le bec & la gorge est un espace couvert d'une peau de la même couleur. La prunelle des yeux est noire : leur iris est d'un blanc-argenté. Le bec est d'un verd-jaunâtre depuis son origine jusqu'à la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est d'un cendré-bleu. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. Les ongles sont larges & plats.

On la trouve en *Amérique* & sur-tout au *B Brésil*.

longitudine paululum antecellunt. Superiores caudæ teatrices nigricant. Pennæ caudam subtus obtegentes, quæ alas infernè cooperiunt, superiores alarum teatrices minimæ & mediæ, minoresque scapulares sunt candidæ. Scapulares majores, teatrices alarum superiores majores, sicut & remiges, sunt nigro-virescentes. Remiges corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates circiter extenduntur. Duodecim reatricibus candidis cauda constat. Oculorum ambitus plumis denudatur, & tantummodo cute coccinæâ obtegitur. Rostrum inter & guttur spatium extat cute concolore obsitum. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides albo-argentæ. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque ex viridi flavicat, à medietate ad extremitatem ex cinereo cœrulescit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque rubri. Ungues lati sunt & plani. Habitat in *America*, præsertim in *Brasilia*.

*. 4. LA CIGOGNE DU BRÉSIL.

Ciconia alba; capite anteriore nudo, cinereo-albicante; remigibus nigro-rubefcentibus; rectricibus nigris. . . . **CICONIA BRASILIENSIS.**

Jabiru-Guacu. *Pison. Hist. Nat. pag. 87, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Jabiru-Guacu Petiguaribus; Nhandu Apoa Tupinambis. *Marcgr. Hist. Br. pag. 200. hujus icon non satis accurata pag. 201.*

Jonst. Avi. pag. 137. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Raj. Syn. Avi. pag. 96. N^o. 5.

Jabiru-Guacu Petiguaribus, Nhandu Apoa Tupinambis, Belgis Scur-Vogel, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 202. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*

Mycteria Americana. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 74. sp. 1.

Les Flamands l'appellent SCUR-VOGEL. Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.

Les Petivares, JABIRU-GUACU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Toupinambous, NHANDU APOA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Cum *Ciconia alba* crassitie circiter convenit. Rostrum, quod sola est hujus Avis pars à me observata, ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim pollices longum est. Mandibula inferior majorem obtinet crassitiem quàm superior, & quodammodo sursum recurvatur. Cauda brevis est, & alarum complicatarum extremitates non excedit. Crura octo pollices longa sunt; pedes tredecim pollices & sex lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extremo digito connectitur mem-

Elle est à peu près de la grosseur de la *Cigogne blanche*. Son bec, qui est la seule partie de cet Oiseau que j'ai vue, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche treize pouces de long. Le demi-bec inférieur est plus épais que le supérieur & en quelque façon recourbé en en-haut. Sa queue est courte; & ne s'étend pas au-delà de l'extrémité des ailes, lorsqu'elles sont pliées. Ses jambes ont huit pouces de long; ses pieds treize pouces six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

brane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Le devant de la tête est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau écailleuse d'un cendré mêlé d'un peu de blanc. Le reste de la tête est noir. Le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, sont assez longues, & pendent en en-bas. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont pareillement blanches. Les plumes de l'aile sont d'un noir qui a un certain lustre de rouge. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, à peu près aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noires. Les yeux sont noirs. Le bec est rouge, excepté son origine, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont cendrés. Les ongles sont larges & plats. On la trouve au *Bresil*.

branâ paululùm ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Caput anterius plumis denudatur, & tantummodo cute obtegitur squamosâ cinereâ, aliquo albore mixtâ. Reliquum caput nigrum. Collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris partem infimam obtegunt, sunt longiusculæ, & deorsum dependentes. Scapulares, alas superne & infernè cooperientes, rectricesque caudæ superiores & inferiores similiter albicant. Remiges alarum nigræ, rubini colore transplendentes. Corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates circiter attingunt. Duodecim reatricibus nigris cauda conflatur. Oculi sunt nigri. Rostrum rubrum, at tamen in exortu nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinerei. Ungues lati sunt & plani. Habitat in *Brasilia*.

5. LA CIGOGNE DE LA GUIANE.

Ciconia in toto corpore candida; capite & collo supremo nudis & nigris. . . . CICONIA GUIANENSIS.

Arquata Americana, cinerea maxima, vertice calvo & rugoso. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp. 10.*

Grus incurvato rostro, vertice calvo & rugoso. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 133.*

Jabiru Brasiliensibus, Belgis vulgò Negro. *Marcgr. Hist. Br. pag. 200, in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 137. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

Jabiru Brasiliensibus Marcgravii; Belgis vulgò Negro. *Willugh. Ornith. pag. 201. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*

Jabiru Brasiliensium Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 96. N^o. 4.*

Les Flamands l'appellent NEGRO. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Les Brasiliens, JABIRU. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.

Les Indiens de la Guiane, AOUAROU. Barr.

Craffitie Cignum antecel-
lit. Ipsi longitudo ab apice
rostri ad caudæ extremitatem
quatuor pedes & duos circi-
ter pollices explet, & ad
extremos unguis quinque
pedes & tres pollices. Ros-
trum, quod duorum pol-
licum & sex linearum lati-
tudinem obtinet, ab ip-
sius apice ad oris angulos
usque undecim pollices lon-
gum est; cauda novem cir-
citer pollices; pars cru-
rum plumis denudata sex
pollices & totidem lineas;
pes undecim pollices;
trium digitorum antico-
rum medius cum ungue
quatuor pollices: latera-

Elle est plus grosse qu'un
Cigne. Sa longueur depuis le
bout du bec jusqu'à celui de
la queue est d'environ quatre
pieds deux pouces, & jusqu'à
celui des ongles de cinq pieds
trois pouces. Son bec qui est
large de deux pouces six lignes,
à depuis sa pointe jusqu'aux
coins de la bouche onze pou-
ces de long; sa queue environ
neuf pouces; la partie de ses
jambes qui est dégarnie de plu-
mes, six pouces six lignes; son
pied onze pouces; celui du
milieu des trois doigts anté-
rieurs, joint avec l'ongle, qua-
tre pouces: les latéraux sont
un peu plus courts; & celui
de derriere est le plus court de

tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la première articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie du col qui en est la plus voisine, sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau noire. Le reste du col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les plumes de l'aile & celles de la queue, ainsi que toutes leurs couvertures, sont de la même couleur. Les yeux sont noirs. Le bec est de la même couleur. Le demi-bec supérieur est un peu plus épais que l'inférieur, & un peu courbé en en-bas vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve dans la *Guiane* & au *B Brésil*.

les paulò sunt breviores; posticus autem omnium brevissimus. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ paululùm ultra primum articulum extensâ; & cum digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum productâ, connectitur. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Caput & pars colli ipsi finitima plumis denudantur, & tantummodo cute nigrâ obteguntur. Reliquum collum, univsumque corpus pennis vestiuntur albis. Remiges, rectricesque, sicut & ipsarum tectrices omnes, eodem imbuuntur colore. Oculi sunt nigri. Rostrum similiter nigrum. Mandibula superior paulò majorem obtinet crassitiem quàm inferior, & versus extremitatem paululùm deorsum incurvatur. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Habitat in *Guiana* & *Brasilia*,

** 6. LA GRUE.

Voyez *Pl. XXXIII.*

Ciconia cinerea; capite superiore pennis nigris, in occipite raris, pilorum æmulis, obsito; vertice nigro, occipitio rubro; maculâ triangulari infra occipitium saturatè cinerea;

genis ponè oculos & collo superiore candidis ; remigibus nigris ; reëtricihus primâ medietate saturatè cinereis , alterâ nigricantibus GRUS.

Ardea vertice papilloso. *Faun. Suec. Linn. N^o. 131.*

Ardea vertice nudo papilloso , fronte remigibus occipiteque nigris , corpore cinereo. *Grus. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 4.*

Ardea rostro rubro , robusto , quadrangulo. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 10.*

Grus. *Gesn. Avi. pag. 528. hujus icon minimè accurata pag. 529.*

Gesn. icon. Avi. pag. 19, in qua eadem icon.

Schwenck. Avi. Sil. pag. 284.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 324. hujus icon satis accurata pag. 329.

Jonst. Avi. pag. 114. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 54.

Willugh. Ornith. pag. 200. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLVIII.

Raj. Syn. Avi. pag. 95. N^o. A. 1.

Charlet. Exer. pag. 114. N^o. I.

Charlet. Onomazt. pag. 110. N^o. I.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.

Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 281.

Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 383.

Marfil. Danub. Tom. V. pag. 6. hujus icon satis accurata Tab. I.

Prosper. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 55. sp. 1.

Moehr. Avi. Gen. 79.

Grus nostras. *Klein. Avi. pag. 121. N^o. 1.*

Grue. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 187; avec une mauvaise figure pag. 188.*

Bel. Portr. d'Ois. pag. 41 b, dans laquelle est la même figure.

Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 172.

Alb. Tom. II. pag. 41; avec une figure mal coloriée Pl. 65.

Les Grecs l'appellent Γερανός. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. Raj.*

Charlet. Marfil. Γερανός. Jonst. Κλαρος. Gesn. Schwenck.

Les Polyrrhéniens , Σέρτις. *Jonst.*

Les Toscans , Συρίσις. *Jonst.*

Les Portugais , EMA. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols , GRULLA. *Gesn. Aldrov. GRUZ. Aldrov.*

Les Catalans , GRUA ; GABILAN. *Barr.*

Les Italiens , GRU ; GRUA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands , KRAN. *Gesn. Aldrov. Schwenck. KRANE; KRANCH. Gesn.*

Aldrov. KRANICH. Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Ils appellent le jeune

JUNGER KRANICH. Schwenck.

Les Flamands , KRANE. *Aldrov.*

Les Suisses , KRVE. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, GERZAB. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, ZORAW. *Gesn. Aldrov. Rzac.*

Les Suédois, TRANA. *Linn.*

Les Anglois, CRANE. *Gesn. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la *Cigogne brune*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces deux lignes de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces six lignes; son pied huit pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes; & celui de derrière dix lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a cinq pieds huit pouces de vol; & lorsque ses ailes sont pliées, leurs grandes plumes s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure du dessus de la tête est garnie de petites plumes noires, qui ressemblent à des poils. Le derrière de la

Ciconia fusca paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices & lineas binas longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata tres pollices & sex lineas; pes octo pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis; posterior autem decem cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & octo pollicum; alis verò complicatis, extremitates majorum remigum caudam extremam attingunt. Capitis superioris pars anterior nigris obsita est plumulis

lis pilorum æmulis. Caput posterius sive occipitium cute obtegitur rubrâ, quibusdam pariter plumulis nigris, pilorum æmulis, sed rarissimis, oblitâ. Infra occipitium macula extat triangularis saturatissimè cinerea, supra collum superius per duorum pollicum longitudinem producta. Genæ ponè oculos, & colli superior pars sunt candidæ. Spatium rostrum inter & oculum, genas infra oculos, guttur, columque inferius & ad latera tingit color cinereus saturatissimus. Partem colli corpori finitimam, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ eleganter cineræ. Inferiores caudæ tectrices, pennæ alas subtus obtegentes, scapularisque concolores. Superiores caudæ tectrices cinereo tinguntur nonnihil saturatio-re. Tectrices alarum superiores minimæ, sicut & mediæ, eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur: majores corpori finitimæ sunt in latere exteriore concolores, in interiore nigricantes: majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha eodem imbuta colore. Remiges alarum

Tom. V.

tête ou l'occiput est couvert d'une peau rouge, garnie de même de quelques petites plumes noires, en forme de poils; mais très-clair-semées. Au-dessous de l'occiput est une tache triangulaire d'un cendré très-foncé, qui s'étend sur le dessus du col dans la longueur de deux pouces. Les joues derrière les yeux, & la partie supérieure du col sont blanches. L'espace contenu entre le bec & l'œil, les joues au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col sont d'un cendré très-foncé. La partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre; le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un joli cendré. Les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré un peu plus foncé. Les plus petites & les moyennes du dessus des ailes sont du même cendré que le dos: les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur: les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aile bâtarde est

Bbb

de cette dernière couleur. Les plumes de l'aile sont pareillement noires; il faut cependant en excepter quelques-unes des moyennes, sçavoir les plus proches du corps, qui sont d'un joli cendré du côté extérieur, & noires du côté intérieur & à leur bout. Elles se terminent en pointe; & de celles-là les quatre plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'à cinq pouces au-delà du bout de la queue. La queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; & de là jusqu'à leur extrémité elles sont noirâtres. Le bec est d'un noir-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Elle se nourrit de grains. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

similiter nigræ; ex istis tamen excipiendæ sunt minores quædam, corpori scilicet viciniore, in latere exteriori eleganter cineræ, in latere interiori & apice nigræ. Quæ remiges in acumen desinunt; ex istis autem quatuor corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, ad quinque pollicum distantiam ultra caudam extremam protrahuntur. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipsarum exortu versus duas tertias longitudinis partes usque saturatè cineræ, indeque ad extremitatem nigricantes. Rostrum ex nigro viridescit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Granis victitat. *Ex museo Realmuriano.*

7. LA GRUE DES INDES ORIENTALES.

Ciconia cinerea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite & collo supremo rubris, capite pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; vertice & maculis ad aures nudis, candidis; remigibus majoribus nigris; rectricibus cinereis . . . **GRUS ORIENTALIS INDICA.**

Ardea capite nudo collarique papilloso, corpore cinereo, remigibus nigris. *Antigone. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 6.*
Grus Indica major. Klein. Avi. pag. 121. N^o. 5.

Grande Grue des Indes. *Edwards. Tom. I. pag. XLV ; avec une figure exacte Pl. 45.*

Les Anglois l'appellent GREATER INDIAN CRANE. *Edwards.*

Magnitudine & crassitie præcedentem paululum antecellit ; & proportionem servatâ , rostro longiori donatur. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Capitis verticem obtegit cutis candida, plumis penitus nudata. In utroque capitis latere macula extat similiter candida, plumis quoque destituta, & versùs aures posita. Reliquum caput, guttur & partem colli supremam obvestit cutis rubra : quæ cutis in toto basis rostri ambitu, sub gutture & capitis posteriore parte plumulis obsita est rarissimis nigris, pilorum æmulis ; pars autem colli suprema plumis penitus nudatur. Reliquam colli longitudinem cooperiunt pennæ albæ, gradatim versùs ipsarum extremitatem procedendo, magis magisque cinerascetes. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ teatrices sunt eleganter cineræ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ teatrices & pennæ alas subtus obtegentes eodem imbuuntur

Elle est un peu plus grande & plus grosse que la précédente ; & à proportionnellement le bec plus long. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est couvert d'une peau blanche, entièrement dépourvue de plumes. De chaque côté de la tête est une tache de la même couleur, pareillement dépourvue de plumes, & placée vers les oreilles. Le reste de la tête, la gorge & le haut du col sont couverts d'une peau rouge : cette peau est garnie tout autour de la base du bec, sous la gorge & à la partie postérieure de la tête de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés, tandis que le haut du col reste entièrement nud. Le reste de la longueur du col est couvert de plumes blanches, qui par degrés deviennent cendrées vers leur extrémité. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un joli cendré. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes

les & les côtés sont de la même couleur, mais plus claire. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont cendrées. De ces dernières, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est rougeâtre. Le bec est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles blancs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On la trouve dans les *Indes Orientales*.

colore, sed dilutior. Remiges alarum majores sunt nigrae: minores cinerea. Ex minoribus autem corpori viciniores longae sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda constat. Oculorum irides rubescentes. Rostrum flavo-viridescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò candidi. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum usque articulum productâ. Habitat in *India Orientali*.

8. LA GRUE DU MEXIQUE.

Ciconia cinerea; capite superiore rubro, pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; remigibus majoribus nigris; rectricibus cinereis GRUS MEXICANA.

Grus Indica. Willugh. *Ornith. pag. 201.*

Raj. Syn. Avi. pag. 95. N^o. 2.

Grus Indica Willughbeji. *Klein. Avi. pag. 121. N^o. 2.*

Toquil coyotl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 44. Cap. CXLVIII.*

Les Mexiquains l'appellent TOQUIL-COYOTL : & quelques-uns, COCEAYAUHQUI. *Fern.*

Eile n'est pas tout-à-fait si grande ni si grosse que la nôtre; mais elle a le bec plus long. Magnitudine & crassitie paululùm *Grui nostrati* cedit; sed rostro longiori do-

natur. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt; cauda autem valdè brevis est. Partem capitis superiorem obtegit cutis rubra, rugosa, plumulis rarissimis nigris, pilorum æmulis, obsita. Reliquum caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ cineræ. Scapulares, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores idem tingit color. Remiges alarum majores sunt nigrae: minores cineræ. Ex minoribus autem corpori finitimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim retrices cineræ. Oculorum irides luteæ. Cujus coloris sint rostrum, pedesque, prorsus me latet. Habitat in *Mexico.*

Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue; qui est très-courte. La partie supérieure de la tête est couverte d'une peau rouge, raboteuse, & garnie de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés. Le reste de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes cendrées. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aile sont noires: les moyennes sont cendrées. De ces dernières, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est jaune. J'ignore quelle est la couleur du bec & des pieds. On la trouve au *Mexique.*

9. LA GRUE DU JAPON.

Ciconia alba; capite superiore rubro, pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; collo inferiore & remigibus majoribus nigris; retrices candidis . . . GRUS JAPONENSIS.

Grus Japonensis. *Jonst. Avi. pag. 116. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 54.*

Charlet. Exer. pag. 114. N°. 2.

Charlet. Onomazt. pag. 110. N^o. 2.

Grus Japonensis alia. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 365. hujus icon non satis accurata pag. 364.

Grus Japonensis Charletoni. Klein. Avi. pag. 121. N^o. 4.

Elle ressemble assez à la nôtre par sa forme & sa grandeur. La partie supérieure de sa tête est couverte d'une peau rouge, garnie de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés. La partie inférieure du col est noire. Le dessus du col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aile sont noires : les moyennes sont blanches. De ces dernières, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd obscur. On la trouve au Japon.

Formâ & magnitudine cum *Grue nostrate* satis benè convenit. Partem capitis superiorem obtegit cutis rubra, raris plumulis nigris, pilorum æmulis obsita. Collum inferius nigrum est. Partem colli superiorem, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Scapulares, alas superne & infernè cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Remiges alarum majores nigro tinguntur colore : minores sunt candidæ. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda conflatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque sunt obscurè virides. Habitat in *Japonensi* Regno.

10. LA GRUE D'AMÉRIQUE

Ciconia alba ; capite superiore pennis nigris, pilorum æmulis, in occipite raris, obliquo, vertice nigro, occipitio & taniâ

infra oculos rubris; maculâ triangulari infra occipitium nigra; marginibus alarum pallidè roseis; remigibus majoribus nigris; rectricibus candidis GRUS AMERICANA.

Ardea vertice temporibusque nudis papillofis, fronte nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo. Grus Americana. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 5.*

Grande Grue de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXII; avec une figure exacte Pl. 132.*

Grue blanche de l'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag. 75; avec une figure exacte de la tête & du col Pl. 75.*

Les Anglois l'appellent HOOPING CRANE. *Catesb. HOOPING-CRANE FROM HUDSON'S-BAY. Edwards.*

Gruem nostratam magnitudine & crassitie multum antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pedes duos pollices & sex lineas explet, & ad extremos unguis quinque pedes duos pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & septem lineas longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & octo lineas; pes decem pollices cum tribus lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum linea unica: laterales paulò sunt breviores; posticus autem pollicis unius longitudinem non multum excedit. Trium digitorum anticorum medius

Elle est beaucoup plus grande & plus grosse que la nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces sept lignes de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces huit lignes; son pied dix pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces une ligne: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière n'a guères plus d'un pouce de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane,

qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte d'une peau rouge, laquelle est entièrement garnie, sur le devant de la tête & de chaque côté entre le bec & l'œil, de petites plumes noires en forme de poils, si épaisses que la peau rouge ne paroît point du tout : au contraire sur l'occiput la peau rouge est très-apparente, & il n'y a que fort peu de ces plumes noires en forme de poils clair-semés. De chaque côté de la tête s'étend une bande d'une peau rouge, garnie de même de quelques poils noirs clair-semés; laquelle bande part des coins de la bouche, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusque vers le col, en se terminant en pointe. Au-dessous de l'occiput est une grande tache triangulaire noire. Les côtés de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessous des aîles sont de la même couleur. Les petites plumes qui couvrent le bord de l'aîle, depuis son origine jusque vers le pli qui répond à celui du poignet, sont

cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput superius obtegit cutis rubra, in parte capitis anteriore & utrinque rostrum inter & oculum plumulis penitus obsita nigris, pilorum æmulis, & ita densis ut cutis rubra nullomodo sit conspicua: contra verò in occipitio cutis rubra valdè apparet, rarissimisque plumulis nigris; pilorum æmulis, obsita est. In utroque capitis latere tænia protenditur cute rubrâ conflata, raris quibusdam pilis nigris similiter obsita; quæ tænia ab oris angulis orta, & infra oculos ducta, versùs collum usque protenditur; & in acumen desinit. Infra occipitium majuscula extat macula triangularis nigra. Caput ad latera, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ albæ. Scapulares, caudam superne & infernè cooperientes, alarumque tectrices inferiores eodem colore tinguntur. Plumulæ alarum margines; ab ipsarum exortu versùs articulum carpo humano respondentem usque, cooperientes sunt pallidè roseæ. Superiores

res alarum rectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, candidæ : majores à corpore remotiores nigræ. Pennæ nigræ, pennæque candidæ alam notham variegant. Remiges novem primores sunt nigræ : decima in latere exteriori concolor, in interiori alba : reliquæ omnes penitus albicant. Corpori viciniore sunt valdè flexibiles, longæ & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Rostrum ex fusco flavicat, obscurius tamen in medio quàm in utraque extremitate. Utriusque mandibulæ extremitas, ferræ instar, dentata est, idque per spatium circiter sesquipollicis. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in variis *Americæ Septentrionalis* regionibus.

d'un couleur de rose pâle. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aile bâtarde est variée de plumes noires & de plumes blanches. Les neuf premières plumes de l'aile sont noires : la dixième est de la même couleur du côté extérieur, & blanche du côté intérieur : toutes les autres sont entièrement blanches. Les plus proches du corps sont très-flexibles, longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un brun-jaunâtre, plus obscur dans le milieu qu'aux deux extrémités. Le bout des deux mandibules est dentelé comme une scie dans l'espace d'environ un pouce & demi. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve en différens endroits de l'*Amérique Septentrionale*.

II. LA GRUE DE LA BAYE DE HUDSON.

Ciconia superne rufescens, marginibus pennarum fuscis, infernè cinereo-rufescens; vertice rubescente, pennis nigris, pilorum æmulis, obsito; genis & gutture candidis; occipite,

collo & uropygio cinereis; tæniâ transversâ in alis cinereo-
 - albâ; remigibus majoribus fusco-nigricantibus, scapis albis;
 reſtrictibus saturatè cinereis GRUS FRET
 HUDSONIS.

Ardea syncipite nudo papilloſo, corpore cinereo, alis extus teſtaceis.

Ardea Canadenſis. *Linn. Syſth. Nat. ed. 10. Gen. 76. ſp. 3.*

Grue brune & cendrée. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIII; avec une
 figure exacte Pl. 133.*

Les Anglois l'appellent BROWN AND ASH-COLOUR'D CRANE. Edwards.

Elle eſt beaucoup moins
 groſſe que la précédente. Sa
 longueur depuis le bout du bec
 juſqu'à celui de la queue eſt
 d'environ deux pieds huit pou-
 ces ſix lignes, & juſqu'à celui
 des ongles de trois pieds deux
 pouces neuf lignes. Son bec de-
 puis ſa pointe juſqu'aux coins
 de la bouche a trois pouces
 neuf lignes de long; ſa queue
 environ ſix pouces; la partie
 de ſes jambes qui eſt dégarnie
 de plumes, deux pouces neuf
 lignes; ſon pied ſix pouces ſix
 lignes; celui du milieu des trois
 doigts antérieurs, joint avec
 l'ongle, trois pouces: les la-
 téraux ſont un peu plus courts;
 & celui de derrière n'a guères
 que neuf lignes de longueur.
 Celui du milieu des trois doigts
 antérieurs eſt réuni avec le doigt
 extérieur par une membrane,
 qui s'étend juſqu'à la première
 articulation. Ses ailes, lorſ-
 qu'elles ſont pliées, s'étendent
 un peu au-delà de la moitié de

Præcedenti multum craſ-
 ſitie cedit. Ipius longitudo
 ab apice roſtri ad caudam
 extremam duos pedes octo
 pollices & ſex circiter lineas
 æquat, & ad extremos un-
 gues tres pedes duos pollices
 & novem lineas. Roſtrum ab
 ipſius apice ad oris angulos
 uſque tres pollices & novem
 lineas longum eſt; cauda ſex
 circiter pollices; pars cru-
 rum plumis denudata, duos
 pollices cum novem lineis;
 pes ſex pollices & totidem
 lineas; trium digitorum an-
 ticorum medius cum ungue
 tres pollices: laterales paulò
 ſunt breviores; poſticus au-
 tem novem linearum longi-
 tudinem non multum exce-
 dit. Trium digitorum anti-
 corum medius digito extimo
 membranâ, ad primum uſque
 articulum productâ, coadu-
 natur. Alæ complicatæ non-
 nihil ultra mediam caudæ
 longitudinem extenduntur.

Summum caput obtegit cutis rubescens, raris quibusdam plumulis nigris, pilorum æmulis, obsita. Genæ & guttur albicant. Caput superius sive occipitium, columque cinereo tinguntur colore. Dorsi pars suprema peninis vestitur rufescentibus, fusco marginatis. Dorsum inferum & uropygium sunt cinerea. Pennæ caudam superne cooperientes, inferioresque alarum tectrices concolores. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera ex cinereo rufescunt; qui color cinereo - rufescens, versùs tectrices caudæ inferiores procedendo, magis magisque fit dilutior; inferiores autem caudæ tectrices sunt candicantes. Pennæ scapulares, superiores alarum tectrices minimæ & mediæ rufescentes, fusco fimbriatæ: superiores alarum tectrices majores à corpore remotiores fusco-nigricantes: majores corpori viciniore cinereo-albæ, unde fit in utraque ala tænia transversa concolor. Remiges alarum majores ex fusco nigricant, & scapo donantur candido: minores rufescunt. Ex minoribus autem corpori finitimæ sunt valde flexibiles, longæ & in acu-

la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert d'une peau rougeâtre, garnie de quelques petites plumes noires, en forme de poils clairsemés. Les joues & la gorge sont blanches. Le derriere de la tête ou l'occiput, & le col sont cendrés. La partie supérieure du dos est couverte de plumes rouffâtres, bordées de brun. La partie inférieure du dos & le croupion sont cendrés. Les couvertures du dessus de la queue & celles du dessous des ailes sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un cendré-rouffâtre; cette couleur devient de plus en plus claire en approchant des couvertures du dessous de la queue, qui sont blanchâtres. Les plumes scapulaires, les petites & les moyennes couvertures du dessus des ailes sont rouffâtres, & bordées de brun: les grandes couvertures du dessus des ailes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre: les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-blanc; ce qui forme sur chaque aile une bande transversale de cette couleur. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre, & ont leur tige blanche: les moyennes sont rouffâtres. De

ces dernières, les plus proches du corps sont très - flexibles, longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, bien au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé. Le bec est noirâtre, excepté le bout du demi-bec inférieur, qui est d'un couleur de chair pâle. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve en été à la *Baye de Hudson*.

men desinentes, & dum ala complicatur, non parùm ultra majorum remigum extremitates protenduntur. Duodecim rectricibus saturatè cinereis cauda constat. Rostrum nigricat; attamen mandibulæ inferioris extremitas pallidè carneo colore tingitur. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Æstate in *Freto Hudsonis* habitat.

** 12. LA GRUE DE NUMIDIE, APPELLÉE VULGAIREMENT
DEMOISELLE DE NUMIDIE.

Ciconia cinereo-cœrulescens; vertice dilutè cinereo; capite & collo supremo nigris; fasciculis pennarum candidis, ab utriusque oculi angulo ortis, retrorsum pendulis; pennis longis nigris in collo inferiore deorsum dependentibus; remigibus majoribus, rectricibusque apice nigricantibus . . .
GRUS NUMIDICA VIRGO NUMIDICA VULGO DICTA.

Ardea superciliis albis, retrorsum longè cristatis. Virgo. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 2.

Grus Numidix. Klein. Avi. pag. 121. N°. 6.

Otus plumbeus. Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXVII.

Scops. Moehr. Avi. Gen. 84.

Demoitelle de Numidie. Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 35 avec une figure passable Pl. 35.

Edwards. Tom. III. pag. CXXXIV; avec une figure exacte Pl. 134.

Grue de Numidie. Alb. Tom. III. pag. 35; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 83.

Les Grecs l'appellent Αἰθωνοῦς. Hist. de l'Acad.

Les Anglois, NUMIDIAN CRANE. Alb. DEMOISELLE OF NUMIDIA. Edwards.

Crassitie *Grui vulgari* cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes totidem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis tres pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda decem pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices; pes septem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices cum linea una, intimus duos pollices & tres lineas; posticus autem novem tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ quartam longitudinis caudæ partem non multum excedunt. Vertex capitis cinereo diluto tingitur. Reliquum caput, guttur & collum supremum nigra sunt. Colli infima pars superius & ad latera, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera

Elle n'est pas si grosse que la *Grue ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds trois pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds six pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue dix pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces; son pied sept pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces une ligne, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derrière neuf lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a quatre pieds neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà du quart de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est d'un cendré-clair. Le reste de la tête, la gorge & le haut du col sont noirs. Le bas du col dans sa partie supérieure & sur les côtés, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & le haut des jambes sont couverts de plumes d'un joli cendré-bleu. Les sca-


pulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. De l'angle extérieur de chacun des yeux part un petit faisceau de plumes blanches, longues de trois pouces six lignes, très-flexibles, qui pendent en arrière, & flottent au moindre mouvement de tête que se donne l'Oiseau. Le bas de la partie inférieure du col est couvert de plumes noires, longues, se terminant en pointe, très-flexibles, dont quelques-unes ont jusqu'à neuf pouces de longueur, & pendent sur la poitrine. Les grandes plumes de l'aile sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est noirâtre: les moyennes sont d'un joli cendré-bleu. De ces dernières, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, jusqu'à l'extrémité des plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-bleu, terminées de noirâtre. L'iris des yeux est d'un rouge vif. Le bec est verdâtre à son origine, jaune vers le milieu de sa longueur, & rouge à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les

& crurum pars suprema pennis vestiuntur eleganter cinereo-cœrulescentibus. Scapulares, quæ alas superne & infernè obtegunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores eodem imbuuntur colore. Ab utriusque oculi exteriori angulo fasciculus oritur pennis conflatus candidis, trium pollicum & sex linearum longitudinem obtinentibus, valdè flexibilibus, retrorsum dependentibus, & minimo capitis hujus Avis motu fluctuantibus. Colli inferioris infima pars pennis obsita est nigris, longis, in acumen desinentibus, valdè flexibilibus, quarum quædam novem pollicum longitudine pollent, & pectori incumbunt. Remiges alarum majores sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque cinereæ, à medietate ad apicem nigricantes: minores eleganter cinereo-cœrulescentes. Ex minoribus autem corpori viciniore longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-cœrulescentes, apice tamen nigricantes. Oculorum irides coccineæ. Rostrum in exortu



brune.





Echelle de 12. Pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Cigogne brune.



1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



anche.





Echelle de 6. Pouces.


Desiné et Gravé par Martinet.

Cigogne blanche.









Desiné et Gravé par Mâtinet.

Grue.



viridescens, versùs mediam longitudinem luteum, in extremitate rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Habitat in Numidia. Ex museo Realmuriano.

ongles sont noirs. On la trouve en Numidie. Du cabinet de M. de Reaumur.

LXXXI.

Genus Ardeæ.

Hujus character est
 Digni quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plumis denudata:
 Rostrum crassum, longum, rectum, acutum:
 Mandibula superior fulco longitudinali utrinque exarata.

In omnibus hujus generis Avibus trium digitorum anticorum medii unguis interiorius est, ferræ instar, dentatus. Mandibulæ binæ sunt similiter in utroque latere versùs ipsarum extremitatem nonnihil denticulatæ; & mandibulæ superioris apex est utrinque paululùm emarginatus. Omnes corpore dominantur lateraliter compresso.

LXXXI.

Le genre du Héron.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
 La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
 Le bec gros, long, droit & pointu:
 Une rainure longitudinale de chaque côté sur la mandibule supérieure.

Tous les Oiseaux de ce genre ont l'ongle de celui du milieu des trois doigts antérieurs intérieurement dentelé comme une scie. Il ont aussi les deux mandibules un peu dentelées de chaque côté vers leur extrémité; & le bout de la mandibule supérieure a de chaque côté une petite échancrure. Ils ont tous le corps applati par les côtés.

** I. LE HÉRON.

Voyez Pl. XXXIV.

Ardea superne cinerea , infèrè alba ; medio vertice cinereo-nigricante ; occipitio nigro ; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris vario ; pectore & ventre supremo maculis longitudinalibus cinereo-nigricantibus variegatis ; rectricibus cinereis , versùs apicem fusciscentibus ; rostro superius flavo - viridescente , infèrè flavicante , apice nigricante ; pedibus virefcentibus ARDEA.

Ardea occipite crista pendula , dorso cœrulescente , subtus albida , pectore maculis oblongis nigris. Ardea cinerea. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 10.*

Ardea. *Gesn. Avi. pag. 207.*

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 365.

Mus. Worm. pag. 306.

Moehr. Avi. Gen. 81.

Ardea subcœrulea. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 223.*

Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 364.

Ardea pulla , sive cinerea. *Gesn. Avi. pag. 211. hujus icon non satis accurata pag. 212.*

Ardea , vel Ardeola pulla vel cinerea. *Gesn. icon. Avi. pag. 117 , in qua eadem icon.*

Ardea pella , pulla , cinerea , *Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 122. N° 1.*

Ardea cinerea. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 271.*

Ardea cinerea major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 377. hujus icon non satis accurata pag. 378.*

Jonst. Avi. pag. 103. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 50.

Charlet. Exer. pag. 109. N° 1.

Charlet. Onomast. pag. 103. N° 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 8. hujus icon satis accurata Tab. 2.

Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 364.

Ardea cinerea major *Jonstoni. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 5.*

Ardea cinerea cristata. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 55. sp. 3.*

Ardea cristâ dependente. *Faun. Suec. Linn. N° 133.*

Pella *Aristoteli. Gesn.*

Héron. *Bel. Portr. d'Ois. pag. 42 a , dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Héron

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 393

Héron ordinaire. *Alb. Tom. III. pag. 32 ; avec une figure mal coloriée Pl. 78.*

Héron cendré. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 189 ; avec une figure peu exacte pag. 190.*

Les Hébreux l'appellent SCHALACH. *Gesn.*

Les Chaldéens, SCHALENUNA. *Gesn.*

Les Arabes, BABGACH. *Gesn.*

Les Perses, AUKOH. *Gesn.*

Les Grecs, Ερωδιος. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet. Πηλός. Bel. Aldrov. Schwenck. Worm.*

Les Turcs, BALAKZEL. *Gesn. Aldrov.*

Les Portugais, GARZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, GARZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, AGRO ; CAPU D'AIGUA ; BERNARD PISCAIRA. *Barr.*

Les Italiens, AIRON ; ANGHIRON. *Bel. Gesn. Aldrov. AIRON NEGRO. Aldrov.*

Les Savoyards, AIRON ou HEYRON. *Gesn. Aldrov.*

Les Suisses, REIGEL. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*

Les Allemands, REIGER. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. REIHER. Gesn. Aldrov. Schwenck. RAYER ; HEER-GANSS. Gesn. Aldrov. HERR-GANSS. Schwenck.*

Les Silésiens, REGER ; BLAWER REGER ; ASCHENFARBENER REGER. *Schwenck.*

Les Hollandois, REIGHER. *Aldrov.*

Les Flamands, RIEGHER. *Gesn. Aldrov. BLAUWER REIGEL ; GRAUWER REIGEL. Gesn. Aldrov. GRAUER REIGEL. Schwenck.*

Les Frisons, RARG. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, CZIEPIE. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, CZAPLA. *Rzac. ZORAW. Gesn. Aldrov.*

Les Suédois, HAEGER. *Linn.*

Les Anglois, HERON. *Gesn. COMMON HERON. Charlet. Sibbald. Alb. ASH-COLOURED HERON. Charlet.*

Grui fusca crassitie cedit.
Ipsius longitudo ab apice
rostri ad caudam extremam
duos pedes & decem polli-
ces explet, & ad extremos
ungues tres pedes totidem
pollices & novem lineas.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos quinque pollices
Tom. V.

Il n'est pas si gros que la
Grue brune. Sa longueur depuis
le bout du bec jusqu'à celui de
la queue est de deux pieds dix
pouces, & jusqu'à celui des
ongles de trois pieds trois pou-
ces neuf lignes. Son bec depuis
sa pointe jusqu'aux coins de la
bouche a cinq pouces cinq lig-
D d d

nes de long ; sa queue six pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , trois pouces trois lignes ; son pied cinq pouces six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , trois pouces huit lignes , l'extérieur trois pouces , l'intérieur deux pouces dix lignes ; & celui de derrière un pouce onze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane , qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a cinq pieds un pouce de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Le milieu du dessus de la tête , depuis le bec jusque vers l'occiput , est d'un cendré-noirâtre. L'occiput est noir. Le reste du dessus de la tête , la partie supérieure & les côtés du col sont d'un cendré clair. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont d'un cendré beaucoup plus foncé. La partie inférieure du dos , le croupion , les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un cendré un peu plus clair , mais moins que celui du dessus du col. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes , & couvert seulement

& totidem lineas longum est ; cauda sex pollices & octo lineas ; pars crurum plumis denudata tres pollices cum totidem lineis ; pes quinque pollices & sex lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum octo lineis , extimus tres pollices & decem lineas ; posticus autem unum pollicem & undecim lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo coadunatur membranâ ad primum usque articulum productâ. Alis expansis , extremitates majorum remigum quinque pedum & pollicis unius intervallo distant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Medius vertex , à rostro scilicet versus occipitium usque , ex cinereo nigricat. Occipitium nigrum est. Reliquum caput superius , collumque superius & ad latera sunt dilutè cinerea. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ cinereo quidem tinguntur colore , sed multò saturatiore. Dorsum infimum , uropygium , superiores caudæ rectrices & latera tingit color cinereus nonnihil dilutior , minùs tamen quàm in collo superiore

Dilutus. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute flavo-videscens obtegitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, inferioresque caudæ tectrices candore nitent. Secundum colli inferioris longitudinem pennæ in medio positæ sunt in latere interiore nigrae : quæ sequuntur, idque secundum eandem directionem versus infimum ventrem usque, interius ex cinereo nigricant ; unde fit à guttore versus imum ventrem usque tænia longitudinalis per totam colli longitudinem nigra, & in medio pectore, medioque ventre supremo cinereo-nigricans. Crurum suprema pars extrorsum grisea, introrsum candida. Pennæ alas subtus obtegentes cinereæ. Margines alarum ad articulum carpo humano respondentem, rufescunt, dein in reliqua longitudine albicant. Superiores alarum tectrices minores eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur : majores corpori viciniores sunt cinereæ quidem, sed paulò dilutiùs : majores à corpore remotiores nigrae. Ala notha similiter nigra. Vi-

d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Tout le long de la partie inférieure du col les plumes du rang du milieu ont leur côté intérieur noir : celles qui suivent la même direction jusque vers le bas-ventre, ont leur côté intérieur d'un cendré-noirâtre ; ce qui forme depuis la gorge jusque vers le bas-ventre une bande longitudinale, qui est noire dans toute la longueur du col, & d'un cendré-noirâtre sur le milieu de la poitrine & du haut du ventre. Le haut des jambes est gris en-dehors & blanc en-dedans. Les couvertures du dessous des ailes sont cendrées. Le bord de l'aile, précisément sur le pli qui répond à celui du poignet, est rouffâtre ; ensuite il est blanc dans le reste de sa longueur. Les petites couvertures du dessus des ailes sont du même cendré que celui du dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré un peu plus clair : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aile bâtarde est de cette dernière couleur. L'aile est composée de vingt-sept plumes : les vingt premières sont noirâtres : les trois suivantes

sont d'un cendré-noirâtre d'autant plus foncé, que la plume est plus éloignée du corps : & les quatre plus proches du corps sont cendrées. Ces dernières sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré qui brunit un peu vers le bout de chaque plume. Le demi-bec supérieur est d'un jaune-verdâtre, excepté son bout, qui est noirâtre ; l'inférieur est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres & les ongles noirâtres. Il se tient sur les bords des lacs & des rivières, & se nourrit de *Poissons*, de *Grenouilles*, &c. Il fait son nid dans les grands arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ginti septem remigibus ala conflatur : viginti primores nigricant : tres proximè sequentes sunt cinereo-nigricantes, idque eò saturatiùs, quò remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ cineræ. Quæ novissimè dictæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cineræ, versùs ipsarum apicem paululùm fuscescentes. Mandibula superior est flavo-viridescens, attamen in apice nigricans ; inferior flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridescentes ; ungues verò nigricantes. Lacuum & fluminum ripas frequentat, & *Piscibus*, *Ranis*, &c. vicitat. In excelsis arboribus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

** 2. LE HÉRON HUPÉ.

Voyez Pl. XXXV.

Ardea cristata, superne cinerea, infernè alba ; medio vertice candido ; vertice ad latera, & cristâ nigris ; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris vario ; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis & longissimis ; taniâ transversâ in summo pectore nigrâ ; fasciâ utrinque longitudinali in pectore & ventre nigrâ ; rectricibus cinereis ; rostro fusco-flavicante ; pedibus viridescensibus . . . ARDEA CRISTATA,

Ardea cinerea major. Willugh. *Ornith. pag. 203. hujus icon non satis accurata Tab. XLIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 98. N^o. A. I.

Alia Ardeæ species. Gesn. *icon. Avi. pag. 117, in qua capitis & colli icon non satis accurata.*

Alia quædam Ardea. Gesn. *Avi. pag. 219. capitis & colli eadem icon pag. 220.*

Alia quædam Ardea ex Ornithologo. Aldrov. *Avi. Tom. III. pag. 383.*

Ardea. Jonst. *Avi. hujus icon non satis accurata Tab. 52.*

Héron. Alb. *Tom. I. pag. 59; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 67.*

Les Grecs l'appellent. Ερωδιός Raj.

Les Anglois, COMMON HERON. Willugh. Raj. CRESTED HERON. Alb.

Crassitie præcedentem paululum antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tres pedes & sesquipollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices cum undecim lineis; pes quinque pollices & decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum novem lineis, extimus tres pollices & totidem lineas, intimus duos pollices & decem lineas, posticus autem viginti quinque lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds sept pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue six pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces onze lignes; son pied cinq pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces dix lignes; & celui de derrière vingt-cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a cinq pieds quatre pouces de vol;

& ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le synciput est couvert de plumes blanches, dont quelques-unes sont fort longues, & qui, étant couchées les unes sur les autres, couvrent le milieu du sommet de la tête, & s'étendent jusqu'à l'occiput. Le dessus de la tête est couvert de plumes d'un beau noir, dont quelques-unes sont fort longues & fort étroites, & forment une belle hupe, qui retombe en arriere. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un gris-blanc. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un très-joli cendré : quelques-unes des plumes scapulaires, sçavoir les supérieures, sont très-longues & très-étroites : les inférieures sont fort larges, & marquées de petites lignes transversales noirâtres, peu apparentes. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dé garni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un verd-jaunâtre. Les joues & la gorge sont blanches. La partie inférieure du col est de la même couleur, & marquée de chaque côté d'un rang de taches longitudinales noires, placées sur le côté intérieur de cha-

articulum usque protensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quinque pedum & quatuor pollicum ; alæ verò complicatæ caudam extrema attingunt. Synciput vestiunt pennæ candidæ, quarum quædam sunt longissimæ, quæque, aliæ aliis incumbentes, medium verticem cooperiunt, & ad occipitium usque protenduntur. Caput superius obtegunt pennæ splendidè nigræ, quarum quædam longissimæ sunt & strictissimæ, elegantemque cristam, retrorsum propendentem, efficiunt. Collum superius & ad latera ex cinereo albicat. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt eleganter cineræ. Ex scapularibus quædam, superiores scilicet, longissimæ sunt & strictissimæ : inferiores verò maximâ latitudine pollentes, & lineolis transversis nigricantibus, non multum conspicuis, insignitæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute viridi-flavicante tectum. Genæ & guttur albescent. Pars colli inferior similiter albicat, & utrinque macularum

longitudinalium nigrarum in latere interiore cujusque pennæ collocatarum, serie insignitur. Pennæ colli inferioris partem infimam cooperientes longissimæ sunt & strictissimæ, pectusque ferè univèrsim obtegunt : pennæ autem istæ pleræque sunt cinereo-albæ. In summo pectore lata extat tænia transversa splendide nigra, utrinque versùs dorsum usque producta. Reliquum pectus & venter albicant, & in utroque latere fasciâ longitudinali splendide nigrâ donantur : quæ fasciæ binæ à suprâ dictâ tænia transversa nigra oriuntur, & in imo ventre inter se connectuntur. Crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt candidæ. Pennæ alas subtus & latera obtegentes cinereo tinguntur colore. Margines alarum ab articulo carpo humano respondente ad ipsarum extremitates usque albæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, cinereæ : majores à corpore remotiores nigrae. Ala notha similiter nigra. Alam componunt viginti octo remiges, omnes subtus cinereæ ; superne verò majores sunt nigrae : proximè sequentes ci-

que plume. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont très-longues & très-étroites, & couvrent presque toute la poitrine : la plûpart de ces plumes sont d'un gris-blanc. Sur le haut de la poitrine est une large bande transversale d'un beau noir, qui s'étend de chaque côté jusque vers le dos. Le reste de la poitrine & le ventre sont blancs, & bordés de chaque côté d'une bande longitudinale d'un beau noir : ces bandes partent toutes deux de la bande transversale noire, dont nous avons parlé ci-dessus, & vont se réunir au bas-ventre. Le haut des jambes est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont cendrés. Le bord de l'aîle est blanc depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à son extrémité. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont cendrées : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est de cette dernière couleur. L'aîle est composée de vingt-huit plumes, toutes cendrées en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont noires : les suivantes sont d'un cendré-noirâtre d'autant plus

foncé, que la plume est plus éloignée du corps : les six plus proches du corps sont cendrées. Ces dernières plumes sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est d'un jaune-roussâtre : les paupières sont d'un verd-jaunâtre. Le bec est d'un brun-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles noirs. Il se tient sur les bords des lacs & des rivières, & se nourrit de *Poissons*, de *Grenouilles*, &c. Il fait son nid sur le sommet des grands arbres : ses œufs sont d'un bleu pâle & verdâtre. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

nereo-nigricantes, idque eò saturatius, quò remix fit à corpore remotior : sex corpori viciniore cinerea. Quæ nuper descriptæ remiges sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda constat. Oculorum irides flavo-rufescentes : palpebræ viridi-flavicanes. Rostrum ex fusco flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridescentes ; ungues verò nigri. Juxta lacuum & fluviorum ripas versatur, & *Piscibus, Ranis*, &c. victitat. In excelsarum arborum cacuminibus nidificat : ova ponit pallidè cœruleo-viridescencia. *Ex museo Realmuriano.*

** 3. LE HÉRON HUPÉ DE CAYENNE.

Ardea cristata, dilutè cinerea ; capite superiore in medio cinereo, ad latera nigro ; cristâ cinereâ ; collo albo, inferiùs maculis longitudinalibus nigro-cinereis vario ; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis longissimis candidis ; rectricibus dilutè cinereis ; rostro flavo-virescente ; pedibus cinereis *ARDEA CAYANENSIS CRISTATA.*

Ardea-Brasiliensis Cocoi dicta Marcgravio. Willugh. Ornith. pag. 209. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.

Raj. Syn. Avi. pag. 100. N°. 15.

Cocoi Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 209. hujus icon non satis accurata pag. 210.

Jonst.

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 401

Jonst. Avi. pag. 143, hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.

Cocoi secundus. Pifon. Hist. Nat. pag. 89, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Heron bleu. Alb. Tom. III. pag. 32; avec une figure mal coloriée Pl. 79.

Second Crabier. Du Terre. Hist. des Antil. Tom. II. pag. 273; avec une figure peu exacte pag. 246. N^o. 13.

Les Anglois l'appellent BLEW HERON. Alb.

Les Brasiliens, COCOI. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & pollicem unum explet, & ad extremos ungues tres pedes decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & novem lineas longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices cum totidem lineis, intimus duos pollices & decem lineas; posticus autem duos pollices cum linea unica. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & pollicis unius intervallo distant; alæ verò com-

Tom. V.

Il est à peu près de la longueur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds dix pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces neuf lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarée de plumes, quatre pouces; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces dix lignes; & celui de derrière deux pouces une ligne. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a cinq pieds un pouce de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est cendré. Les côtés du

E e e

dessus de la tête sont noirs. Les plumes qui couvrent l'occiput, sont cendrées, très-longues, très-étroites, & forment une jolie hupe : quelques-unes ont jusqu'à cinq pouces six lignes de long, & pendent en arrière sur le col. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau cendrée. Les joues, la gorge & le col sont d'un beau blanc : la partie inférieure du col est marquée de chaque côté d'un rang de taches longitudinales d'un cendré-noir, placées sur le côté intérieur de chaque plume. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes très-longues, très-étroites, très-flexibles & d'un beau blanc. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un joli cendré clair. Les scapulaires supérieures sont très-longues, très-étroites & flexibles. Les plumes de l'aile sont du même cendré que celui du reste du corps. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile.

plicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Summum caput cinereum est. Caput superius ad latera nigrum. Pennæ occipitium obtegentes cineræ sunt, longissimæ, strictissimæ, elegantemque cristam efformant : ex illis quædam quinque pollicum & sex linearum longitudinem obtinent, & retrorsum supra collum propendent. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute cinereâ obductum. Genæ, guttur & collum albore nitent : pars colli inferior utrinque macularum longitudinalium cinereo-nigrantium, in latere interiore cujuslibet pennæ collocatarum, ferie insignitur. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longissimis, strictissimis, valdè flexibilibus & candidis. Dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera, scapulares pennas, alas superne & inferne vestientes, rectricesque caudæ superiores & inferiores tingit color dilutè cinereus elegans. Scapulares superiores longissimæ sunt, strictissimæ & valdè flexibiles. Remiges alarum eodem imbuuntur cinereo ac reliquum corp

pus ipsum tingitur. Corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cineræ. Oculorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum ex flavo virescit. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinerei; ungues verò fusci. Habitat in *Brazilia & Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missa à *D. Artur.*

La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair. L'iris des yeux est de couleur d'or. Le bec est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont cendrés; & les ongles bruns. On le trouve au *Bresil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

4. LE HÉRON CENDRÉ.

Ardea cinerea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; collo inferiore & pectore albis, maculis longitudinalibus nigris variegatis; rectricibus cinereis. . . . ARDEA CINEREA,

Ardea minor alia rostro arcuato. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 402, in qua hujus icon non satis accurata.*

Ardea minor alia rostro arcuato *Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 207. Raj. Syn. Avi. pag. 100. N°. 10.*

Ardea rostro maximè arcuato. *Jonst. Avi. pag. 104.*

Hæc est *Ardeæ* species minor. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ rectrices sunt saturatè cineræ. Ventrem, latera, crurum partem supremam, inferiores caudæ rectrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color

Celui-ci est de la petite espèce. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont de la

même couleur, mais plus claire. La gorge est blanche. La partie inférieure du col & la poitrine sont de la même couleur, & variées de taches longitudinales noires. Les plumes de l'aîle sont cendrées. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

cinereus quidem, sed dilutior. Guttur albicat. Collum inferius & pectus similiter albert, maculisque longitudinalibus nigris variegantur. Remiges alarum sunt cinereæ. Corpori viciniore maxillam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Cujus coloris sint rostrum, pedesque; prorsus me latet. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

5. LE HÉRON CENDRÉ DU MEXIQUE.

Ardea cristata, cinerea; fronte albo & nigro varia; capite superiore & cristâ purpurascens; alis albo, cinereo & cyaneo variis; rectricibus cinereis; rostro nigro; pedibus fusco, nigro & flavescens variegatis.... ARDEA MEXICANA CINEREA.

Xoxouqui-hoactli. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 40. cap. CXXXVI.*

Xoxouhqui-hoactli. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 14. cap. VI.*

Xoxouhqui-hoactli, Hoacton, seu *Ardea cinerea minor Mexicana cristata*. *Raj. Syn. Avi. pag. 102. N°. 21.*

Les Mexiquains l'appellent XOXOUQUI-HOACTLI ou XOXOUHQUI-HOACTLI, *Fern.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longi-

tudo ab apice rostri ad extremos ungues duos pedes & tres circiter pollices æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem pollices longum est; pes, simul cum digitis, novem pollices. Capitis pars anterior sive frons albo & nigro promiscuè variegatur. Reliquum caput superius est purpureum. In capitis vertice septem extant pennæ similiter purpureæ, cristam efficientes. Guttur, collum; dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, rectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes cinerentinguntur colore. Margines alarum, ad articulum carpo humano respondentem, al-
 bent. Superiores alarum rectrices, sicut & remiges, cinereo & cyaneo variegantur. Remiges corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè per-
 tingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conflatur. Rostrum nigrum. Pedes fusco, nigro & flavescente variegati. Trium digitorum anteriorum medius digito extimo membranâ, ad primum

depuis le bout du bec jusqu'à celui des ongles est d'environ deux pieds trois pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept pouces de long; son pied, joint avec les doigts, neuf pouces. Le devant de la tête ou le front est varié confusément de blanc & de noir. Tout le reste du dessus de la tête est pourpre. Sur le sommet de la tête sont sept plumes de la même couleur, qui forment une hupe. La gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont cendrés. Le bord de l'aîle, sur le pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les couvertures du dessus des aîles, ainsi que les plumes de l'aîle, sont variées de cendré & de bleu. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. Le bec est noir. Les pieds sont variés de brun, de noir & de jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt

extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve dans les marais du *Mexique*.

usque articulum protensâ, coadunatur. In paludibus *Mexicanis* habitat.

6. LE HÉRON CENDRÉ D'AMÉRIQUE.

Ardea superne dilutè cinerea, infernè alba; remigibus partim nigris, partim candidis; rectricibus dilutè cinereis; rostro cyaneo, apice nigro; pedibus cœruleis. . . . ARDEA AMERICANA CINEREA.

Héron ou *Calidris leucophæa*. *Feuillee. Journ. des Obs. phys. pag 287. (ed. 1725).*

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un bleu d'azur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessus des ailes sont du même cendré que celui du dos, & mêlées de quelques plumes noires. Les plumes de l'aile sont en partie noires

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt dilutè cinereæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute cyaneâ obductum. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Superiores alarum rectrices eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur, quibusdam tamen pennis nigris interfertis. Remiges sunt partim nigræ partim candidæ. Corpori fini-

timæ majorem obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cinereæ. Rostrum cyaneum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque cœrulei; ungues verò nigri. Trium digitorum anteriorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum protensâ. Habitat in *America*.

& en partie blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair. Le bec est d'un bleu d'azur, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bleus; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Amérique*.

7. LE HÉRON DE LA BAYE DE HUDSON.

Ardea cristata, superne cinereo-fufcescens, infernè alba; collo inferiore & pectore maculis longitudinalibus nigris, rufescente mixtis, variis; capite superiore & cristâ nigris; collo superiore fusco, colore saturatiore transversim striato; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis longissimis; rectricibus fuscis; rostro superius nigro, infernè aurantio; pedibus nigricantibus. . . . ARDEA Freti HUDSONIS.

Héron cendré de l'Amérique Septentrionale. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXV*; avec une figure exacte *Pl. 135*.

Les Anglois l'appellent *ASH-COLOUR'D HERON FROM NORTH-AMERICA*. *Edwards.*

Ardeam cristatam nostram crassitie paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam ex-

Il est un peu plus gros que notre Héron hupé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ

trois pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds onze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces sept lignes & demie de long; sa queue environ quatre pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, deux pouces neuf lignes; son pied six pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces onze lignes, l'extérieur quatre pouces deux lignes, l'intérieur quatre pouces; & celui de derrière deux pouces dix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes noires, dont quelques-unes ont quatre pouces de longueur, & forment une belle huppe. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dé-garni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge & les côtés de la tête sont blancs. La partie supérieure du col est brune, & rayée transversalement d'une

tremam tres pedes duos pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos un-gues tres pedes undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & septem cum semi lineas longum est; cauda quatuor pollices & novem circiter lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices & novem lineas; pes sex pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & undecim lineas, extimus quatuor pollices cum lineis binis, intimus quatuor pollices; posticus autem duos pollices & decem lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ nigræ, quarum quædam quatuor pollicum longitudine pollent, elegantemque cristam efficiunt. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute flavo-viridescente obducitur. Caput ad latera, gut-turque

turque albicant. Pars colli superior fusca est, coloreque saturatiore transversim striata. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices ex cinereo fuscescunt. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ candidæ, majusculis maculis longitudinalibus nigris, rufescente mixtis, insignitæ. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longissimis, strictissimis, pectori incumbentibus. Venter & tectrices caudæ inferiores albicant. Crurum suprema pars rufescit. Pennæ alas subtus cooperientes, sicut & latera, sunt cinereo-cœrulescentes. Margines alarum, ab ipsarum exortu ad articulum carpo humano respondentem usque, vestiunt plumulæ fuscæ, rufescente fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorsi instar, cinereo imbuuntur colore, attamen nonnihil dilutiore : majores à corpore remotiores sunt fuscæ, cinereo-fuscescente marginatæ. Remiges alarum minores concolores : majores penitus fuscæ. Remiges corpori viciniores maximam obtinent

Tom. V,

couleur plus foncée. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brunâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes blanches, marquées de grandes taches longitudinales noires, mêlées de rouffâtre. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent sur la poitrine. Le ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le haut des jambes est rouffâtre. Les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont d'un cendré-bleuâtre. Le bord de l'aîle, depuis son origine jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de rouffâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même cendré que le dos, mais un peu plus clair : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes, & bordées de cendré-brunâtre. Les moyennes plumes de l'aîle sont de la même couleur : les grandes sont tout-à-fait brunes. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée,

F ff

presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes brunes. Le demi-bec supérieur est noir; l'inférieur est orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes est jaunâtre. Les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices fuscæ. Mandibula superior nigra, inferior aurantia. Pars crurum plumis denudata flavicat. Pedes, unguisque nigricant. Habitat in *Fretto Hudsonis*.

8. LE HÉRON TACHETÉ.

Ardea superne cinereo-fuscescens, maculis rufis varia, infernè cinereo-alba; pectore maculis rufis, albis & nigris asperso; remigibus apice albis; rectricibus cinereo-fuscescentibus; rostro roseo; pedibus virescentibus . . . ARDEA NÆVIA.

Ardeæ cinereæ tertium genus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 383. hujus icon non satis accurata pag. 382.

Ardeæ cinereæ tertium genus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 204. Raj. Syn. Avi. pag. 98. N^o. 2.

Ardeæ cinereæ congener. Jonst. Avi. pag. 103.

Il est presqu'aussi gros que le *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied environ cinq pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs,

Ad *Ardeæ vulgaris* crassitiem accedit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & novem pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque quatuor pollices longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes quinque circiter pollices; trium digitorum anticorum medius cum

lingue tres pollices : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Caput , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , quæ alas superne cooperiunt , superioresque caudæ testrices sunt cinereo-fuscescentes , quilibet tamen penna maculâ rufâ terminata. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur , & cute nudâ solummodo obtegitur. Guttur , pars colli inferior , venter , latera , inferioresque caudæ testrices ex cinereo albicant. Pectus eodem imbuatur colore , sed in tota superficie maculis aspergitur , aliis rufis , aliis albis , nigris alteris. Crurum suprema pars ex cinereo-albo paululùm ad rufescentem inclinât colorem. Remiges alarum ex cinereo fuscescunt , & unaquæque maculâ terminatur candidâ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem , & dum ala

joint avec l'ongle , trois pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane , qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent , jusqu'au bout de la queue. La tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires , les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré-brunâtre , chaque plume étant terminée par une tache rousse. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes , & couvert seulement d'une peau nue. La gorge , la partie inférieure du col , le ventre , les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-blanc. La poitrine est de la même couleur , & toute parsemée de taches , les unes rousses , les autres blanches & les autres noires. Le haut des jambes est d'un gris-blanc tirant un peu sur le roussâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un cendré-brunâtre , & terminées chacune par une tache blanche. Les plus proches du corps sont fort lon-

gues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brunâtre. La prunelle des yeux est noire : leur iris est jaune. Le bec est de couleur de rose. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, & les pieds sont verdâtres. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rec-tricibus cinereo - fuscescentibus cauda conflat. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides luteæ. Rostrum roseo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedesque virentes. Habitat in *Italia* circa *Bonomiam*.

** 9. LE HÉRON GRIS.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 1.

Ardea superne griseo-fusca, infernè alba, griseo mixta; vertice fusco; taniâ supra oculos albido & fusco variâ; gutture albo; collo inferiore griseo, pennis taniâ longitudinali fulvescente in medio notatis; uropygio cinereo-albo; rec-tricibus griseo-cinereis, lateralibus albo in apice marginatis : rostro superius & apice nigro, infernè fusco; pedibus griseo-fuscis. ARDEA GRISEA.

Il n'est guères plus gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces sept lignes de long; sa queue quatre pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, neuf lignes;

Crassitie *Cornicem* non multum excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos un-gues unum pedem decem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & septem lineas longum est; cauda quatuor pollices cum lineis binis; pars cru-

rum plumis denudata novem lineas; pes duos pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & undecim lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus viginti quinque lineas; posticus autem unum pollicem & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum unius pollicis & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput superius fuscum est: ex pennis tamen occipitium obtegentibus quædam viridi-aureo colore variant. Collum superius & ad latera vestiunt pennæ griseæ, taniâ ad fulvum vergente & secundùm scapi longitudinem ductâ notatæ. Dorli suprema pars & scapulares pennæ minores sunt griseo-fuscæ. Majores pennæ scapulares griseo-cinereæ. Dorsum inferum, uropygium, superiores caudæ rectrices & latera ex cinereo albescent. In utroque capitis latere tania ex-

son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces onze lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur vingt-cinq lignes; & celui de derrière un pouce huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a trois pieds un pouce quatre lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est brune: quelques-unes des plumes de l'occiput sont changeantes en une couleur de verd-doré. La partie supérieure & les côtés du col sont couverts de plumes grises, marquées chacune d'une bande tirant sur le fauve, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. La partie supérieure du dos & les petites plumes scapulaires sont d'un gris-brun. Les grandes plumes scapulaires sont d'un gris-cendré. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un gris-blanc. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, variée de brun & de blanchâtre, qui

s'étend depuis les narines jusqu'au-dessus des yeux. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau blanchâtre. Les joues sont variées de blanc & de brun. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes, qui sont d'un blanc tirant sur le fauve dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur les deux côtés. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes assez longues, qui couvrent une partie de la poitrine, & sont tout-à-fait blanches. La poitrine & le haut du ventre sont d'un blanc mêlé de gris. Le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sans aucun mélange d'autre couleur. Le haut des jambes est garni extérieurement de plumes blanches dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur les côtés; & il est couvert intérieurement de plumes tout-à-fait blanches. Les petites couvertures du dessous des ailes sont grises, & marquées chacune d'une bande blanche, qui s'étend selon la longueur de leur tige: les grandes sont d'un gris-blanc & terminées de blanc: de ces dernières, les

tat longitudinalis fusco & candicante varia, à naribus supra oculos usque protensa. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute albidâ tantummodo tegitur. Genæ albo & fusco variegantur. Guttur albicat. Partem colli inferiorem obtinent pennæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem albo-fulvescentes, in utroque latere griseæ. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longiusculis, pectus partim obtegentibus, & penitus candidis. Pectus & venter supremus albet, & aliquid grisei admixtum habent. Venter imus, inferioresque caudæ tectrices albicant, nullo altero colore admixto. Crurum partem supremam exterius vestiunt pennæ in medio secundum ipsarum scapi longitudinem albæ, ad latera griseæ; interioribus verò illam cooperiunt pennæ penitus candidæ. Inferiores alarum tectrices minores sunt griseæ, taniâ candidâ, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, insignitæ: majores cinereo-albæ, albo terminatæ: ex majoribus autem corpori finitimæ marginibus exterioribus

ribus candidis quoque præditæ sunt. Superiores alarum rectrices minimæ ex griseo fuscescunt, & taniâ albo-fulvescente, secundum ipsarum scapi longitudinem ductâ, notantur : minores sunt griseæ : majores ex griseo cinereæ, maculâ candidâ terminatæ. Alam notham componunt pennæ rectricibus alarum majoribus superioribus concolores, & insuper exteriùs albo fimbriatæ. Vingt-quatre remigibus griseo-cinereis ala constat : octodecim primores (decimâ tamen exceptâ) maculâ albâ in apice præditæ sunt : sex reliquæ, à decima nona scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, sunt immaculatæ. Quæ sex novissimè dictæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala completur, majorum remigum extremitates attingunt. Duo-decim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt griseo-cinereæ : laterales omnes eodem imbutæ colore, & insuper albo in apice marginatæ : quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò rectrix fit exterior. Mandibula superior nigra, attamen ad latera candicans : inferior fusca, exceptâ ex-

plus proches du corps sont aussi bordées extérieurement de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un gris-brun, & ont chacune une bande d'un blanc-fauve, qui s'étend selon la longueur de leur tige : les moyennes sont grises : les plus grandes sont d'un gris-cendré, & terminées par une tache blanche. Les plumes de l'aile bâtarde sont de la même couleur que ces dernières couvertures ; & de plus bordées extérieurement de blanc. L'aile est composée de vingt-quatre plumes d'un gris-cendré : les dix-huit premières (si l'on en excepte la dixième) sont terminées chacune par une tache blanche : les six autres, sçavoir depuis la dix-neuvième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement, sont sans taches. Ces six dernières sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-cendré : toutes les latérales sont de la même couleur, & de plus bordées de blanc par le bout : cette bordure est d'autant plus large que la plume est plus extérieure. Le demi-bec supérieur est noir, excepté sur ses côtés, où il est

blanchâtre : l'inférieure est brun ,
excepté son extrémité , qui est
noire. La partie des jambes qui
est dégarnie de plumes , les
pieds & les ongles sont d'un
gris-brun. On le trouve sur les
bords des rivières & des étangs.
Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.

tremitate nigrâ. Pars cru-
rum plumis denudata, pe-
des, unguisque griseo-fus-
ci. Fluviorum & stagnorum
ripas frequentat. *Ex museo
D. Aubry.*

10. LE HÉRON HUPÉ DE VIRGINIE.

Ardea cristata, fusca; collo inferiore & pectore rufescenti-
bus, maculis longitudinalibus fuscis variis; remigibus ni-
gris; rectricibus fuscis; rostro superne & inferne fusco, ad
latera fusco-flavicante; pedibus fuscis *ARDEA
VIRGINIANA CRISTATA.*

Ardea occipite cristato, dorso cinereo, femoribus rufis, pectore ma-
culis oblongis nigris. *Herodias. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76.
sp. II.*

Ardea cristata maxima Americana. Klein. Avi. pag. 125. N°. 14.

Grand Héron hupé. *Catesb. append. pag. 10; avec une assez bonne figure
de la tête & du col. Pl. 10. fig. 1.*

Les Anglois l'appellent *LARGEST CRESTED HERON. Catesb.*

Il est plus grand & plus gros
que toutes les autres espèces de
Heron connues. Sa longueur
depuis le bout du bec jusqu'à
celui des ongles est de plus de
cinq pieds. Son bec depuis sa
pointe jusqu'aux coins de la
bouche a près de huit pouces
de long. La tête est couverte de
plumes brunes : celles qui par-
tent de l'occiput, sont étroites
& fort longues, quelques-unes
ayant jusqu'à cinq pouces de
longueur, & forment une belle

Omnium Ardearum hacten-
us cognitarum hæc est maxi-
ma & crassissima species. Ip-
sius longitudo ab apice ros-
tri ad extremos ungues quin-
que pedes & amplius explet.
Rostrum ab ipsius apice ad
oris angulos usque octo ferè
pollices longum est. Caput
obtegunt pennæ fusæ : quæ
ab occipite oriuntur, stric-
tissima sunt & longissima ;
quædam enim quinque pol-
licum longitudinem obti-
nent

ñent, elegantem efformant cristam, quam Avis ad libitum erigere aut contrahere potest. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute obtegitur fusco-flavicante. Guttur & pars colli superior rufescunt. Collum inferius & pectus eodem imbuuntur colore, maculis longitudinalibus fuscis vario. Dorsum, uropygium, scapulares pennas, ventrem, latera, crurum partem supremam, rectrices caudæ superiores & inferiores, & pennas alas superne & inferne cooperientes fuscus tingit color. Remiges alarum sunt nigrae. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda constat. Rostrum superne & inferne fuscum, ad latera verò fusco-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusci. Trium digitorum anticorum medius cum extremo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Virginia*, ibique lacuum & fluviorum ripas frequentat,

hupe, que l'Oiseau peut redresser ou abaisser à volonté. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarني de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un brun-jaunâtre. La gorge & la partie supérieure du col sont roussâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont de la même couleur, & variées de taches longitudinales brunes. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des ailes, & les côtés sont bruns. Les plumes de l'aile sont noires. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes brunes. Le bec est brun en-dessus & en-dessous, & d'un brun-jaunâtre sur ses côtés. La partie des jambes qui est dégarني de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Virginie*, où il se tient sur les bords des lacs & des rivières, & se nourrit de

Poiffons , de Grenouilles , de & Piscibus , Ranis , Laceratis , &c. vicitat.
Lézars , &c.

II. LE HÉRON HUPÉ DU MEXIQUE.

Ardea cristata, superne (nigro-virescens , mas) (fusca , albo varia , fœmina) , infernè alba , (fusco variegata , fœmina) ; vertice & cristâ nigris ; taniâ ab oculo ad oculum , & collo candidis ; alis superne cinereo-virescentibus ; rectricibus cinereis ; rostro superne & infernè nigro , ad latera flavescente ; pedibus dilutè flavis . . . ARDEA MEXICANA CRISTATA.

Avis sicca. *Euf. Nieremb. pag. 222. (Mas.)*

Avis sicca , Hoactli , seu Tobactli. *Willugh. Ornith pag. 300. (Mas).*

Hoactli , seu *Avis sicca*. *Raj. Syn. Avi. pag. 179. N^o. 8. (Mas).*

Hoactli , seu Tobactli , id est , *Avis sicca*. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 26. cap. LIII. (Mas).*

Jonst. Avi. pag. 128. (Mas).

Hoacton. *Euf. Nieremb. pag. 225. (Fœmina).*

Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 13. cap. I. (Fœmina).

Willugh. Ornith. pag. 302. (Fœmina).

Les Espagnols du Mexique appellent le mâle MARTINETE PESCADOR. *Fern. Willugh.*

Les Mexiquains , le mâle , HOACTLI ; TOBACTLI ; & la femelle , HOACTON. *Nieremb. Fern. Willugh. & quelques-uns XOXOUHQUI-HOACTLI. Nieremb. Fern.*

Il est de la grosseur d'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds trois pouces , & jusqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long ; sa queue environ six pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , son pied & celui du mi-

Cum Gallina crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes & tres pollices æquat , & ad extremos unguis duos pedes & novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices longum est ; cauda sex circiter pollices ; pars crurum plumis denudata , pes , triumque digito-

rum anticorum medius cum ungue, simul commensurati, unum pedem. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Capitis verticem obtegunt pennæ nigræ, quarum quædam maximâ longitudine pollent, elegantemque cristam efficiunt. Caput anterius cingit tænia candida, ab oculo ad oculum producta. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute flavicante coopertum. Guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ caudam subtus obtegentes, inferioresque alarum tectrices albicant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex nigro splendidè virescunt. Tectrices alarum superiores sunt cineræ, & aliquid viridis admixtum habent. Remiges cineræ. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cineræ. Oculi magni sunt &

lieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, le tout pris ensemble, un pied. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Le sommet de la tête est couvert de plumes noires, dont quelques-unes sont fort longues, & forment une belle hupe. Le devant de la tête est entouré d'une bande blanche, qui s'étend d'un oeil à l'autre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-verd assez brillant. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré sur lequel est une légère teinte de verd. Les plumes de l'aîle sont cendrées. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. Les yeux sont

grands & noirs : leur iris est jaune ; & les paupieres sont rouges. Le bec est noir dessus & dessous , & jaunâtre sur ses côtés. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes , & les pieds sont d'un jaune clair.

La femelle diffère du mâle en ce que le dessus de son corps est d'un brun varié de blanc , & le dessous d'un blanc varié de brun. Du reste elle lui ressemble assez bien. Elle fait son nid , & élève ses Petits dans les roseaux.

On les trouve au *Mexique* , où ils se tiennent sur les bords des lacs , & se nourrissent de *Poissons*.

nigri : ipsorum irides luteæ ; palpebræ verò rubræ. Rostrum superne & infernè nigrum , ad latera verò flavescens. Pars crurum plumis denudata , pedesque sunt dilutè flavi.

Famina à mare discrepat corpore superiore fusco , albo variegato , & corpore inferiore albo , fusco vario. In reliquis cum illo satis benè convenit. In arundinetis nidificat , & Sobolem educat.

Habitant in *Mexico* , ibique lacuum ripas frequentant , & *Piscibus* victitant.

12. LE HÉRON POURPRÉ.

Ardea superne castaneo-purpurea , infernè cinerascens ; vertice cinereo-nigricante ; collo superne cinereo , lineolis nigricantibus vario , collo inferiore & pectore maculis obscure flavis aspersis ; reatricibus castaneo-purpureis ; rostro superius flavo-viridescente , in exortu & infernè flavicante ; pedibus griseo-fuscis ARDEA PURPURASCENS.

Ardea cinerea flavescens , nova species. *Marfil. Danub. Tom. V. pag. 20. hujus icon minùs accurata Tab. 8.*

Ardea cinerea flavescens , nova species , *Marfilli. Klein. Avi. pag. 124. N° 12.*

Il est à peu près de la grandeur & de la grosseur du *Héron ordinaire* ; mais il a la tête plus grosse , & le bec plus allongé. Le sommet de la tête est d'un cendré-noirâtre, La partie su-

Magnitudine & crassitie cum *Ardea vulgari* circiter convenit ; capite tamen crassiori & rostro magis elongato donatur. Vertex capitis ex cinereo nigricat. Pars colli su-

perior cinereo tingitur colore, lineolis nigricantibus vario. Collum inferius & pectus sunt quoque cinerea, maculis obscurè flavis elegantè aspersa. Spatium rostrum inter & oculum utriusque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavescente coopertum. Dorsum, uropygium, scapulares pennas, superioresque caudæ tectrices tingit color castaneo-purpureus. Venter, crurum suprema pars & latera cinereo imbuuntur; qui color, versus anum ventrem procedendo, magis magisque fit dilutior. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt quoque dilutè cineræ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur: majores à corpore remotiores sunt fusco-nigricantes. Remiges alarum ex fusco similiter nigricant. Corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus castaneo purpureis cauda conflatur. Mandibula superior in exortu flavicans, in reliqua longi-

périeure du col est d'un cendré varié de petites lignes noirâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont pareillement cendrées, & joliment parsemées de taches d'un jaune obscur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont cendrés: cette couleur devient de plus en plus claire, en approchant vers le bas-ventre. Les couvertures du dessous de la queue sont de même d'un cendré clair. Les petites du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. Les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré. Le demi-bec supérieur est jaunâtre à son origine, & d'un jaune-verdâtre dans le reste

de sa longueur; le demi-bec inférieur est entièrement jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

tudine flavo-viridescens; mandibula inferior penitus flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque griseo-fusci. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Juxta *Danubii* ripas versatur.

13. LE HÉRON POURPRÉ DU MEXIQUE.

Ardea castaneo-purpurea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; capite dilutè spadiceo, vertice nigro; remigibus saturatè spadiceis; rectricibus castaneo-purpureis . . . ARDEA MEXICANA PURPURASCENS.

Ardea Mexicana; seu *Avis Xoxouquihaactli*. *Seb. Vol. I. pag. 100.*
hujus icon non satis accurata Tab. LXIV. fig. 2.
Crex. Moehr. Avi. Gen. 82.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pou-

Cornicem crassitie circiter æmulatur. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem circiter explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pol-

lices & totidem lineas, extimus unum pollicem & decem cum semi lineas, intimus unum pollicem cum novem lineis; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertinent. Vertex capitis nigro tingitur colore. Reliquum caput est dilutè spadiceum. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute nudâ obtegitur. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt castaneo-purpureæ. Guttur, collum inferius, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes idem tingit color, sed dilutior. Remiges alarum sunt saturatè spadiceæ. Corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cas-

ces deux lignes, l'extérieur un pouce dix lignes & demie, l'intérieur un pouce neuf lignes; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est noir. Le reste de la tête est d'un rouge-bai clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau nue. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont de la même couleur, mais plus claire. Les plumes de l'aile sont d'un rouge-bai foncé. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un marron-

pourpré. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve au *Mexique*.

taneo-purpureæ. Cujus coloris sint rostrum & pedes, profus me latet. Habitat in *Mexico*.

** 14. LE HÉRON POURPRÉ HUPÉ.

Voyez *Pl. XXXVI. Fig. 2.*

Ardea cristata, superne obscure olivacea, inferne castaneo-purpurascens; vertice & cristâ splendide nigris; collo supremo rufo, triplici taniâ nigrâ notato; colli inferioris imâ parte maculis longitudinalibus nigris variâ; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis & longissimis; fasciâ longitudinali à pectore ad anum nigrâ; rectricibus saturatè cinereis, superne ad olivaceum, inferne ad cœrulescentem colorem vergentibus; rostro superius dilutè fusco, inferne flavicante, apice nigricante; pedibus virescentibus . . .

ARDEA CRISTATA PURPURASCENS.

Il est beaucoup moins gros que le *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces huit lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue cinq pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces cinq lignes; son pied quatre pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces sept lig-

Ardeæ vulgari multum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguis tres pedes quatuor pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda quinque pollices cum lineis binis; pars crurum plumis denudata duos pollices & quinque lineas; pes quatuor pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius, cum ungue, quatuor pollices

&

& septem lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & quatuor lineas; posticus autem duos pollices & octo lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extimo digito connectitur membrana ad primum articulum usque producta. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & sesquipollicis intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem usque protenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ splendide nigræ: quæ capitis verticem cooperiunt, longæ sunt & strictissimæ, elegantemque cristam efficiunt: ex illis autem pennis binæ quatuor pollicum & novem linearum longitudinem obtinent. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute obducitur flavicante. In utroque capitis latere exigua extat tænia nigra, ab oris angulis orta, & ad occipitium usque obliquè producta. Guttur albicat. Collum ab ipsius exortu, idque caput versùs, ad mediam longitudinem usque rufum, tribus notatum tæniis longi-

nes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes; & celui de derriere deux pouces huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a quatre pieds un pouce six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un noir brillant: celles du sommet de la tête sont longues & très-étroites, & forment une jolie lupe: deux de ces plumes ont jusqu'à quatre pouces neuf lignes de longueur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. De chaque côté de la tête est une petite bande noire, qui part des coins de la bouche, & monte obliquement jusqu'à l'occiput. La gorge est blanche. Le col depuis son origine vers la tête jusqu'à la moitié de sa longueur est roux, & marqué de trois bandes longitudinales noires, dont une placée au milieu, qui part de l'occiput & s'étend sur la partie supérieure du col, & une autre de chaque côté, qui

part des coins de la bouche, & s'étend tout le long des côtés du col. Le reste de la longueur du col est cendré en-dessus, cette couleur tirant un peu sur l'olivâtre, roux sur les côtés, & d'un blanc-rouffâtre en-dessous : cette dernière couleur est variée de taches longitudinales noires, qui occupent le côté intérieur de chaque plume. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes très-longues & très-étroites, dont l'extrémité est d'un blanc ombré d'une légère teinte de rouffâtre. La partie supérieure du dos est d'un olivâtre sombre, mais brillant. Les plumes scapulaires sont de la même couleur ; cependant les supérieures, qui sont très-longues & très-étroites, & finissent en pointe, sont terminées de roux ; & les inférieures, qui sont assez larges, sont d'un cendré-foncé. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue, sont de cette dernière couleur. La poitrine est d'un marron-pourpré très-brillant. Le ventre est de la même couleur ; mais il est marqué d'une large bande noire, qui s'étend sur son milieu depuis la poitrine jusqu'à l'anus. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé

tudinalibus nigris, unâ scilicet in medio positâ, ab occipitio ortâ, & supra partem colli superiorem productâ, utrinque autem alterâ, ab oris angulis ortâ, & secundum colli latera protensâ. Collum in reliqua longitudine superne cinereum, cinereo colore paululum ad olivaceum vergente, ad latera rufum, infernè albo-rufescens : qui novissimus color maculis variegatur longitudinalibus nigris, cujuslibet pennæ latus interius occupantibus. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longissimis & strictissimis, in extremitate albis & aliquâ rufescentis mixturâ adumbratis. Dorsi suprema pars est obscure quidem, attamen splendide olivacea. Scapulares pennæ concolores ; superiores tamen, quæ longissimæ sunt, strictissimæ & in acumen desinentes, rufo terminantur ; inferiores vero, quæ latiusculæ, sunt saturatè cinereæ. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices similiter tingit color saturatè cinereus. Pectus splendidissimo imbuatur castaneo-purpurascens. Venter eodem tingitur colore ; latâ autem

insignitur fasciâ nigrâ , in ipsius medio à pectore ad anum usque protensâ. Pennæ caudam subtus obtegentes albescent, & aliquid rufi admixtum habent, nigroque terminantur. Crurum suprema pars est rufa. Latera ex cinereo ad violaceum inclinant, sed non ita quàm in dorso, splendide. Inferiores alarum tectrices minores ex rufo ad castaneum vergunt : majores saturatè cinerascunt. Margines alarum sunt dilutè rufæ. Superiores alarum tectrices minores sunt obscurè quidem, sed splendide olivaceæ ; qui color supra quarundam pennarum margines & quarundam aliarum extremitatem paululùm rufi admixtum habet : majores corpori finitimæ cineræ, in interiore cujuslibet pennæ latere nonnihil ad cœrulescentem inclinantes colorem : majores à corpore remotiores cinereo-nigricantes. Remiges majores ex cinereo similiter nigricant : minores sunt in latere exteriori ex cinereo ad olivaceum vergentes, in interiore saturatè cineræ ; ex istis tamen excipiendæ sunt quatuor corpori viciniores in utroque latere ex cinereo ad olivaceum inclinantes. Quæ

d'un peu de roux, & terminées de noir. Le haut des jambes est roux. Les côtés sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre, mais moins brillant que celui du dos. Les petites couvertures du dessous des ailes sont d'un roux tirant sur le marron : les grandes sont d'un cendré foncé. Le bord de l'aile est d'un roux très-clair. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un olivâtre sombre, mais brillant ; cette couleur est mêlée d'un peu de roux sur les bords de quelques plumes & sur le bout de quelques autres : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré qui tire un peu sur le bleuâtre sur le côté intérieur de chaque plume : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-noirâtre. Les grandes plumes de l'aile sont de cette dernière couleur : les moyennes sont du côté extérieur d'un cendré tirant sur l'olivâtre, & du côté intérieur d'un cendré foncé ; il faut cependant en excepter les quatre plus proches du corps, dont le cendré tire sur l'olivâtre des deux côtés. Ces quatre dernières plumes sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée ; presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La

queue est composée de douze plumes d'un cendré foncé, tirant sur l'olivâtre en-dessus & sur le bleuâtre en-dessous. Le demi-bec supérieur est d'un brun clair, excepté son bout, qui est noirâtre ; l'inférieur est jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords des rivières & des étangs, où il se nourrit de *Poissons*. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

quatuor novissimè dictæ remiges maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus saturatè cinereis, superne ad olivaceum, infernè ad cœrulescentem colorem vergentibus. Mandibula superior dilutè fusca, attamen in extremitate nigricans ; inferior flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque virefcentes ; ungues verò nigricantes. Juxta fluminum & stagnorum ripas versatur, ibique *Piscibus* victitat. *Ex museo D. de Bandeville.*

** 15. LE HÉRON BLANC.

Ardea in toto corpore alba ; spatio rostrum inter & oculos nudo viridi ; rostro croceo-flavicante ; pedibus nigris . . .
ARDEA CANDIDA.

Ardea alba tota ; capite lævi. *Faun. Suec. Linn. N^o. 132.*

Ardea capite lævi, corpore albo, rostro rubro. *Ardea alba. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 17.*

Ardea alba. *Gesn. Avi. pag. 213, in qua hujus icon non satis accurata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 389. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 390.*

Jonst. Avi. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 51.

Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 55. sp. 2.

Ardea alba ; Albardeola. *Gesn. icon. Avi. pag. 118, in qua hujus icon non satis accurata.*

Ardea alba major. *Willugh. Ornith. pag. 205, hujus icon satis accurata Tab. XLIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 99. N^o. A. 4.

- Marfil. Danub. Tom. V. pag. 12. hujus icon satis accurata Tab. 4.
 Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.
 Ardea alba major Willughbeji. Klein. Avi. pag. 122. N^o. 2.
 Ardea alba major cristâ carens. Rzac. Aut. Hist. nat. Pol. pag. 364.
 Ardea alba maxima. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 314. N^o. II. hujus
 icon non satis accurata Tab. 266.
 Ardea alba cirrata Jonstoni. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 6.
 Ardea alia alba. Charlet. Exer. pag. 109. N^o. 2.
 Charlet. Onomazt. pag. 103. N^o. 2.
 Ardea candida. Schwenck. Avi. Sil. pag. 224.
 Aztatl, seu Ardea candens. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 14. cap. V.
 Guira-tinga. Joan. de Laët. Nov. orb. pag. 575.
 Guira-tinga Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 210.
 Jonst. Avi. pag. 144.
 Raj. Syn. Avi. pag. 101. N^o. 17.
 Guira-tinga Brasiliensibus Marcgravii. Raj. Syn. Avi. pag. 189. N^o. 1.
 Guira-tinga Brasiliensibus, Garza Lusitanis, Ardeæ species Marcgravii.
 Willugh. Ornith. pag. 210.
 Quiratinga. Jonst. Avi. pag. 150.
 Héron blanc. Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 191.
 Les Grecs l'appellent Ερωδις λευκος, ou Λευκερωδιος. Gesn. Schwenck.
 Klein.
 Les Catalans, AGRO BLANC. Barr.
 Les Italiens, AIRON BIANCO. Gesn. GIRONE; GARZA BIANCHA. Gesn.
 Aldrov. GARZETTA BIANCA. Charlet.
 Les Vénitiens, AIRON BIANCO. Marfil. GARZA. Willugh. Marfil.
 Les Allemands, WYSSER REIGER. Gesn. Aldrov. WEISSER REGER;
 WEISSER REIGEL. Schwenck.
 Les Saxons, REIGER. Gesn. Aldrov.
 Les Anglois, WHITE HERON. Gesn. Aldrov. GREAT WHITE HERON.
 Willugh. Raj.
 Les Anglois de la Jamaïque, WHITE GAULDING. Browne. LARGEST
 WHITE GAULDING. Sloane. Raj.
 Les Portugais du Brésil, GARZA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.
 Les Brasiliens, GUIRA-TINGA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.
 Les Mexiquains, AZTATL. Fern.

Cum *Ardea cristata* circiter crassitie convenit. Ipsi-
 us longitudo à rostri apice ad
 caudæ extremitatem tres pe-
 des unum pollicem & sep-
 tem lineas explet, & ad

Il est à peu près de la gros-
 seur du Héron luppé. Sa lon-
 gueur depuis le bout du bec
 jusqu'à celui de la queue est de
 trois pieds un pouce sept lig-
 nes, & jusqu'à celui des on-

gles de quatre pieds deux pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces trois lignes de long; sa queue six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces cinq lignes; son pied dix pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces trois lignes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces trois lignes; & celui de derrière deux pouces six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a quatre pieds dix pouces sept lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un blanc de neige. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les plumes de l'aile sont blanches. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'é-

extremos unguis quatuor pedes duos pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices & tres lineas longum est; cauda sex pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & quinque lineas; pes decem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & tres lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & totidem lineas; posticus autem duos pollices & sex lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuor pedum decem pollicum & septem linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ niveo candore nitentes. Scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute viridi tectum;

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 431

Remiges alarum albert. Cor-
pori viciniore sunt longissi-
mæ, & dum ala complica-
tur, majorum remigum ex-
tremitates ferè pertingunt.
Duodecim rectricibus can-
didis cauda constat. Rostrum
croceo-flavicans. Pars cru-
rum plumis denudata, pe-
des, unguisque nigri. Juxta
maris littora degit. *Ex mu-
seo Realmuriano.*

tendent, lorsque l'aile est pliée,
presqu'aussi loin que les plus
grandes plumes de l'aile. La
queue est composée de douze
plumes blanches. Le bec est
d'un jaune de safran. La partie
des jambes qui est dégarnie de
plumes, les pieds & les ongles
sont noirs. On le trouve sur
les bords de la mer. *Du cabi-
net de M. de Reaumur.*

** 16. L' AIGRETTE.

Ardea cristata, in toto corpore alba; spatio rostrum inter &
oculos nudo, viridi; rostro nigro; pedibus nigro-virescen-
tibus EGRETTEA.

Ardea alba minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 389. hujus icon pessima
pag. 391.*

*Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 393. hujus icon satis accurata, si cristam
haberet, pag. 394.*

Willugh. Ornith. pag. 205.

Marfil. Danub. Tom. V. pag. 14. hujus icon accurata. Tab. 5.

Ardea alba minor, seu Garzetta Gesneri & Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi.
pag. 99. N^o. 5.*

Ardea alba minor secunda, Garzetta etiam dicta Aldrovandi. *Willugh.
Ornith. pag. 206.*

Ardea alba minor cristata. *Rzac. Auçt. Hist. nat. Pol. pag. 364.*

Ardea alba maxima. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 124.*

Ardea Americana, alba maxima Sloan. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I.
sp. 16.*

Leucorodios, seu Ardea alba minor alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 392.
hujus icon non satis accurata pag. 395.*

Garzetta. *Gesn. Avi. pag. 214.*

Garzetta Italarum. *Jonst. Avi. pag. 104.*

Charlet. Exer. pag. 110. N^o. 3.

Charlet. Onomazt. pag. 103, N^o. 3.

Garzetta bianca. *Jonst. Avi. pag. 104.*

Egretta Gallorum. *Jonst. Avi. pag. 104.*

Charlet. Exer. pag. 110. N^o. 4.

Charlet. Onomazt. pag. 103. N^o. 4.

Aigrette. *Gesn. Avi. pag. 795.*

Aigrette Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 392, in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*

Aigrette. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 195; avec une mauvaise figure pag. 196; Bel. Portr. d'Ois. pag. 43 b, dans laquelle est la même figure.*

Du Tertre. Hist. des Annil. Tom. II. pag. 277.

Les Italiens l'appellent AGROTI. *Bel. Aldrov. GARZETTA. Gesn. Aldrov, Jonst.*

Les Boulonnois, GARZETTA; GARZA BIANCA. *Aldrov.*

Les Anglois, EGRET, ou RED LEGG'D HERON; CRYALL. *Charlet.*

Elle est à peu près de la grosseur d'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds six pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces trois lignes de long; sa queue quatre pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces; son pied cinq pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce onze lignes; & celui de derrière dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a deux pieds dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jus-

Crassitie Gallinam circumter amulatur. Ipsiustudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices & tres lineas longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quatuor pollices; pes quinque pollices & sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum sex lineis, extimus duos pollices & totidem lineas, intimus unum pollicem & undecim lineas; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum decem pollicum

pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus pennis vestiuntur candidissimis. Scapulares, alas superne & infernè cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores tingit idem color. Ab occipite quædam oriuntur pennæ quinque circiter pollicum longitudinem obtinentes, strictissimæ & valdè flexibiles, elegantem cristam efficientes; unde *Egretta* nomen. Scapulares superiores sunt quoque longissimæ, strictissimæ & flexibiles. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute viridi obducitur. Remiges alarum albicant. Corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, & dum alæ complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides pallidè flavæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigro-virescentes; ungues verò nigri. Juxta maris litora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

qu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un beau blanc. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. De l'occiput partent quelques plumes longues d'environ cinq pouces, très-étroites & flexibles, qui forment une jolie aigrette; d'où l'Oiseau a tiré son nom. Les supérieures des scapulaires sont pareillement très-longues, étroites & flexibles. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dé garni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les plumes de l'aile sont blanches. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est d'un jaune pâle. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont d'un noir verdâtre; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

17. LE HÉRON BLANC DU BRÉSIL.

Ardea in toto corpore alba ; spatium rostrum inter & oculos nudo , rostroque croceis ; pedibus nigris ARDEA BRASILIENSIS CANDIDA.

Alia Ardeæ species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 220.*

Jonst. Avi. pag. 150.

Ardea nivea *Mus. Worm. pag. 307.*

Il est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds onze pouces , & jusqu'à celui des ongles de trois pieds huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long ; sa queue est de la même longueur ; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes , est longue d'environ quatre pouces ; son pied de six pouces ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , de quatre pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane , qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est cou-

Prædentem crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & undecim circiter pollices explet , & ad extremos ungues tres pedes & octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices longum est ; cauda eâdem longitudine pollet ; pars crurum plumis denudata quatuor circiter pollices longa ; pes sex pollices ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. In universo corpore pennis vestitur albis. Spatium rostrum inter &

oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute croceo colore imbutâ tectum. Remiges alarum candidæ. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum croceo colore tinctum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Habitat in *Brasilia*.

vert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau de couleur de safran. Les plumes de l'aile sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. La prunelle des yeux est noire : leur iris est de couleur d'or. Le bec est de couleur de safran. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Bresil*.

18. LE HÉRON BLANC DE LA CAROLINE.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque rubris; pedibus viridibus ARDEA CAROLINENSIS CANDIDA.

Ardea alba minor Caroliniensis. *Klein. Avi. pag. 124. N°. 10.*
 Petit Héron blanc. *Catesb. Tom. 1. pag. 77; avec une figure exacte Pl. 77.*
Les Anglois l'appellent LITTLE WHITE HERON. *Catesb.*

Cornici crassitie cedit. Ipsi-
 us longitudo ab apice rostri
 ad caudam extremam octo-
 decim circiter pollices æ-
 quat, & ad extremos un-
 gues unum pedem novem
 pollices & sex lineas. Ros-

Il n'est pas si gros qu'une *Cornelle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces six lignes. Son bec depuis sa

pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long; sa queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied deux pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derrière treize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Tout son corps est couvert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau rouge. Les plumes de l'aile sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est jaune. Le bec est rouge. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verts. On le trouve en été à *la Caroline*. Il

trum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes duos pollices cum sex lineis; trium digitorum anteriorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extremus unum pollicem cum quinque lineis, intimus sexdecim lineas; posteriorum autem tredecim lineas. Trium digitorum anteriorum medius cum extremo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Universum corpus pennis vestitur candidis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute rubrâ obtegitur. Remiges alarum albicant. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum alæ complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides luteæ. Rostrum rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque virides. Æstate habi-

tat in *Carolina*. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur, paludisque frequentat. *Piscibus, Ranis, &c.* vescitur. se tient sur les bords des rivières & des étangs, & dans les marais. Il se nourrit de *Poissons, de Grenouilles, &c.*

19. LE HÉRON BLANC DU MEXIQUE.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo luteo; rostro purpureo; pedibus pallidè purpurascens. . . . ARDEA MEXICANA CANDIDA.

Ardea Mexicana minima candidissima, Hoitzilaztatl dicta Hernandezii. Raj. Syn. Avi. pag. 102. N°. 22. Hoitzilaztatl. Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 27. cap. LXII. Les Mexiquains l'appellent HOITZILAZTATL. Fern.

Ad *Columbæ* crassitiem accedit, aut saltem eam non superat. In toto corpore peninis vestitur albis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo coopertum. Remiges alarum candidæ. Corpori finitimæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur. Rostrum purpureum. Pars crurum plumis denudata, pedesque eodem imbuti colore, sed pallidiores; ungues verò fuscii. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad pri-

Il est tout au plus de la grosseur d'un *Pigeon*. Tout son corps est couvert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dé garni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est pourpre. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont de la même couleur, mais plus pâle; les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une

membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve au *Mexique*, où il se tient sur les bords des lacs, & s'y nourrit de *Poissons*.

mum articulum usque protensa. Habitat in *Mexico*, ibique lacuum ripas frequentat, & *Piscibus* victitat.

20. LE PETIT HÉRON BLANC.

Ardea alba; vertice & pectore croceis; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque luteis; pedibus flavo-croceis....

ARDEA CANDIDA MINOR.

Ardea vertice croceo. Jonst. Avi. pag. 104.

Ardea minor alia vertice croceo. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 393. hujus icon satis accurata pag. 396.

Ardea alba minor tertia Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 206.

Raj. Syn. Avi. pag. 99. N°. 6.

Il est moins grand que l'*Aigrette*; mais il est plus gros. Le sommet de la tête est de couleur de safran. Le reste de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La poitrine est de couleur de safran, mais plus pâle que le sommet de la tête. Les plumes de l'aile sont blanches. Les plus proches du

Egretta magnitudine cedit; illam tamen crassitie superat. Vertex capitis croceo imbutur colore. Reliquum caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ albæ. Scapulares, quæ alas superne & inferne cooperiunt, rectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo cooperitum. Pectus croceo tingitur colore, sed quàm in capitis vertice pallidiore. Remiges alarum albicant. Corpori viciniore maximam ob-

tinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim reatricibus candidis cauda constat. Oculorum irides luteæ. Rostrum, quod quidem breviusculum, similiter luteum. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavo-crocei: digiti tamen, qui longissimi, fusci sunt, & annulis candidibus circumdati; ungues verò fusci. Trium digitorum anteriorum medius cum extremo digito connectitur membrana ad primum articulum usque producta. Habitat in Italia circa Bononiam.

corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est jaune. Le bec, qui est assez court, est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune de safran: cependant les doigts, qui sont fort longs, sont bruns, & entourés d'anneaux blanchâtres; les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en Italie aux environs de Bologne.

21. LE HÉRON NOIR.

Ardea nigricans; reatricibus alarum superioribus cinereo-cœrulescentibus; reatricibus nigricantibus; rostro, pedibusque nigris ARDEA NIGRA.

Ardea nigra. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 224.*

Klein. Avi. pag. 123. N° 3.

Les Allemands l'appellent SCHWARTZER REGER. *Schwenck.*

Magnitudine & crassitie *Ardeam vulgarem* æmularur. Per universum corpus pennis vestitur nigricantibus. Scapulares, alas subtus obtegentes, reatriceque caudæ superiores & inferiores sunt

Il est de la grandeur & de la grosseur du Héron ordinaire. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres. Les scapulaires, les couvertures du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont

de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dé garni de plumes, & couvert seulement d'une peau noire. Les couvertures du dessus des ailes sont d'un cendré - bleuâtre. Les plumes de l'aile sont noirâtres. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec, la partie des jambes qui est dé garnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Silésie*.

quoque nigricantes. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute nigrâ obducitur. Superiores alarum tectrices ex cinereo cœrulescunt. Remiges nigricant. Corpori viciniores longissimæ sunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membrânâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Habitat in *Silesia*.

22. LE HÉRON NOIR A COLLIER.

Ardea nigricans; collo torque albo cincto; rectricibus nigricantibus; rostro luteo, in medio & apice maculâ nigrâ superne & infernè notato; pedibus nigris ARDEA NIGRA TORQUATA.

Ardeæ congener. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 412, in qua hujus icon satis accurata.

Ardeæ congener Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 207. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.

Ardeæ congener Aldrovandi, seu nigra. Raj. Syn. Avi. pag. 102. N°. 19. Ardea nigra. Jonst. Avi. pag. 105. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 51.

Ardea nigra Aldrovandi. Charlet. Exer. pag. 110. N°. 8.

Charlet. Onomazt. pag. 104. N°. 8.

Ardea nigra Jonstoni. Barr. Ornith. Class. IV. Gen. 1. sp. 4.

Cum *Numenio* crassitie circiter convenit. Rostro donatur, proportione servatâ, quàm aliarum *Ardearum* rostrum multò breviorè. In toto corpore pennis vestitur nigricantibus. Collum tamen cingit torquis albus. Remiges alarum nigricant. Corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Rostrum luteum, binis superne & infernè notatum maculis nigris, unâ scilicet mediam versùs longitudinem positâ, alterâ in extremitate collocatâ. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Habitat in *Italia* cirçà *Bononiam*.

Il est à peu près de la grosseur du *Courly*. Son bec est proportionnellement beaucoup plus court que celui des autres *Hérons*. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres. Le col est cependant entouré d'un collier blanc. Les plumes de l'aîle sont noirâtres. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec est jaune, & marqué dessus & dessous de deux taches noires, l'une placée vers le milieu de sa longueur, & l'autre à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

** 23. LE HÉRON DU BRÉSIL.

Ardea nigricans, flavescente punctulata; capite & collo superiore fuscis, nigro punctulatis; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & fuscis vario; rectricibus nigricantibus; rostro nigro; pedibus fuscis ARDEA BRASILIENSIS.

Ardea subfusca major, collo & pectore albo undatis. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.*

Ardea sylvatica, coloris ferruginei. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 125.*

Ardea Americana, sylvatica, coloris ferruginei. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 14.*

Soco Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 199, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 135. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 58.

Soco Brasiliensibus Marcgravio. Willugh. Ornith. pag. 209. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.

Raj. Syn. Avi. pag. 100. N^o. 14.

Cocoi tertius. Pifon. Hist. Nat. pag. 90, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Les François de la Guiane l'appellent ONOURÉ DES BOIS. Barr.

Les Anglois de la Jamaïque, CLUCKING-HEN. Browne.

Les Brasiliens, Soco. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.

Il est à peu près de la longueur du *Heron pourpré hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds un pouce six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dé garnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied quatre pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes; & celui de derrière deux pouces trois lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Ardeam cristatam purpurascens crassitie circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & octo pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes & sesquipollicem. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes quatuor pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis; posticus autem duos pollices & tres lineas. Trium digitorum anticorum medius ad exti-

imum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Caput, collumque superius & ad latera fusco tinguntur colore, quem punctula nigra variegant. Guttur & collum inferius alba sunt, maculis longitudinalibus, aliis nigris, alteris fuscis, variegata. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores nigricant, & flavescunt in tota superficie punctulantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt quoque nigricantes, maculis candidis variæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores: majores à corpore remotiores nigricantes & immaculatæ. Remiges similiter nigricant. Corpori viciniores maximam longitudinem obtinent, & dum alæ complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda con-

brane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a quatre pieds de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure & les côtés du col sont d'un brun varié de petits points noirs. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de taches longitudinales, les unes noires, & les autres brunes. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noirâtre tout pointillé de jaunâtre. Les couvertures du dessous des ailes sont pareillement noirâtres, & variées de taches blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & sans taches. Les plumes de l'aile sont de cette dernière couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Les yeux sont noirs: leur iris est de couleur d'or. Le bec est

noir. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve au *Bresil* & dans la *Guiane*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

flatur. Oculi sunt nigri : ipforum irides aureo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fusci. Habitat in *Brasilia* & *Guiana*. A *Cayana*, in museum *Realmurianum* missa à *D. Artur*.

** 24. LE BUTOR.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1.

Ardea superne rufescente & nigro varia, infernè dilutè fulva; maculis longitudinalibus nigricantibus variegata; vertice nigricante; collo superne nigricante, infernè fusco transversim striato; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; uropygio fulvo, nigricante transversim striato; rectricibus binis intermediis nigricantibus, rufescente marginatis, lateralibus fulvis, maculis nigricantibus variegatis; rostro fusco, infernè viridescente; pedibus viridi-flavican-
tibus BOTAURUS.

Ardea vertice nigro; pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. *Faun. Succ. Linn. N^o. 134.*

Ardea capite læviusculo, supra testacea maculis transversis, subtrus pallidior maculis oblongis fuscis. *Ardea stellaris. Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 16.*

Ardea pallida, pennis in dorso fulvis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 2.*

Ardea Stellaris minor. Jonst. Avi. pag. 104. hujus duæ icones Tab. 50, una sub titulo, Ardea minor, non satis accurata, altera sub titulo, Ardea, ab Aldrovando mutuata.

Ardea Stellaris minor, quam Botaurum, vel Butorium Recentiores vocant. Gesn. Avi. pag. 214. hujus icon non satis accurata pag. 215.

Ardea Stellaris Plinio & Aristoreli. Gesn. icon. Avi. pag. 120, in qua hujus icon non satis accurata.

Ardea Stellaris. Schwenck. Avi. Sil. pag. 225.

Willugh. Ornith. pag. 207. hujus icon non satis accurata Tab. I: & insuper altera icon à Jonstano mutuata Tab. LII.

- Raj. Syn. Avi. pag. 100. N^o. A. 11.
 Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
 Mus. Worm. pag. 307.
 Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 55. sp. 4.
 Klein. Avi. pag. 123. N^o. 4.
 Ardea Stellaris Willughbeji. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 16. hujus icon pessima Tab. 6.
 Ardea Stellaris, Asterias. Charlet. Exer. pag. 110. N^o. 5.
 Charlet. Onomart. pag. 103. N^o. 5.
 Ardea Asterias, sive Stellaris. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 403. hujus icon non satis accurata pag. 405.
 Botaurus Ornithologis; aliis Butio; Ardea Stellaris Gesnero; Ardea palustris vel Arundinum. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 273.
 Botaurus Ornithologorum; Ardea Stellaris Gesneri; Ardea palustris vel Arundinum; Butio. Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 368.
 Taurus Plinii. Willugh.
 Grus crispa. Jonst. Avi. hujus icon satis accurata Tab. 54.
 Mos Куw. Jonst. Avi. hujus icon non satis accurata Tab. XXVII.
 Ασπίας ἐρωδίου, Arist. Klein.
 Οὐνός Aristotelis. Jonst. Raj.
 Butor. Alb. Tom. I. pag. 60; avec une figure mal coloriée Pl. 68.
 Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 192, dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.
 Butor, nommé par aucuns de nom corrompu Pittouër. Bel. Portr. d'Ois. pag. 42 b, dans laquelle est la même figure.
 Les Bretons l'appellent GALERAND. Bel. Gesn. Aldrov.
 Les Grecs, Ασπίας. Gesn. Aldrov. Ερωδίου ασπίας. Bel. Schwenck. Οὐνός. Bel. Schwenck. Aldrov.
 Les Turcs, GELVÆ. Gesn. GELVE. Aldrov.
 Les Portugais, GAZOLA. Gesn.
 Les Italiens, TRUMBOTTO. Bel. TROMBONE. Gesn. Aldrov. AIGERON. Bel. Gesn.
 Les Boulonnois, TERRABUSO ou TERRABUSA. Bel. Gesn. Aldrov.
 Les Ferrarois, TERRABUSO ou TERRABUSA. Bel. Gesn. Aldrov.
 Les Allemands, US-RIND; MEER-RIND; LOS-RIND; PICKART; RO3-TRUMM; ROS-DUMP; ROS-DUMPF; MOS; MOSS-0CHS; MOSS-KOU; MOSS-REIGEL; ROS-REIGEL. Gesn. Aldrov. MOSS-0CHSE; MOSS-KUH; MOS-REIGEL. Schwenck. MOSZ-REIGEL. Rzac. ROHR-REIGEL; ROHR-TRUMEN. Schwenck. Rzac.
 Les Bas Allemands, DOMP-HORN ou DOMPS-HORN. Gesn. Aldrov.
 Les Silésiens, ROR-DUMMEL. Gesn. Aldrov. ROHR-DRUMMEL. Schwenck. Rzac.
 Les Saxons, WASSER-0CHSZ. Gesn. Aldrov.
 Les Autrichiens, ERDBOULL. Gesn. Aldrov.

Les Bavaois, HORTYBEL. *Gefn. Aldrov.*

Les Hollandois, ROER-DRUM. *Worm. PITTOOR. Aldrov.*

Les Frifons, REI-DOMMEL; ROS-DAM. *Gefn. Aldrov.*

Les Polonois, BAK. Rzac. BUNCK. *Gefn. Aldrov.*

Les Illyriens, BUKACZ; FAUSER. *Gefn. BUBACZ; FUSER. Aldrov.*

Les Suédois, ROER-DRUM. *Linn.*

Les Anglois, BITTERN. *Willugh. Raj. Sibbald. Alb. BITTORN. Charlet, BITTOUR. Raj.*

Les Anglois Septentrionaux, MIRE-DRUM. *Willugh. Raj.*

Les Ecoſſois, BUTTOUR. *Sibbald.*

Il n'est pas ſi gros que le Héron ordinaire. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds cinq pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; ſa queue quatre pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied quatre pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces ſix lignes, l'extérieur quatre pouces trois lignes, l'intérieur trois pouces neuf lignes; & celui de derrière deux pouces dix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la première articulation. L'ongle du doigt de derrière eſt le plus grand & le plus fort de

Ardea vulgari crasſitie cedit. Ipfius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & quinque pollices æquat, & ad extremos unguis tres pedes duos pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & novem lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & ſex lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes quatuor pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & ſex lineas, extimus quatuor pollices cum tribus lineis, intimus tres pollices & novem lineas; poſticus autem duos pollices & decem lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque protenſâ. Dígiti poſtici unguis magnitudine & validitate reliquos

omnes antecellit; octodecim enim linearum longitudine pollet. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis superior pars nigricat. Caput ad latera rufescit: color autem rufescens taniâ terminatur longitudinali fuscâ, ab exortu mandibulæ inferioris ortâ, & secundum maxillæ inferioris longitudinem versùs collum usque productâ. Partem colli superiorem obtegunt pennæ rufescentes, nigricante transversim striatæ. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices rufescente & nigro variegantur. Dorsum infimum & uropygium fulva sunt, nigricante transversim striata. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis est denudatum, & cute viridi solummodo tectum. Guttur ex albo rufescit, & taniâ longitudinali rufâ in medio insignitur. Pars colli inferior est dilutè fulva, quibusdam variegata maculis rufis, & fusco transversim striata. Pennæ quibus obsita est colli inferioris pars infi-

tous; il a jusqu'à dix-huit lignes de longueur. Il a trois pieds dix pouces six lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noirâtre. Les côtés de la tête sont roussâtres: cette couleur est terminée par une bande longitudinale brune, qui part de l'origine du demi-bec inférieur, & s'étend tout le long de la mâchoire inférieure jusque vers le col. La partie supérieure du col est couverte de plumes roussâtres, rayées transversalement de noirâtre. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de roussâtre & de noir. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un fauve rayé transversalement de noirâtre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. La gorge est d'un blanc-roussâtre, & marquée dans son milieu d'une bande longitudinale rousse. La partie inférieure du col est d'un fauve clair, varié de quelques taches rousses, & rayé transversalement de brun. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont assez larges, & beaucoup plus

longues que les autres. La poitrine & le ventre sont d'un fauve clair, varié de taches longitudinales noirâtres. Les côtés sont fauves, & rayés transversalement de noirâtre. Le haut des jambes est d'un fauve très-clair, varié en-dehors seulement de quelques bandes noirâtres, transversales & en zigzags. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve très-clair & sans taches. Celles du dessous des ailes sont roussâtres, & variées de taches brunes. Les plus petites couvertures du dessus des ailes, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont d'un fauve foncé, varié de bandes noires transversales & en zigzags: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont roussâtres, & rayées pareillement de bandes noires transversales & en zigzags: enfin les grandes les plus éloignées du corps sont rayées transversalement de larges bandes alternativement noires & d'un fauve foncé. Les grandes plumes de l'aile sont rayées transversalement des mêmes couleurs, & terminées de noir: les moyennes sont fauves, & marquées de larges bandes noires transversales & en zigzags, avec

ma, sunt latiusculæ, & reliquis multò longiores. Pectus & venter fulvo tinguntur diluto, & maculis longitudinalibus nigricantibus variegantur. Latera fulva, nigricante transversim striata. Crurum suprema pars dilutissimè fulva, quibusdam tæniis nigricantibus transversis & undatis extrorsum solummodo variegata. Inferiores caudæ tectrices dilutissimè fulvæ & immaculatæ. Pennæ alas subtus obtegentes rufescentes, maculis fuscis variæ. Tectrices alarum superiores minimæ, istæ scilicet quæ articulum carpo humano respondentem obtegent, saturatè fulvæ, tæniis nigris transversis & undatis variæ: mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, rufescentes, tæniis similiter nigris transversis & undatis striatæ: majores tandem à corpore remotiores latis tæniis alternatim nigris & saturatè fulvis transversim striatæ. Remiges alarum majores iisdem coloribus transversim striantur, nigroque terminantur: minores sunt fulvæ, latis insignitæ tæniis nigris transversis & undatis, maculis aliis nigris in fulvo colore disseminatis. Remiges corpori

pori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ nigricant, & in tota circumferentia rufescente marginantur : laterales omnes sunt fulvæ, maximâ macularum nigricantium irregularium copiâ variegatæ. Oculorum irides in aliis avellaneo-flavicantes, in alteris avellaneo-rufescentes. Mandibula superior fusca ; inferior fusco-viridescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridi-flavicantes ; ungues verò fusci. Paludes frequentat, ibique humi nidificat. Uno incubitu quinque ova ponit ex candicante ad cinereum aut viride vergentia. *Ex museo Realmuriano.*

d'autres taches noires répandues sur le fauve. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée ; aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de rouffâtre dans toute leur circonférence : toutes les latérales sont d'un fauve varié d'une grande quantité de taches noirâtres irrégulieres. L'iris des yeux est de couleur de noisette-jaunâtre dans quelques-uns & rougeâtre dans d'autres. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est d'un brun-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre ; & les ongles bruns. Il se tient ordinairement dans les marais, & y fait son nid par terre. Il pond à chaque couvée cinq œufs d'un blanchâtre tirant sur le cendré ou sur le verd. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

25. LE BUTOR DE LA BAYE DE HUDSON.

Ardea superne rufescens, nigricante transversim striata, infernè candicans, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro aspersis, varia; vertice nigricante; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro marginatis, vario; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; rectricibus

rufescentibus, nigricante transversim striatis; rostro superius
& apice nigricante, infernè luteo; pedibus flavis . . .
BOTAURUS Freti HUDSONIS.

Butor de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVI; avec
une figure exacte Pl. 136.*

Les Anglois l'appellent BITTERN FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le nôtre. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds sept pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long; sa queue environ trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi trois pouces trois lignes de long, l'extérieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derrière deux pouces. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est couvert

Botauro nostrati paululum crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & tres circiter pollices aequat, & ad extremos ungues duos pedes septem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices & totidem circiter lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes tres pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue eadem longitudine pollet; extimus duos pollices & quinque lineas longus, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem duos pollices. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum membranâ, ad primum articulum usque protensâ, adnectitur. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis pennis obtegitur ni-

gris, longiusculis, tactu mollissimis. Caput ad latera rufescit. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis denudatur, & cute luteâ obtegitur. Guttur albicat. Collum superius fuscum est. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt rufescentes, nigricante transversim striatæ. Partem colli inferiorem cooperiunt pennæ albæ, maculâ longitudinali rufescente, nigro marginatâ, versùs ipsarum extremitatem variâ. Pectus, venter, crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores candicant, & majusculis variegantur maculis longitudinalibus rufescentibus, minutis aliis maculis nigris aspersis, & nigro quoque fimbriatis. Latera penitus candicant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt albo-flavicantes, nigricante transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, pennis scapularibus concolores : majores à corpore remotiores & pennæ alarum notham constituentes nigræ, rufescente terminatæ. Remiges quinque sexve primores superne nigræ, in-

de plumes noires, assez longues & douces au toucher. Les côtés de la tête sont roussâtres. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La gorge est blanche. La partie supérieure du col est brune. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roussâtre, rayé transversalement de noirâtre. La partie inférieure du col est couverte de plumes blanches, variées vers leur extrémité d'une tache longitudinale roussâtre, bordée de noir. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre varié d'assez grandes taches longitudinales roussâtres, parsemées d'autres petites taches noires ; & bordées de la même couleur. Les côtés sont tout-à-fait blanchâtres. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un blanc-jaunâtre, rayé transversalement de noirâtre. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps, ainsi que les plumes de l'aile bâtarde, sont noires ;

& terminées de rouffâtre. Les cinq ou six premières plumes de l'aîle sont noires en-dessus & cendrées en-dessous : les suivantes sont de la même couleur, mais elles sont de plus terminées de rouffâtre : les plus proches du corps sont rouffâtres, & rayées transversalement de noirâtre. Ces dernières sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que ces dernières plumes de l'aîle. Le demi-bec supérieur est noir, excepté ses bords qui sont jaunes jusque vers son extrémité; le demi-bec inférieur est jaune depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles gris-bruns. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

fernè cinereæ : proximè frequentes eodem imbutæ colore, sed insuper rufescente terminatæ : corpori viciniore rufescentes, nigricante transversim striatæ. Quæ novissimè dictæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus proximè dictis concolores. Mandibula superior nigra, attamen ad margines versùs extremitatem usque lutea; inferior ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque lutea, in reliqua longitudine nigra. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavi; ungues verò griseo-fusci. Habitat in *Freto Hudsonis*.

26. LE PETIT BUTOR.

Ardea rufescens, fusco striata; gutture & collo inferiore candidis; rectricibus albicantibus; rostro superius obscurè fusco, infernè flavo; pedibus fuscis BOTAURUS MINOR.

Ardea viride-flavescens, Nova species. *Marsil. Danub. Tom. V. pag. 22. hujus icon satis accurata Tab. 9.*

Ardea viride-flavescens, Nova species Marsili. *Klein. Avi. pag. 124. N^o. 13.*

Præcedenti multum crassitie cedit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque ad trium pollicum longitudinem accedit, sed eam non penitus explet. Partes capitis & colli superiores, pectus, venter, latera, uropygium, caudæ rectrices superiores & inferiores, & pennæ alas superne vestientes rufescunt, lineolisque fuscis striantur. Dorsum & scapulares pennæ concolores; attamen lineæ fuscæ majorem obtinent latitudinem, ipsarumque major extat copia. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavâ tectum. Guttur & collum inferius sunt candida. Crurum partem supremam vestiunt pennæ ex albedo fuscescentes. Remiges alarum fuscescunt, & tæniis transversis fuscis variegantur. Corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ quidem valdè brevis, duodecim constat rectricibus albicantibus. Oculi sunt nigri: ipsorum irides albidæ. Mandibula superior obscurè fusca; inferior

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche n'a pas tout-à-fait trois pouces de long. Les parties supérieures de la tête & du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessus des ailes sont d'un roussâtre rayé de petites lignes brunes. Le dos & les plumes scapulaires sont de la même couleur; mais les lignes brunes sont plus larges & en plus grand nombre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches. Le haut des jambes est couvert de plumes d'un blanchâtre rembruni. Les plumes de l'aile sont roussâtres, & variées de bandes transversales brunes. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue, qui est très-courte, est composée de douze plumes blanchâtres. Les yeux sont noirs: & leur iris est blanchâtre. Le demi-bec supérieur est d'un brun obscur; l'inférieur est jaune. La partie des

jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns : les doigts tirent cependant un peu sur le jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

flava. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguis que fuscis : digiti tamen non-nihil ad flavescentem incli-nant colorem. Trium digi-torum anticorum medius ex-timo digito membranâ, ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Juxta *Danubii* ripas versatur.

27. LE BUTOR RAYÉ.

Ardea lineolis fuscis, nigris & rufescentibus striata; collo inferiore & pectore albicantibus; rectricibus fusco, nigro & rufescente striatis; rostro superius fusco, infernè flavo; pedibus griseis, lineolis atris notatis BOTTAURUS STRIATUS.

Ardea fusca, Nova species. Marfil. Danub. Tom. V. pag. 24. hujus icon satis accurata Tab. 10.

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, celles du dessus & du dessous de la queue, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont rayés de petites lignes brunes, noires & roussâtres, mêlées confusément ensemble. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La gorge, la partie inférieure du col &

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Partes capitæ & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, caudæ rectrices superiores & inferiores, venter, crurum suprema pars & latera lineolis striantur fuscis, nigris & rufescentibus confusè mixtis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute flavâ obtegitur. Guttur, pars colli inferior & pectus candicant. Re-

imiges alarum iisdem variegantur coloribus ac dorsum ipsum tingitur. Corpori finitimæ maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices lineolis fuscis, nigris & rufescentibus striatæ. Mandibula superior fusca; inferior flava. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei: attamen digiti nonnihil ad flavescentem colorem inclinant. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. *Danubii* ripas frequentat.

la poitrine sont blanchâtres. Les plumes de l'aîle sont variées des mêmes couleurs que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes rayées de petites lignes brunes, noires & roussâtres. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est jaune. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris: les doigts tirent cependant un peu sur le jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

28. LE GRAND BUTOR.

Ardea cristata, superne cinereo-fusca, infernè rufa; vertice & cristâ nigris; collo ad latera rufo, taniâ longitudinali nigrâ notato, inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & albo-rufescentibus vario; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; rectricibus cinereo-fuscis; rostro flavicante; pedibus fuscis **BOTAURUS MAJOR.**

Ardea maxima, lutescens, maculis nigris sagittatis densissimè aspersa.

Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 1.

Ardea cristata, maculosa, fusca. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp. 3.*

Ardea Stellaris major. Gesn. Avi. pag. 218. hujus icon minùs accurata pag. 219.

Gesn. icon. Avi. pag. 119, in qua eadem icon.

- Jonst. Avi. pag. 105. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 51.*
Ardea Stellaris major Ornithologi. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 408.
hujus icon à Gesnero mutuata pag. 556.
Ardea Stellaris major, sive rubra cirrata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 410.
hujus icon satis accurata pag. 409.
Ardea Stellaris major, feu rubra Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 208.
Raj. Syn. Avi. pag. 100. N^o. 13.
Ardea cinerea alia. Jonst. Avi. hujus icon minùs accurata Tab. 50.
Les Catalans l'appellent TORU DE GARRIGA. Barr.
Les Italiens aux environs du Lac Majeur, RUSSEY. Gesn. Aldrov.
Les Allemands, GROSSER ROR-REIGEL. Gesn.

Il est beaucoup plus gros que le *Butor ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatre pieds six pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a pour le moins huit pouces de long; sa queue quatre ou cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, environ deux pouces; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Celui du milieu de trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusque vers le bout

Botaurum vulgarem multum crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo saltem pollices longum est; cauda quatuor vel quinque pollices; pars crurum plumis denudata duos circiter pollices; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices: laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ versùs caudæ extremitatem usque protrahuntur.

tenduntur. Vertex capitis est niger : ex pennis illum obtegentibus quædam sunt longissimæ , elegantemque cristam efficiunt. Pars colli superior , dorsum , uropygium , superioresque caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis denudatur , & cute flavâ solummodo obducitur. Collum ad latera rufum est , latèque rariâ longitudinali nigrâ notatum. Guttur & collum inferius albicans , & longitudinalibus variegantur maculis , aliis nigris , alteris albo - rufescentibus. Pennæ quibus colli inferioris pars infima obsita est , maximam obtinent longitudinem , & supra pectus propendent. Pectus , ventrem , latera , inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color rufus. Pennæ scapulares , quæ quidem longissimæ , strictissimæque , eodem imbuuntur colore. Crurum suprema pars ex albo rufescit. Superiores alarum tectrices , sicut & remiges , sunt cinereo-fuscæ. Ex remigibus autem corpori viciniore maximam longitudinem obtinent , & dum ala complicatur , ma-

de la queue. Le sommet de la tête est noir : quelques - unes des plumes qui le couvrent , sont fort longues , & forment une belle hupe. La partie supérieure du col , le dos , le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes , & couvert seulement d'une peau jaune. Les côtés du col sont roux , & marqués d'une large bande longitudinale noire. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches , & variées de taches longitudinales , les unes noires & les autres d'un blanc-roussâtre. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont très-longues , & pendent sur la poitrine. La poitrine , le ventre , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous des ailes & les côtés sont roux. Les plumes scapulaires , qui sont très-longues & très-étroites , sont de la même couleur. Le haut des jambes est d'un blanc-roussâtre. Les couvertures du dessus des ailes , ainsi que les plumes de l'aile , sont d'un cendré-brun. De ces dernières , les plus proches du corps sont fort longues , & s'étendent , lorsque l'aile est pliée , presque aussi loin

que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-brun. L'iris des yeux est jaune. Le bec est jaunâtre. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve dans les marais.

jorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo - fuscis cauda conflatur. Oculorum irides lutæ. Rostrum flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fuscis. In paludibus habitat.

29. LE BUTOR ROUX.

Ardea superne nigricans, infernè rufescens; vertice nigro; collo ferrugineo; uropygio albo; rectricibus nigricantibus; rostro superne nigricante, infernè corneo colore tincto; pedibus fuscis BOTAURUS RUFUS.

Ardeæ Stellaris tertium genus. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 410. hujus icon satis accurata pag. 411.

Ardeæ Stellaris tertium genus Aldrovandi. Raj. Syn. Avi. pag. 100. N^o. 12.

Ardea Stellaris, tertium genus. Marsil. Danub. Tom. V. pag. 18. hujus icon non satis accurata Tab. 7.

Ardea Stellaris, tertium genus Aldrovandi. Willugh. Ornith. pag. 208.

Ardea Stellaris altera. Jonst. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 51.

Il est un peu plus gros que le *petit Butor*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a environ quatre pouces de long; son col huit pouces. Sa queue est extrêmement courte. Ses jambes & ses pieds, pris ensemble, ont neuf pouces de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation,

Crassitie Botaurum minorem paululum antecellit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor circiter pollices longum est; collum octo pollices. Cauda valde brevis est. Crura, pedesque, simul commensurati, novem pollicum longitudinem obtinent. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque productâ,

coadunatur. Capitis vertex nigro imbuatur colore. Reliquum caput, guttur & collum tingit color ferrugineus. Dorsum, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt nigricantes. Uropygium albat. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes rufescunt. Superiores alarum rectrices albo & ferrugineo variegantur. Remiges majores sunt nigricantes : minores ferrugineo colore imbutæ. Ex minoribus autem remigibus, corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Oculorum irides luteæ. Mandibula superior nigricans; inferior corneo colore imbuta. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusci. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*. Paludes frequentat.

Le sommet de la tête est noir. Le reste de la tête, la gorge, & le col sont d'une couleur ferrugineuse. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Le croupion est blanc. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont roussâtres. Les couvertures du dessus des ailes sont variées de ferrugineux & de blanc. Les grandes plumes de l'aile sont noirâtres : les moyennes sont d'une couleur ferrugineuse. De ces dernières, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes noirâtres. L'iris des yeux est jaune. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est de couleur de corne. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*. Il se tient dans les marais.

30. LE BUTOR DU BRÉSIL.

Ardea superne fusca, rufescente striata, infernè alba, fusco striata, marginibus pennarum rufescentibus; capite & collo superiore rufescentibus, nigro striatis; rectricibus partim nigris, partim cinereis, albo transversim striatis; rostro superiùs fusco, in exortu & infernè flavo-virescente; pedibus obscurè griseis BOTAURUS BRASILIENSIS.

Alia Ardeæ species. *Marcgr. Hist. Br. pag. 210.* *

Jonst. Avi. pag. 143.

Ardea Brasiliensis, rostro ferrato, Stellari similis Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 209.*

Ardea Brasiliensis, rostro ferrato, cinereæ similis Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 101. N°. 16.*

Il est à peu près de la grosseur du *petit Butor*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces six lignes de long; sa queue quatre pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied quatre pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, environ trois pouces six lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Botaurum minorem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & tres circiter pollices æquat, & ad extremos unguis duos pedes & novem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices & sex lineas longum est; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes quatuor pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & sex circiter lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito

connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput & collum superius rufescunt, nigroque striantur. Dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ, rufescente striatæ. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices concolores. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavo-virescente tectum. Guttur album est & immaculatum. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ rectrices albescent & fusco striantur, marginibus pennarum in tota circumferentia rufescentibus. Remiges alarum sunt nigro & cinereo variæ, & apicibus albis præditæ. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices partim nigræ, partim cineræ, albo transversim striatæ. Oculi sunt nigri: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior fusca, attamen in

brane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un roussâtre rayé de noir. Le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, rayées de roussâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dépourvu de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge est blanche & sans taches. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc rayé de brun, chaque plume étant bordée de roussâtre dans toute sa circonférence. Les plumes de l'aile sont variées de noir & de cendré, & terminées de blanc. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes en partie noires & en partie cendrées, & rayées transversalement de blanc. Les yeux sont noirs :

leur iris est de couleur d'or. Le demi-bec supérieur est brun, excepté son origine, qui est d'un jaune-verdâtre; l'inférieur est de cette dernière couleur. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris obscur. On le trouve au *Brazil*,

exortu flavo-virescens; inferior ex flavo quoque virefcit. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque obscure grisei. Habitat in *Brajilia*.

** 31. LE BUTOR TACHETÉ OU LE POUACRE.

Ardea fusca, superne saturatiùs, infernè dilutiùs, superne albo punctulata; reëtricibus fuscis; spatio rostrum inter & oculos nudo virescente; rostro superne fusco, infernè flavo-virescente; pedibus fusco-virescentibus . . . BOTAVRUS NÆVIUS.

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix-huit pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces sept lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, dix lignes; son pied deux pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur seize lignes; & celui de derrière treize lignes. Celui

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem octo pollices & septem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes duos pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus sexdecim li.

neas; posticus autem tred-
 cim lineas. Trium digitorum
 anticorum medius ad exti-
 mum digitum adnectitur
 membranâ ad primum articu-
 lum usque protensâ. Alis
 expansis, extremitates majo-
 rum remigum duorum pedum
 quatuor pollicum & sex li-
 nearum intervallo distant;
 alæ verò complicatæ cau-
 dam extremam attingunt. Ca-
 put, pars colli superior, si-
 cut & dorso superiora, pennæ
 scapulares & superiores ala-
 rum tectrices fusco imbuun-
 tur saturato, minutis asper-
 so maculis albis, in extremitate
 pennarum positis. Dorsum
 inferius, uropygium, supe-
 rioresque caudæ tectrices
 sunt saturatè fuscæ & imma-
 culatæ. Guttur, pars colli
 inferior, pectus, venter, la-
 tera, crurum superiora pars,
 inferiores caudæ tectrices &
 pennæ alas subtus obtegen-
 tes fusco quidem tinguntur
 colore, sed nonnihil dilu-
 tiore. Spatium rostrum in-
 ter & oculum utrinque con-
 tentum plumis denudatur,
 & solummodo cute vire-
 cente obtegitur. Remiges
 alarum sunt saturatè fuscæ,
 minutâ maculâ candidâ in
 apice donatæ. Corpori vici-
 niores maximam obtinent

du milieu des trois doigts anté-
 rieurs est réuni avec le doigt
 extérieur par une membrane,
 qui s'étend jusqu'à la première
 articulation. Il a deux pieds
 quatre pouces six lignes de vol;
 & ses ailes, lorsqu'elles sont
 pliées, s'étendent jusqu'au bout
 de la queue. La tête, le des-
 sus du col, la partie supérieure
 du dos, les plumes scapulaires
 & les couvertures du dessus
 des ailes sont d'un brun foncé,
 tout parsemé de petites taches
 blanches, placées à l'extrémité
 des plumes. La partie inférieure
 du dos, le croupion & les
 couvertures du dessus de la
 queue sont d'un brun foncé &
 sans taches. La gorge, la par-
 tie inférieure du col, la poi-
 trine, le ventre, les côtés, le
 haut des jambes, les couvertu-
 res du dessous de la queue &
 celles du dessous des ailes sont
 d'un brun un peu plus clair.
 L'espace contenu de chaque
 côté entre le bec & l'œil est
 dégarni de plumes, & couvert
 seulement d'une peau verdâ-
 tre. Les plumes de l'aile sont
 d'un brun foncé, & terminées
 chacune par une petite tache
 blanche. Les plus proches du
 corps sont fort longues, &
 s'étendent, lorsque l'aile est
 pliée, presque aussi loin que les
 plus grandes plumes de l'aile.

La queue est composée de douze plumes brunes. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre; & les ongles bruns. Il se tient dans les marais, & s'y nourrit de *Poissons*, de *Grenouilles*, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda constat. Mandibula superior fusca; inferior flavo-virescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-virescentes; ungues verò fusci. Paludes frequentat, ibique *Piscibus*, *Ranis*, &c. viçtitat. *Ex museo Realmuriano.*

32. LE BUTOR TACHETÉ D'AMÉRIQUE.

Ardea fusca, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; alis superne albo punctulatis; rectricibus cinereo-cœrulescentibus; spatium rostrum inter & oculos nudo, & rostro inferiore viridibus, rostro superiore nigro-virescente; pedibus flavo-virescentibus *BOTAURUS AMERICANUS NÆVIUS.*

Ardea minor subfusco-grifea, cruribus brevioribus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.*

Ardea Stellaris minor. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 315. N°. 5. hujus icon minùs accurata Tab. 263. fig. 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 189. N°. 4.

Ardea fusca. Klein. Avi. pag. 124. N°. 8.

Butor brun. Catesb. Tom. 1. pag. 78; avec une figure exacte Pl. 78.

Les Anglois l'appellent BROWN BITTERN. Catesb.

Les Anglois de la Jamaïque, SMALL BITTERN. Sloane. Raj. CRAB-CATCHER. Browne.

Il n'est pas si gros que le petit *Butor*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce. Son bec depuis sa

Botaurò minori crassitie cedit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & octo circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes cum pollice unico. Rostrum ab

ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes quatuor ferè pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices & sex lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ rectrices sunt saturatè fuscæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ rectrices tingit color fuscus quidem, sed nonnihil dilutior. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis est denudatum, & cute viridi solummodo rectum. Superiores alarum rectrices eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur; majores autem minutâ maculâ candidâ in extremi-

pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; la queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied près de quatre pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derrière un pouce six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun un peu plus clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les couvertures du dessus des ailes sont de la même couleur que le dos; mais les plus grandes sont terminées par une pe-

te tache blanche. Les plumes de l'aile sont aussi d'un brun foncé, & terminées de même par une petite tache blanche. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un cendré-bleuâtre. Les yeux sont grands : leur iris est de couleur d'or : & les paupieres sont vertes. Le demi-bec supérieur est d'un noir-verdâtre ; l'inférieur est verd. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune-verdâtre. On le trouve à la Jamaïque, à la Caroline, & en différens endroits de l'Amérique Septentrionale. Il se tient sur les bords des rivières & des étangs.

tate præditæ sunt. Remiges sunt quoque saturatè fuscæ, & minutâ maculâ candidâ similiter terminatæ. Corpori viciniore longissimæ sunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-cœrulescentes. Oculi sunt magni : ipsorum irides aureo colore imbutæ : palpebræ verò virides. Mandibula superior nigro-virescens ; inferior viridis. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavo-virescentes. Habitat in Jamaica, Carolina, & in variis America Septentrionalis regionibus. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur.

33. LE CRABIER.

Ardea cristata, castanea; pennis scapularibus in exortu albis; cristâ in medio albâ, ad latera nigrâ; rectricibus castaneis; rostro luteo, apice nigricante; pedibus viridibus
CANCROFAGUS.

Ardeæ alia species, quæ vulgò Squaiotta dicitur Malalbergi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 401, in qua hujus icon non satis accurata.*

Ardea vulgò Squaiotta dicta Malalbergi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 207. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.*

Raj. Syn. Avi. pag. 99. N^o. 9.

Squaiotta Itolorum. *Jonst. Avi. pag. 104. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 51, sub titulo, Ardea Quaiotta.*

Charlet. Exer. pag. 110. N^o. 6.

Præcedenti crassitie cedit. Summum caput obtegunt pennæ, quarum quæ medium locum tenent, sunt candidæ, quæ verò ad latera positæ sunt, nigræ. Ex istis autem pennis triginta reliquas longitudine superant, & cristam efficiunt. Reliquum caput, guttur, collum, univsumque corpus pennis vestiuntur eleganter castaneis. Scapulares, caudam superne & infernè cooperientes, rectrices alarum superiores & inferiores, ipsarumque remiges tingit idem color : scapulares tamen, quæ quidem longissimæ & strictissimæ, sunt in exortu candidæ. Remiges corpori viciniore maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim conflatur rectricibus eleganter castaneis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute luteâ coopertum. Rostrum similiter luteum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis

Il est plus petit que le précédent. Le sommet de la tête est couvert de plumes, dont celles qui occupent le milieu, sont blanches, & celles qui sont sur les côtés, sont noires. Trente de ces plumes sont plus longues que les autres, & forment une huppe. Le reste de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un beau marron. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des ailes, & les plumes de l'aile sont de la même couleur : les scapulaires, qui sont fort longues & fort étroites, sont cependant blanches à leur origine. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue, qui est très-courte, est composée de douze plumes d'un beau marron. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Le bec est de la même couleur, excepté son extrémité, qui est noirâtre. La partie

des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verts. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Eologne*.

denudata, pedesque virides. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

34. LE CRABIER MARRON.

Ardea superne castanea, infernè sordidè alba; taniâ longitudinali candidâ à gutture ad ventrem usque productâ; rectricibus alarum superioribus ad cœruleum vergentibus; remigibus nigris; rectricibus castaneis; rostro fusco; pedibus rubris CANCROFAGUS CASTANEUS.

Ardea rubra. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 225.*

Les Silésiens l'appellent RODTER REGER; SAND-REGER. *Schwenck.*

Il est à peu près de la grosseur d'une *Corneille*. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de longueur. Sa tête est fort petite; & son col fort allongé. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de couleur de marron. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc sale; il y a cependant une bande longitudinale d'un beau blanc, qui part de la gorge,

Cum *Cornice* crassitie circiter convenit. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuor pollices longum est. Caput habet valdè exiguum; collum verò maximè elongatum. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices castaneo tinguntur colore. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sordidè albescent; taniâ tamen extat longitudinalis candida, à gutture orta, per totam colli longitudinem & pectus me-

dium ducta, & ad ventrem usque protensa. Superiores alarum tectrices nonnihil ad cœruleum vergunt. Remiges sunt nigræ. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus castaneis cauda constat. Oculorum irides flavicantes. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis nudata, pedesque rubri. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. In arboribus excelsis nidificat. *Pisciculis & Insectorum aquaticorum* omni genere vescitur. Habitat in *Silesia*.

passé dans toute la longueur du col & par le milieu de la poitrine, & s'étend jusqu'au ventre. Les couvertures du dessus des ailes tirent un peu sur le bleuâtre. Les plumes de l'aile sont noires. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes de couleur de marron. L'iris des yeux est jaunâtre. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, & les pieds sont rouges. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il fait son nid dans les grands arbres. Il se nourrit de *petits Poissons* & de toutes sortes d'*Insectes aquatiques*. On le trouve en *Silesie*.

35. LE CRABIER ROUX.

Ardea cristata, ex croceo ad castaneum vergens, superne dilutiùs, infernè saturatiùs; capite superiore & cristâ lutefcente & nigro variegatis; rectricibus ex croceo ad castaneum vergentibus; rostro viridi-cœruleo, apice nigro; pedibus saturatè rubris . . . CANCROFAGUS RUFUS.

Ardea Hæmatopus, seu *Cirris* Virgilii, Scaligeri. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 397. hujus icon satis accurata pag. 398.*

Ardea Hæmatopus, seu *Cirris Virgilli* Scaligero, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 206. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L. Raj. Syn. Avi. pag. 99. N^o. 7.*

Il est tout au plus de la grosseur du *Butor tacheté*. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes longues & fort étroites, variées de jaunâtre & de noir, qui pendent sur le col, & forment une espèce de hupe. Celles qui couvrent la gorge, le col & tout le corps, sont d'une couleur de safran tirant sur le marron : cette couleur est plus claire dans le dessus du corps, & plus foncée dans le dessous. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus de la queue, celles du dessus & du dessous des ailes, & les plumes de l'aile sont de la même couleur que le dos. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur que le ventre. Les plumes de l'aile les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue, qui est extrêmement courte, est composée de douze plumes d'une couleur de safran tirant sur le marron. Un cercle d'un rouge vif entoure l'iris des yeux, qui est jaune. Le bec est d'un verd tirant sur le bleu depuis son origine jusque vers les

Botaurum nævium crassitie circiter æquat, aut paululum ei cedit. Partem capituli superiorem vestiunt pennæ longæ, stricillissimæ, lutescente & nigro variegatæ; collo incumbentes, & cristam quodammodo efficientes. Quæ guttur, collum, universumque corpus obtegunt, ex croceo ad castaneum vergunt : qui color in corpore superiore dilutior est, in inferiore saturior. Pennæ scapulares, quæ caudam superne cooperiunt, rectrices alarum superiores & inferiores, ipsarumque remiges eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Pennæ caudam subtus obtegentes ventri concolores. Remiges alarum corpori viciniore maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim constat rectricibus ex croceo ad castaneum vergentibus. Oculorum irides luteæ, circulo coccineo circumdata. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitu-

dinis partes usque viridicœruleum, inde ad extremitatem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque saturatè rubri; ungues verò nigri. Trium digitorum anteriorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

deux tiers de sa longueur; & de là jusqu'à son extrémité il est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge foncé; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

36. LE CRABIER ROUX TACHETÉ.

Ardea cristata, ex croceo ad castaneum dilutum vergens; capite superiore & cristâ lutescente & nigro variegatis; collo ad latera maculis nigris asperfo; rectricibus ex croceo ad castaneum dilutum vergentibus; rostro viridicœruleo, apice nigro; pedibus flavicantibus CANCROFAGUS RUFUS NÆVIUS.

Ardea castanei coloris alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 399, in qua hujus icon satis accurata.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Illius instar, superior capitis pars pennis vestitur longis, strictissimis, lutescente & nigro variegatis, collo incumbentibus, & cristam quodammodo efficientibus. Dorsum, uropygium, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, rectricesque caudæ superiores & inferiores ex cro-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Comme lui, il a la partie supérieure de la tête couverte de plumes longues & fort étroites, variées de jaunâtre & de noir, qui pendent sur le col, & forment une espèce de hupe. Le dos, le croupion, la gorge, la poitrine, le ventre, les côtés; le haut des jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes, & celles du dessus & du dessous de la

queue font d'une couleur de safran tirant sur le marron clair. Le col est de la même couleur, mais il est varié sur ses côtés de taches noires. Les plumes de l'aile font de la même couleur que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue, qui est extrêmement courte, est composée de douze plumes d'une couleur de safran tirant sur le marron clair. Un cercle d'un rouge vif entoure l'iris des yeux, qui est jaune. Le bec est d'un verd tirant sur le bleu depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur; le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunâtres; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

ceo ad castaneum dilutum vergunt. Collum eodem colore tingitur, sed maculis nigris ad latera aspergitur. Alarum remiges eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim conflatur rectricibus ex croceo ad castaneum dilutum inclinantibus. Oculorum irides luteas ambit circulus coccineus. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque viridi-cœruleum; in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavicantes; ungues verò nigri. Trium digitorum anteriorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

37. LE CRABIER JAUNE.

Ardea cristata, superne luteo-rufescens, infernè candicans; capite, cristâ & collo lutescente, albo & nigro variegatis; rectricibus candicantibus; rostro luteo-rufescente; pedibus virescentibus *CANCROFAGUS LUTEUS*.

Ardeæ

Ardeæ aliud genus, quam Sguacco vocant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 400, in qua hujus icon satis accurata.*

Ardea quam Sguacco vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 206.*

Raj. Syn. Avi. pag. 99. N^o. 8.

Les Boulonnois l'appellent SQUACCO. Aldrov.

Præcedenti paululùm crasfitie cedit; & rostro nonnihil breviori donatur. Caput, guttur, collumque vestiunt pennæ lutescente, albo & nigro variegatæ. Quæ caput superius obtegunt, longæ sunt, strictissimæ, collo incumbentes, & cristam quodammodo efficientes. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex luteo rufescunt. Pectus, venter, latera & pennæ caudam subtus cooperientes candicant. Crurum pars suprema flavicat. Superiores alarum tectrices minimæ, ab alæ exortu ad articulum carpo humano respondentem usque, sunt candicantes: reliquæ omnes luteo-rufescentes. Alarum remiges ex luteo quoque rufescunt. Corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim constat rectricibus candicantibus. Oculo-

Tom. V.

Il est un peu plus petit que le précédent; & a le bec un peu plus court. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes variées de jaunâtre, de blanc & de noir. Celles qui couvrent la partie supérieure de la tête, sont longues & fort étroites, pendent sur le col, & forment une espece de hupe. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune-roussâtre. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Le haut des jambes est jaunâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, depuis l'origine de l'aîle jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, sont blanchâtres: toutes les autres sont d'un jaune-roussâtre. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui est fort courte, est composée de douze

O o o

plumes blanchâtres. Un cercle noir entoure l'iris des yeux, qui est de couleur d'or. Le bec est d'un jaune-rouffâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

rum irides aureo colore imbutas ambit circulus niger. Rostrum luteo - rufescens. Pars crurum plumis nudata, pedesque virentes. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

** 38. LE CRABIER DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2.

Ardea superne castaneo & nigricante transversim & undatim striata, infernè griseo-rufescens; capite castaneo, in parte posteriore nigro variegato; collo superiore dilutè castaneo; collo inferiore & pectore griseis, ad castaneum vergentibus; reâtricibus nigricantibus; rostro superius nigricante, infernè albo-flavicante; pedibus griseo-fuscis
CANCROFAGUS PHILIPPENSIS.

Il n'est pas plus gros qu'un petit Poulet. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a vingt-cinq lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lig-

Pullum Gallinaceum minorem crassitie non superat. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem decem pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos viginti quinque lineas longum est; cauda unum pollicem & novem lineas; pars crurum

plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus tredecim lineas; intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem pollicis unius longitudinem obtinet. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis quinque pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput anteriùs & ad latera eleganti castaneo tingitur. Capitis pars posterior castaneo & nigro variegatur. Collum superius est dilutè castaneum. Dorsum & uropygium variegant exiguæ tæniæ transversæ & undatæ, alternatim nigricantes & castaneæ. Pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute flavicante solummodo cooperatum. Guttur, pars colli in-

nes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derrière un pouce. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied cinq pouces dix lignes de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure & les côtés de la tête sont d'un beau marron. La partie postérieure de la tête est variée de marron & de noir. Le dessus du col est d'un marron clair. Le dos & le croupion sont variés de noirâtre & de marron, & cela par petites bandes transversales & en zigzags. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris tirant un peu sur le marron. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, les cou-

vertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes font d'un gris-rouffâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de gris-rouffâtre par le bout. L'aile est composée de vingt-cinq plumes : les vingt-une premières sont noirâtres ; & de celles-là les seize premières sont bordées de gris par le bout : les cinq suivantes, sçavoir depuis la dix-septième jusqu'à la vingt-unième inclusivement, sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, un peu au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aile : les quatre autres, sçavoir depuis la vingt-deuxième jusqu'à la vingt-cinquième inclusivement, sont noirâtres, rayées transversalement de marron du côté extérieur, & bordées de la même couleur par le bout. Toutes les plumes de l'aile sont de plus marquées d'un peu de blanchâtre à leur origine du côté intérieur seulement. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le demi-bec supérieur est de cette dernière couleur ; l'inférieur est d'un

ferior & pectus ex griseo paululum ad castaneum vergunt. Venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex griseo rufescunt. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, pennis dorsum vestientibus concolores : majores à corpore remotiores nigricantes, griseo-rufescente in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quinque remiges : uno-viginti primores nigricant ; ex istis autem sexdecim priores griseo sunt in apice marginatæ : quinque proximè sequentes, à decima septima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, maximâ longitudine pollent, & dum ala complicitur, paululum ultra majorum remigum extremitates extenduntur : quatuor reliquæ, à vigesima secunda scilicet ad vigesimam quintam usque inclusivè, sunt nigricantes, in latere exteriore castaneo transversim striatæ, eodemque colore in apice marginatæ. Omnes insuper remiges pauco candidante ad ipsarum exortum in latere interiore tantum insigniuntur. Duodecim rectri-

cibus nigricantibus cauda conflatur. Mandibula superior quoque nigricans; inferior albo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque griseofusci. Habitat in *Philippensibus Insulis* unde in *musæum D. Aubry* missus est.

blanc-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. On le trouve aux *Iles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son cabinet.

39. LE CRABIER D'AMÉRIQUE.

Ardea superne cinereo-coerulescente, viridi obscuro & rufescente varia, infernè cinerea; vertice cinereo-coerulescente; collo superiore fusco, xerampelino vario; collo inferiore & pectore candidis, maculis xerampelinis variegatis; rectricibus nigro-virescentibus; rostro superne nigro, infernè fusco-flavicante; pedibus flavis CANCROFAGUS AMERICANUS.

Héron ou *Ardea* varia. Feuillée. *Journ. des Obs. phys.* pag. 268. (ed. 1725).

Héron ou *Ardea* varia major Chilensis. Feuillée. *Journ. des Obs. phys.* pag. 57. (ed. 1725).

Les François de l'Amérique l'appellent CRA-CRA. Feuillée. Les Caraïbes, JABOUTRA. Feuillée.

Præcedentem crassitie paululum antecellit. Vertex capitis ex cinereo coerulescit. Caput posterius, collumque superius fusca sunt, xerampelino colore varia. Dorsum & uropygium cinereo-coerulescente, viridi obscuro & rufescente eleganter variegata. Pennæ scapulares, superioresque caudæ rectrices iisdem coloribus variegantur.

Il est un peu plus gros que le précédent. Le sommet de la tête est d'un cendré-bleuâtre. Le derrière de la tête & la partie supérieure du col sont d'un brun varié de couleur feuille-morte. Le dos & le croupion sont fort joliment variés de cendré-bleuâtre, de verd-obscur & de rouffâtre. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue

font variées des mêmes couleurs. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un blanc varié de quelques taches feuille-morte. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont cendrés. Les petites couvertures du dessus des ailes sont d'un verd obscur, & bordées de roussâtre : les grandes sont noires, & bordées de blanc. Toutes les plumes de l'aile sont pareillement noires, & bordées de blanc dans toute leur circonférence. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre. La prunelle des yeux est d'un bleu obscur : leur iris est de couleur d'or. Le demi-bec supérieur est noir ; l'inférieur est d'un brun-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes ; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane,

tur. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute flavicante obtegitur. Guttur, pars colli inferior & pectus albet, & maculis quibusdam xerampelinis variegantur. Ventrem, latera, crurum partem superam & inferiores caudæ rectrices tingit color cinereus. Superiores alarum rectrices minores sunt obscure virides, rufescente fimbriatæ : majores nigrae, albo marginatæ. Remiges omnes nigro similiter imbuuntur, & in tota circumferentia albo marginantur. Corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-virescentes. Oculorum pupilla obscure cœrulea : ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior nigra ; inferior fusco-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavi ; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Habitat in *America*. Juxta rivulorum ripas,

haud procul à mare, ver- qui s'étend jusqu'à la première
fatur. articulation. On le trouve en
Amérique. Il se tient le long
des ruisseaux, assez près de la
mer.

40. LE CRABIER DU BRÉSIL.

Ardea superne nigro-chalybea, fusco & flavicante varia, infernè alba, cinereo & pallidè luteo variegata; capite superiore nigro-chalybeo, dilutè fusco notato; rectricibus virescentibus; spatio rostrum inter & oculos nudo, luteo; rostro superius fusco, infernè albo-flavicante; pedibus luteis. **CANCROFAGUS BRASILIENSIS.**

Ardeola. Marcgr. Hist. Br. pag. 210, in qua hujus icon non satis accurata.

Jonst. Avi. pag. 144. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.

Ardeola Brasiliensis Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 210. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.

Raj. Syn. Avi. pag. 101. N°. 18.

Cocoi primus. Pison. Hist. Nat. pag. 89, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Les Brasiliens l'appellent Cocoi. Pison.

Crassitie Columbam vix adæquat. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos unguis unum pedem octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quindecim circiter lineas; pes duos pollices cum

Il est tout au plus de la grosseur d'un Pigeon. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ seize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, environ quinze lignes; son pied deux pouces six lignes; celui

du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derrière est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir tirant sur la couleur d'acier poli, marqué d'un peu de brun clair. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc varié de cendré & de jaune pâle. Le haut des jambes est varié de cendré & de jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir tirant sur la couleur d'acier poli, varié de brun & de jaunâtre. Les couvertures du dessus des ailes sont joliment variées de brun, de couleur d'acier poli, de jaunâtre & de cendré. Les plumes de l'aile sont verdâtres, & marquées à leur extrémité d'une tache blanche. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin

sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & tres lineas : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis superior pars est nigro-chalybea, pauco fusco diluto notata. Guttur, collum, pectus, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices albicant, & cinereo, luteoque pallido variegantur. Crurum suprema pars cinereo & flavicante variegata. Dorsum, uropygium, scapulares pennas & superiores caudæ tectrices tingit color nigro-chalybeus, fusco & flavicante varius. Superiores alarum tectrices fusco, chalybeo, flavescente & cinereo eleganter variegatæ. Alarum remiges virescentes, maculâ candidâ in extremitate insignitæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim re- tricibus virescentibus cauda constat.

constat. Spatium rostrum inter & oculus utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo tectum. Oculorum pupilla nigra: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior fusca; inferior albo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò grisei. Habitat in *Brasilia*.

que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes verdâtres. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La prunelle des yeux est noire; leur iris est de couleur d'or. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est d'un blanc-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles gris. On le trouve au *Bresil*.

41. LE CRABIER DE BAHAMA.

Ardea cristata, superne albo & nigro striata, infernè obscurè cœrulea; capite nigro-cœrulescente; vertice pallidè luteo; tæniâ longitudinali in genis, & pennis in occipite strictissimis longissimis candidis; spatio rostrum inter & oculos nudo viridi; rostro nigro; pedibus luteis. . . . CANCROFAGUS BAHAMENSIS.

Ardea crista flava, corpore nigro-cœrulescente, fascia temporali alba.

Ardea violacea. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 12.*

Ardea major grisea cristata, capite nigro, vertice & ciliis albicantibus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.*

Ardea cœrulea. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 314. hujus icon non satis accurata Tab. 264. fig. 5.*

Raj. Syn. Avi. pag. 189. N^o. 2.

Ardea Stellaris cristata Americana. *Klein. Avi. pag. 124. N^o. 9.*

Butor huppé. *Catesb. Tom. 1. pag. 79; avec une figure pas assez exacte Pl. 79.*

Les Anglois l'appellent CRESTED BITTERN. *Catesb.*

Les Anglois de la Jamaïque, GREY CRESTED GAULDING. *Browne.*

Cum *Botaurus navio* cras-
sitie circiter convenit. *Ipsius*
Tom. V.

Il est à peu près de la grosseur du *Butor tacheté*. Sa lon-
gueur est de
Ppp

gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, l'intérieur un pouce six lignes; & celui de derrière quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert de plumes d'un jaune pâle, parmi lesquelles il y en a quelques-unes de blanches: ces dernières, qui sont fort étroites & fort longues, quelques-unes ayant jusqu'à six pouces de longueur, forment une belle hupe, que l'Oiseau redresse ou abaisse à volonté. Le reste de la tête est d'un noir tirant sur

longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos unguis unum pedem septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & octo lineas longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus unum pollicem cum octo lineis, intimus unum pollicem & sex lineas; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis verticem obtegunt pennæ pallidè luteæ, inter quas quædam oriuntur candidæ: quæ novissimæ dictæ sunt strictissimæ, maximam longitudinem obtinent, quædam enim sex pollicum longitudine pollent, & elegantem efficiunt cristam, quam Ayis ad libitum erigere aut

contrahere potest. Reliquum caput ex nigro cœrulescit. In utroque tamen capituli latera extat longitudinalis candida, ab oris angulis orta, & versùs occipitium usque protensa. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute viridi obtegitur. Dorsum est albo & nigro striatum. Guttur, collum, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, uropygium, pennas caudam superne & inferne cooperientes, superioresque alarum tectrices tingit color obscure cœruleus. Pennæ scapulares concolores : ex istis autem quædam sunt strictissimæ, septem pollices longæ, & ultra caudam extremam protenduntur. Remiges alarum sunt fuscæ, cœruleo adumbratæ. Corpori finitimæ maximâ longitudine polleant, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices obscure cœruleæ. Oculorum irides rubræ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò nigricantes. Habitat in Ca-

le bleu. Il y a cependant de chaque côté de la tête une bande longitudinale blanche, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusque vers l'occiput. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Le dos est rayé de noir & de blanc. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessus des ailes sont d'un bleu obscur. Les plumes scapulaires sont de la même couleur : quelques-unes de celles-là sont très-étroites, ont jusqu'à sept pouces de longueur, & s'étendent au-delà du bout de la queue. Les plumes de l'aile sont d'un brun nuancé de bleu. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un bleu obscur. L'iris des yeux est rouge. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles noirâtres. On le trouve à *la Caroline*, à *la Jamaïque* & dans *l'Isle Bahama*.

Il fait son nid dans les buissons qui croissent parmi les rochers.

rolina, Jamaica & Bahamensi Insula. In sepibus interruptis provenientibus nidificat.

42 LE CRABIER BLEU.

Ardea cristata, cœrulea; capite, cristâ & collo ad violaceum vergentibus; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis longissimis; spatio rostrum & oculos nudo, rostroque cœruleis; pedibus viridibus. . . . CANCROFAGUS CÆRULEUS.

Ardea occipite cristato, corpore cœruleo. Ardea cœrulea Linn. Syst. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 13.

Ardea plumbea cristata, capite nigro, vertice albo. Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.

Ardea cœruleo-nigra. Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 315. N°. IV. hujus icon non satis accurata Tab. 263. fig. 3.

Raj. Syn. Avi. pag. 189. N°. 3.

Ardea cyanea. Klein. Avi. pag. 124. N°. 7.

Héron bleu. Catesb. Tom. I pag. 76; avec une figure exacte Pl. 76.

Les Anglois l'appellent BLEW HERON. Catesb.

Les Anglois de la Jamaïque, BLACK GAULDING ou BLEW GAULDING; Sloane. Raj. BLUE GAULDING. Browne.

Il n'est pas tout-à-fait si gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied trois pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts

Cornici paululum crassitie cedit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos unguis unum pedem undecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes tres pollices cum quatuor lineis;

trium digitorum anticorum
 medius cum ungue duos pol-
 lices & quatuor lineas, ex-
 timus duos pollices, intimus
 unum pollicem cum decem
 lineis; posticus autem unum
 pollicem & quinque lineas.
 Trium digitorum anticorum
 medius ad extimum digitum
 adnectitur membranâ ad pri-
 mum articulum usque pro-
 tensâ. Alæ complicatæ non-
 nihil ultra caudam extremam
 protenduntur. Caput, guttur
 & collum ex cœruleo ad vio-
 laceum vergunt. Ab occipi-
 tio longæ oriuntur pennæ
 concolores, strictissimæ, ele-
 gantem cristam efficientes.
 Colli inferioris pars infima
 pennis obsita est longis simi-
 liter & strictissimis, pectori
 incumbentibus. Dorsum,
 uropygium, pennæ scapula-
 res, pectus, venter, latera,
 crurum suprema pars, pennæ
 caudam superne & infernè
 cooperientes, alarumque
 tectrices superiores & infe-
 riores cœruleo tinguntur co-
 lore. Ex scapularibus quæ-
 dam sunt valdè strictæ, pe-
 dem longitudine adæquant,
 & ad quatuor usque pollices
 ultra caudam extremam pro-
 tenduntur. Alarum remiges
 eodem imbuuntur cœruleo
 ac dorsum ipsum tingitur.

antérieurs, joint avec l'ongle,
 deux pouces quatre lignes,
 l'extérieur deux pouces, l'inté-
 rieur un pouce dix lignes; &
 celui de derriere un pouce cinq
 lignes. Celui du milieu des
 trois doigts antérieurs est réuni
 avec le doigt extérieur par une
 membrane, qui s'étend jusqu'à
 la première articulation. Ses
 ailes, lorsqu'elles sont pliées,
 s'étendent un peu au-delà du
 bout de la queue. La tête, la
 gorge & le col sont d'un bleu
 tirant sur le violet. Il part de
 l'occiput de longues plumes de
 la même couleur, fort étroites,
 qui forment une jolie hupe. Le
 bas de la partie inférieure du
 col est garni de pareilles plu-
 mes, qui retombent sur la poi-
 trine. Le dos, le croupion, les
 plumes scapulaires, la poitrine,
 le ventre, le haut des jambes,
 les couvertures du dessus & du
 dessous de la queue, celles du
 dessus & du dessous des ailes,
 & les côtés sont bleus. Quel-
 ques-unes des plumes scapu-
 laires sont extrêmement étroi-
 tes, ont un pied de longueur,
 & s'étendent jusqu'à quatre
 pouces au-delà du bout de la
 queue. Les plumes de l'aile sont
 du même bleu que le dos. Les
 plus proches du corps sont fort
 longues, & s'étendent, lorsque
 l'aile est pliée, presque aussi loin

que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes bleues. L'iris des yeux est jaune. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau bleue. Le bec est de la même couleur; mais elle devient un peu plus foncée vers l'extrémité du bec. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verts; & les ongles noirâtres. On le trouve à la *Caroline* & à la *Jamaïque*.

Corpori viciniore maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cœruleæ. Oculorum irides luteæ. Spatium rostrum inter & oculum contentum plumis est denudatum, & cute cœruleâ solummodo tectum. Rostrum similiter cœruleum, attamen nonnihil saturatiùs versùs extremitatem. Pars crurum plumis denudata, pedesque virides; ungues verò nigricantes. Habitat in *Carolina* & *Jamaica*.

** 43. LE CRABIER VERD.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 1.

Ardea superne viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè fusco-castanea; gutture albo, maculis fuscis vario; collo castaneo, albido in parte inferiore variegato; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis & longissimis; marginibus alarum griseo-fulvis; rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus; rostro superiùs fusco, inferiùs flavicante; pedibus griseo-fuscis CANCROFAGUS VIRIDIS.

Ardea occipite subristato, dorso viridi, pectore rufescente. Ardea virefcens. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 15.*

Ardea Stellaris minima. *Klein. Avi. pag. 123. N°. 6.*

Petit Butor. *Catesb. Tom. 1. pag. 80; avec une figure exacte Pl. 80.*

Les Anglois l'appellent SMALL BITTERN. *Catesb.*

Il n'est guères plus gros qu'un Poulet. Sa longueur depuis le Crassitie Pullum Gallina-
ceum non multum excedit,

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est; cauda duos pollices cum novem lineis; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes unum pollicem & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet; extimus octodecim lineas longus, intimus unum pollicem & quatuor lineas; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis superior pars est obscure viridi aurea, cupri puri colore varians. Guttur albacat, & maculis quibusdam variegatur fuscis. Collum castaneo colore imbutum,

bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce neuf lignes de long; l'extérieur dix-huit lignes, l'intérieur un pouce quatre lignes; & celui de derrière quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a deux pieds de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette. La gorge est d'un blanc varié de quelques taches brunes. Le col est de couleur de marron, sa partie inférieure étant variée de blanchâtre. Le bas de cette même partie est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent

sur la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont très-longues & fort étroites. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun tirant un peu sur le marron. Le haut des jambes tire sur le fauve. Les couvertures du dessous des ailes sont cendrées, chaque plume étant bordée de fauve. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est d'un gris-fauve. Toutes les couvertures du dessus des ailes sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette; les plus petites sont bordées de marron: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont bordées de fauve: les grandes les plus éloignées du corps sont bordées de la même couleur, mais seulement par le bout. L'aile est composée de vingt-quatre plumes d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette: les sept premières n'ont aucune bordure: les quatre suivantes, sçavoir depuis la huitième jus-

albido in parte inferiore variegatum. Colli autem inferioris pars infima pennis obfita est longissimis & strictissimis, pectori incumben-tibus. Dorsum, uropygium, scapulares pennas & superiores caudæ teñtrices tingit color viridi-aureus, cupri puri colore varians. Pennæ dorsum supremum vestientes, sicut & scapulares, longissimæ sunt & strictissimæ. Pectus, venter, latera, inferioresque caudæ teñtrices ex fusco nonnihil ad castaneum vergunt. Crurum suprema pars ad fulvum inclinat. Pennæ alas subtus obtegentes sunt cineræ, fulvo fimbriatæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, sunt griseo-fulvæ. Superiores alarum teñtrices omnes viridi-aureæ, cupri puri colore variantes; minimæ castaneo marginantur: mediæ, sicut & majores corpori vicini-ores, sunt fulvo fimbriatæ: majores à corpore remotiores eodem colore marginatæ quidem, sed in apice tantum. Alam componunt viginti quatuor remiges obscure viridi-aureæ, cupri puri colore variantes: septem primores nullâ margine donantur:

donantur : quatuor proximè sequentes, ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè, sunt fulvo in apice fimbriatæ : tredecim reliquæ, à duodecima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, fulvo similiter marginatæ per totam lateris exterioris longitudinem, sicut & in apice. Sex remiges corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus. Oculorum irides luteæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute luteâ obducitur. Mandibula superior fusca; inferior flavicans, præsertim versùs exortum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque griseo-fusci. *Ranis, Cancris & Pisciculis* victitat. Habitat in *Carolina, Virginia, Martinica & Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Artur.*

qu'à l'onzième inclusivement; font bordées de fauve par le bout : les treize autres, sçavoir depuis la douzième jusqu'à la vingt-quatrième inclusivement; font bordées pareillement de fauve dans toute la longueur du côté extérieur & par le bout. Les six plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, se terminent en pointe; & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. L'iris des yeux est jaune. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est jaunâtre; sur-tout vers son origine. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Il se nourrit de *Grenouilles*, de *Crabes* & de *petit Poissons*. On le trouve à *la Caroline*, en *Virginie*, à *la Martinique* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

** 44. LE CRABIER VERD TACHETÉ.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 2.

Ardea superne viridi-aurea , cupri puri colore varians , infernè grisea ; gutture albo , maculis fuscis vario ; collo castaneo , albido in parte inferiore variegato ; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis & longissimis ; marginibus alarum albidis ; alis superne albo punctulatis ; rectricibus obscurè viridi-aureis , cupri puri colore variantibus , lateralibus apice griseo-fuscis ; rostro superius nigricante , infernè albo-flavicante ; pedibus fuscis CANCROFAGUS VIRIDIS NÆVIUS.

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied trois pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces neuf lignes de long ; sa queue deux pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dé-garnie de plumes, huit lignes ; son pied un pouce sept lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur seize lignes & demie, l'intérieur un pouce quatre lignes ; & celui de derrière quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Præcedenti nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem tres pollices & novem lineas explet, & ad extremos unguis unum pedem quinque pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & novem lineas longum est ; cauda duos pollices cum tribus lineis ; pars crurum plumis denudata octo lineas ; pes unum pollicem & septem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum novem lineis, extimus sexdecim cum semi lineas, intimus unum pollicem & quatuor lineas ; posticus autem quatuordecim lineas. Trium

digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis pars superior est obscurè viridi-aurea, cupri puri colore varians. Guttur albicat, & maculis fuscis variegatur. Collum castaneo colore tinctum, albedo in parte inferiore variegatum. Colli autem inferioris pars infima pennis obsita est longissimis & strictissimis, pectori incumbentibus: quæ pennæ sunt griseæ, & latâ tæniâ candicante, secundum scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt viridi-aureæ, cupri puri colore variantes. Pennæ dorso partem supremam vestientes, sicut & scapulares, longissimæ sunt & strictissimæ. Pectus, ventrem & latera tingit color griseus. Crurum suprema pars ex griseo ad fulvum nonnihil inclinât. Pennæ caudam subtus obte-

brane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette. La gorge est d'un blanc varié de taches brunes. Le col est de couleur de marron, sa partie inférieure étant variée de blanchâtre. Le bas de cette même partie est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent sur la poitrine: ces plumes sont grises, & marquées chacune d'une large bande blanchâtre, qui s'étend selon la longueur de la tige. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont très-longues & très-étroites. La poitrine, le ventre & les côtés sont gris. Le haut des jambes est d'un gris tirant un peu sur le fauve. Les couvertures du dessous de la queue sont grises, & variées de blanchâtre. Les petites du dessous des aîles sont d'un gris-brun, & marquées chacune

d'une tache blanchâtre, placée vers leur extrémité, & qui s'étend selon la longueur de leur tige : les grandes sont cendrées. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est blanchâtre. Les couvertures du dessus des aîles sont d'un brun nuancé de verd-doré & de couleur de cuivre de rosette : les plus petites sont bordées de marron : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont bordées extérieurement de fauve, & marquées d'une tache blanche, placée à l'extrémité du côté extérieur, tout auprès de la tige : les grandes les plus éloignées du corps sont marquées d'une pareille tache blanche, mais elles n'ont point de bordure. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes d'un brun foncé, & dont le côté extérieur est nuancé de verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette : de plus les dix-huit premières sont marquées à leur extrémité d'une tache blanche, qui devient d'autant plus petite, que la plume est plus proche du corps : les six autres sont terminées de gris-brun. Ces six dernières plumes sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus

gentes griseæ, albido variegatæ. Inferiores alarum tectrices minores griseo-fuscæ, maculâ candidante, versus ipsarum extremitatem positâ, & secundum scapi longitudinem ductâ, notatæ : majores cinereæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, albidæ. Superiores alarum tectrices fuscæ, viridi-aureo & cupri puri colore adumbratæ : ex ipsis minimæ castaneo marginatæ : mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, exterius fulvo fimbriatæ, & maculâ albâ, in lateris exterioris extremitate prope scapum positâ, insignitæ : majores à corpore remotiores pari maculâ candidâ notantur, sed margine destituuntur. Alam componunt viginti quatuor remiges saturatè fuscæ, in latere exteriori viridi-aureo cupri puri colore variante adumbratæ : octodecim primores maculâ insuper albâ in extremitate notantur ; quæ macula eò minor est, quò remix fit corpori vicinior : sex reliquæ griseo-fusco terminantur. Quæ sex novissimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, in acumen desinunt, & dum ala com-

plicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus obscurè viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, lateralibus omnibus griseo-fusco terminatis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavicante tectum. Mandibula superior nigricat; inferior ex albo flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque fusci. Habitat in *Martinica*, unde in *musæum D. Aubry* missus est.

grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un verd-doré sombre, & changeant en couleur de cuivre de rosette : toutes les latérales sont terminées de gris-brun. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est d'un blanc-jaunâtre. La partie des jambes, qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *la Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

** 45. LE BIHOREAU.

Voyez Pl. XXXIX.

Ardea superne obscurè viridis, infernè alba; vertice nigro-viridescente; tæniâ in syncipite & supra oculos candidâ; pennis tribus in occipite strictissimis longissimis candidis; collo superiore albo-cinerascente; uropygio dilutè cinereo; remigibus, rectricibusque cinereis; rostro nigricante; pedibus viridi-flavicantibus NYCTICORAX.

Ardea crista occipitis tripenni dependente, dorso nigro, abdomine flavescente. *Nycticorax*. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 9.*

Ardea cirrata, alba, dorso nigro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. 1. sp. 7.*

Ardea varia. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 226.*

Ardea varia *Schwenckfeldii*. *Klein. Avi. pag. 123. N° 5.*

Ardea cinerea altera, seu minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 380. hujus icon satis accurata pag. 381.*

Ardea cinerea minor. *Jonst. Avi. pag. 103. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 50.*

Raj. Syn. Avi. pag. 99. N° 3.

- Charlet. *Exer.* pag. 109. N^o. 1.
 Rzac. *Auct. Hist. nat. Pol.* pag. 364.
 Marfil. *Danub. Tom. V.* pag. 10. *hujus icon pessima Tab. 3.*
 Ardea cinerea minor, Germanis Nycticorax. Willugh. *Ornith.* pag. 204.
hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLIX.
 Nycticorax. *Gesn. Avi.* pag. 627. *hujus icon pessima pag. 628.*
Gesn. icon. Avi. pag. 18, *in qua eadem icon.*
 Charlet. *Exer.* pag. 79. N^o. 9.
 Charlet. *Onomazt.* pag. 71. N^o. 9.
 Sibbald. *Scot. illustr. Part. II. Lib. III.* pag. 15.
 Nycticorax Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III.* pag. 271. *hujus icon à*
Gesnero mutuata pag. 272.
 Nycticorax Gesneri. *Jonst. Avi.* pag. 95. *hujus icon à Gesnero mutuata*
Tab. XX.
 Corvus Nocturnus Agric. *Klein.*
 Héron ou Ardea cinerea rostro crassiori. *Feuillée. Journ. des Obs. phys.*
pag. 411. (ed. 1725).
 Bihoreau ou Roupeau, Espece de Héron. *Bel. Hist. nat. des Ois.* pag. 197;
avec une mauvaise figure pag. 198.
 Bihoreau, Roupeau. *Bel. Portr. d'Ois.* pag. 44 a, *dans laquelle est la*
même figure.
 Corbeau de nuit. *Alb. Tom. II.* pag. 43; *avec une figure mal coloriée*
Pl. 67.
 Les Boulonnois l'appellent SGUACCO. *Aldrov.*
 Les Allemands, NACHT-RABE. *Gesn. Aldrov. Schwenck. NACHT - RAB.*
Willugh. BUNDTER REGER; SCHILD REGER. Schwenck.
 Les Allemands aux environs de Strasbourg, NACHT-RAM. *Gesn. Aldrov.*
Schwenck.
 Les Silésiens, FOCKER; FOCKE. *Schwenck.*
 Les Hollandois, QUACK. *Charlet.*
 Les Flamands, QUACK. *Willugh.*
 Les Anglois, NIGHT-RAVEN. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb. LESSER*
 ASH COLOURED HERON. *Raj.*

Il est à peu près de la grosseur d'une Corneille. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins

Cum Cornice crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & octo pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius

apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes duos pollices & septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & undecim lineas, extimus duos pollices & totidem cum semi lineas, intimus duos pollices cum sesquilinea; posticus autem unum pollicem & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & duorum pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Supra mandibulæ superioris exortum sive in syncipite exigua extat tania candida, utrinque supra oculos ducta. Vertex capitis nigro-viridescente tingitur colore: qui color supra collum superius extenditur, & in acumen desinit. Ab occipite tres oriuntur pennæ quinque circiter pollices longæ, strictissimæ, niveo candore nitentes. Collum superius & ad

de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied deux pouces sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces onze lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes & demie, l'intérieur deux pouces une ligne & demie; & celui de derrière un pouce huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a trois pieds deux pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur ou sur le synciput est une petite bande blanche, qui s'étend de chaque côté jusqu'au dessus des yeux. Le dessus de la tête est d'un noir changeant en verd: cette couleur s'étend en pointe sur la partie supérieure du col. De l'occiput partent trois plumes longues d'environ cinq pouces, très-étroites & d'un très-beau blanc. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un blanc tirant un peu sur le cendré. La partie supérieure du dos & les

plumes scapulaires sont d'un verd foncé & obscur. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré clair; quelques-unes des couvertures du dessus de la queue sont cependant d'un cendré plus foncé. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un verd-jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le cendré. Les couvertures du dessous des ailes sont d'un cendré très-clair. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les couvertures du dessus des ailes sont cendrées. Les plumes de l'aile sont de la même couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est d'un jaune-orangé. Le bec est d'un verd-jaunâtre à son origine, & noirâtre dans le reste de sa longueur. La partie des jambes qui

latera ex albo nonnihil ad cinereum vergit. Dorfi suprema pars & scapulares pennæ sunt obscurè saturatè virides. Dorsum infimum, uropygium & superiores caudæ tectrices dilutè cinereæ; quædam tamen ex superioribus caudæ tectricibus cinereo imbuuntur saturatiore. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute viridi-flavicante obtegitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices candore nitent. Latera ex albo nonnihil ad cinereum inclinant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutissimè cinereæ. Margines alarum, infra articulum carpo humano respondentem, albæ. Superiores alarum tectrices cinereæ. Remiges concolores. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim tectricibus cinereis cauda constat. Oculorum irides flavo-aurantiæ. Rostrum in exortu viridi-flavicans, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque

pedesque viridi-flavicantes ;
ungues verò nigricantes. Pa-
ludes frequentat. *Ex museo*
Realmuriano.

est dégarnie de plumes , & les
pieds font d'un verd-jaunâtre ;
& les ongles noirâtres. On le
trouve dans les marais. *Du ca-*
binet de M. de Reaumur.

** 46. LE BLONGIOS.

Voyez Pl. XL. Fig. 1.

Ardea superne nigro - viridescens , infernè dilutè fulva ; collo
superiore griseo-fulvo , ad castaneum vergente ; pennis in
colli inferioris ima parte longissimis ; pectore maculis lon-
gitudinalibus nigricantibus vario ; reëtricibus nigro-vires-
centibus ; rostro viridi-flavicante , superius apice nigricante ;
pedibus virescentibus ARDEOLA.

Petit Butor. Edwards. Glanur. Part. II. Chap. LXV. pag. 136 ; avec une
figure peu exacte Pl. 275.

On l'appelle en Barbarie BOO-ONK. Edwards.

Turdum crassitie non mul-
tùm superat. Ipsiùs longi-
tudo à rostri apice ad caudæ
extremitatem tredecim pol-
lices & novem lineas explet ,
& ad extremos unguës quin-
decim pollices & quatuor
lineas. Rostrum ab ipsius
apice ad oris angulos usque
duos pollices & sex cum
femi lineas longum est ; cau-
da duos pollices ; pars cru-
rum plumis denudata lineas
binas ; pes unum pollicem
cum septem lineis ; trium
digitorum anticorum me-
dius cum ungue unum pol-
licem & decem lineas , ex-

Tom. V.

Il n'est guères plus gros
qu'une *Grive*. Sa longueur de-
puis le bout du bec jusqu'à ce-
lui de la queue est de treize
pouces neuf lignes , & jusqu'à
celui des ongles de quinze pou-
ces quatre lignes. Son bec de-
puis sa pointe jusqu'aux coins
de la bouche a deux pouces
six lignes & demie de long ; sa
queue deux pouces ; la partie
de ses jambes qui est dégarnie
de plumes , deux lignes ; son
pied un pouce sept lignes ; ce-
lui du milieu des trois doigts
antérieurs , joint avec l'ongle ,
un pouce dix lignes , l'extérieur
un pouce six lignes ; l'intérieur

R r r

est de la même longueur ; & celui de derrière a treize lignes de long. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane , qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a un pied sept pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-vert brillant & un peu doré. La partie supérieure du col est d'un gris-fauve , tirant un peu sur le marron. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes , & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Les côtés de la tête , la gorge , la partie inférieure du col , le haut du ventre , le haut des jambes & les côtés sont d'un fauve clair. Le bas de la partie inférieure du col est garni de plumes très-longues , qui retombent sur la poitrine. Celles qui couvrent la poitrine , sont noirâtres , & bordées de fauve clair. Le bas-ventre , les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des ailes sont d'un blanc mêlé d'une légère teinte de fauve. Les petites & les moyennes

timus sesquipollicem ; intimus eandem longitudinem obtinet ; posticus autem tredecim lineas longus est. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis septem pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis superior pars , dorsum , uropygium , pennæ scapulares , superioresque caudæ tectrices sunt splendide nigro-viridescentes , nonnihil aureo colore adumbratæ. Pars colli superior ex griseo-fulvo nonnihil ad castaneum vergit. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est nudatum , & solummodo cute flavicante obsitum. Caput ad latera , guttur , partem colli inferiorem , ventrem supremum , crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ dilute fulvæ. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longissimis , pectori incumbentibus. Quæ pectus obtegunt , nigricant , & fulvo marginantur diluto. Venter imus , inferiores caudæ

teétrices & pennæ alas sub-
tus obtegentes alben, &
aliquid fulvi admixtum ha-
bent. Superiores alarum tec-
trices minores & mediæ sunt
dilutè fulvæ : majores à cor-
pore remotiores nigro-viri-
descendentes : majores corpori
finitimæ ex albo ad griseum
vergentes ; ex istis tamen ex-
cipiendæ sunt binæ corpori
viciniore, sicut & proximè
sequentis interiorius latus, dorso
concolores. Viginti duabus
remigibus ala conflatur : no-
vemdecim primores sunt su-
perne nigræ, exteriorius ad vi-
ridescentem inclinantes co-
lorem, subtus verò cineræ :
tres corpori viciniore fuf-
cæ, fulvo fimbriatæ. Quin-
que corpori finitimæ maxi-
mâ longitudine pollent, &
dum ala complicatur, ma-
jorum remigum extremita-
tes ferè pertingunt. Caudam
componunt duodecim rec-
trices nigro-virescentes.
Mandibula superior ex viridi
flavicat, attamen in apice
nigricat ; inferior per totam
longitudinem viridi-flavi-
cans. Pars crurum plumis
denudata, pedesque viref-
centes ; ungues verò grisei.
Paludes frequentat. In mu-
seum Realmurianum ab Hel-
vetia missa est à D. Gannebin,

couvertures du dessus des ailes
font d'un fauve clair : les gran-
des les plus éloignées du corps
font d'un noir-verdâtre : les
grandes les plus proches du
corps font d'un blanc tirant sur
le gris ; il faut cependant en ex-
cepter les deux plus proches du
corps & le côté intérieur de la
suivante, qui font de la même
couleur que le dos. L'aîle est
composée de vingt-deux plu-
mes : les dix-neuf premières
font noires en-dessus, leur côté
extérieur tirant sur le verdâtre ;
mais en-dessous elles sont cen-
drées : les trois plus proches
du corps font brunes, & bor-
dées de fauve. Les cinq plus
proches du corps font fort
longues, & s'étendent, lors-
que l'aîle est pliée, presque aussi
loin que les plus grandes plu-
mes de l'aîle. La queue est
composée de douze plumes
d'un noir-vert. Le demi-bec
supérieur est d'un verd-jaunâtre,
excepté son bout qui
est noirâtre ; l'inférieur est
d'un verd-jaunâtre dans toute
sa longueur. La partie des jam-
bes, qui est dégarnie de plumes,
& les pieds font verdâtres ; &
les ongles gris. On le trouve
dans les marais. Il a été en-
voyé de Suisse à M. de Reau-
mur par M. Gannebin.

** 47. LE BLONGIOS TACHETÉ.

Voyez Pl. XL. Fig. 2.

*Ardea superne fusca , marginibus pennarum rufescentibus , infernè rufescens , pennis in medio fuscis ; vertice nigro-virescente , pennis in fronte castaneo marginatis ; pennis in colli inferioris ima parte longissimis ; imo ventre albo ; re-
ctricibus nigro-virescentibus , fulvo in apice marginatis ;
rostro superiùs fusco , infernè viridi-flavicante ; pedibus vi-
rescentibus ARDEOLA NÆVIA.*

Petit Butor brun. *Edwards. Glanur. Part. II. Chap. LXV. pag. 135 ;
avec une figure assez exacte Pl. 275.
Les Anglois l'appellent LITTLE BROWN BITTERN. Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces neuf lignes , & jusqu'à celui des ongles de treize pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes & demie de long ; sa queue un pouce huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , deux lignes ; son pied un pouce sept lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce huit lignes , l'extérieur un pouce cinq lignes ; l'intérieur est de la même longueur ; & celui de derrière a treize lignes de long. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est


Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat , & ad extremos ungues tredecim pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & totidem cum semi lineas longum est ; cauda unum pollicem & octo lineas ; pars crurum plumis denudata lineas binas ; pes unum pollicem & septem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas , extimus unum pollicem cum quinque lineis ; intimus eâdem longitudine pollet ; posticus autem tre-

decim lineas longus est. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octodecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis ex nigro virescit : in fronte autem pennæ castaneo marginantur. Partem colli superiorem vestiunt pennæ rufæ, in medio nonnihil fuscescentes. Quæ dorsum supremum obtegent, sicut & scapulares, fuscæ sunt, marginibus ipsarum rufescentibus. Quæ dorsum infimum & uropygium cooperiunt, griseo-fuscæ, griseo-fulvo fimbriatæ. Superiores caudæ tectrices nigricant, & griseo-fulvo similiter marginantur. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavicante tectum. Caput ad latera, guttur, pars colli inferior, pectus, venter supremus, crurum suprema pars & latera pennis vestiuntur rufescentibus, maculâ fuscâ, secundum ipsarum scapi longitu-


réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Il a dix-huit pouces six lignes de vol ; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir-verdâtre : sur le front les plumes sont bordées de marron. La partie supérieure du col est couverte de plumes rouffes, dont le milieu est un peu rembruni. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont brunes & bordées de rouffâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un gris-brun, bordées de gris-fauve. Les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, & bordées pareillement de gris-fauve. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes rouffâtres, marquées dans leur milieu d'une tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui garnissent le bas de la partie inférieure du col, sont fort longues, & retombent sur


la poitrine. Le bas-ventre est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Les petites couvertures du dessous des ailes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un fauve très-clair : les grandes les plus éloignées du corps sont blanches. Les plus petites du dessus sont brunes & bordées de rouffâtre : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes dans leur milieu, & fauves sur leurs bords : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un noir-verdâtre. L'aile est composée de vingt-deux plumes. Les dix-neuf premières sont noires en-dessus, leur côté extérieur tirant sur le verdâtre ; mais en-dessous elles sont cendrées : les trois plus proches du corps sont brunes, & bordées de fauve. Les cinq plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre, bordées de fauve par le bout. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est d'un verd-jaunâtre. La partie des jambes qui est dé garnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles gris. On le trouve dans les marais. Il

dinem ductâ, in medio insignitis. Pennæ autem quibus obsita est colli inferioris pars infima, maximâ longitudine pollent, & pectori incumbunt. Venter imus & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Tectrices alarum inferiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt dilutissimè fulvæ : majores à corpore remotiores candidæ. Superiores minimæ fuscæ, rufescente fimbriatæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniore, in medio fuscæ, ad margines fulvæ : majores à corpore remotiores nigro-virescentes. Viginti duabus remigibus ala constat : novemdecim primores sunt superne nigræ, exterius ad virescentem vergentes colorem, subtus cinereæ : tres corpori finitimæ fuscæ, fulvo fimbriatæ. Quinque corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-virescentes, fulvo in apice marginatæ. Mandibula superior fusca ; inferior viridi-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque virescentes ; ungues verò grisei.




Héron.





Desiné et Gravé par Martini.

Héron.






6. *Pouces.*

rupe'.





Desmés et Gravé par Martinet.


Héron huppé.





2. Héron pourpre hupé.





Desiné et Gravé par Martinet.

1. Héron gris.


2. Héron pourpre hupé.





Crabier des Philippines.





Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Butor.

2. Crabier des Philippines.



Fig. 2.



. Crabier verd tacheté.






Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet

Rebelle de 6. pouces

1. Crabier verd.


2. Crabier verd tacheté.





oreau.





Desiné et Gravé par M. de L'Isle.

Bihoreau.







Fig. 1.

2. *Blongios tachete'*.





Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Blongios*.

2. *Blongios tache'te'*.



LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 303
 Paludes frequentat. In *mu-*
seum Realmurianum ab *Hel-*
vetia missa est à *D. Gan-*
nebin. a été envoyé de *Suisse* à *M. de*
Reaumur par *M. Gannebin.*

Forfan hæc est præceden-
 tis foemina.

Celui-ci pourroit bien être
 la femelle du précédent.

LXXXII.

LXXXII.

Genus Scopi. (1)

Le genre de l'Ombrette. (1)

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus:
 Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:
 Rostrum crassum, longum,
 rectum, lateraliter pla-
 num:
 Mandibulæ superioris apex
 aduncus.

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de mem-
 branes; trois devant, un
 derriere:
 La partie inférieure des jam-
 bes dénuée de plumes:
 Le bec gros, long, droit, ap-
 plati par les côtés:
 Le bout de la mandibule supé-
 rieure crochu.

(1) *Scopus* à *Suis*, id est, *umbra*:
 ab *umbræ* colore; unde nomen.

(1) *Ombrette*. Je l'ai ainsi nommée,
 à cause de la couleur d'*ombre*, dont toutes
 ses plumes sont teintes.

** I. L' O M B R E T T E.

Scopus fuscus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; rectrici-
 bus caudæ inferioribus, rectricibusque dilutè fuscis, fusco
 saturatiore transversim striatis . . . SCOPUS.

Cum *Egretta* crassitie cir-
 citer convenit. Ipsius longi-
 tudo ab apice rostri ad cau-
 dæ extremitatem unum pe-
 dem & novem pollices ex-
 plet, & ad extremos unguis
 unum pedem undecim pol-

Elle est à peu près de la gros-
 seur de l'*Aigrette*. Sa longueur
 depuis le bout du bec jusqu'à
 celui de la queue est d'un pied
 neuf pouces, & jusqu'à celui
 des ongles d'un pied onze pou-
 ces trois lignes. Son bec depuis

son crochet jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long; sa queue six pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; son pied quatre pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce sept lignes & demie; & celui de derrière treize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec les deux doigts latéraux par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a trois pieds six pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun foncé ou de couleur de *terre d'ombre*. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous des ailes sont de la même couleur, mais plus claire. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun clair, rayé transversalement de brun très-foncé. Toutes les

lices & tres lineas. Rostrum ab ipsius unco ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pars crurum plumis nudata duos pollices cum tribus lineis; pes quatuor pollices & sex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extremus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem & septem cum semi lineas; posticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum duobus digitis lateribus connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices sunt saturatè fuscæ sive *umbræ* colore imbutæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam & tectrices alarum inferiores tingit idem color, sed dilutior. Pennæ caudam subtus

subtus obtegentes sunt dilute fusca, fusco saturatissimo transversim striata. Omnes alarum remiges in latere exteriori & apice eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur, in latere vero interiore fusco dilutiore tinguntur. Corpori viciniore sunt longissima, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilute fusca, saturatissimo fusco transversim striata. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque nigricant. Mandibula superior pluribus partibus inter se coadunatis conflata videtur. Habitat in *Senegaliensi* regione, unde in *musæum Realmurianum* missus est à *D. Adanson*.

plumes de l'aîle sont du même brun que le dos du côté extérieur & à leur extrémité ; leur côté intérieur est d'un brun plus clair. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un brun clair, rayé transversalement de brun très-foncé. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. Le demi-bec supérieur semble être composé de plusieurs pièces articulées les unes avec les autres. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanson*.

SECTIO IX.

SECTION IX.

Eæ quæ rostrum habent crassum & breve ; ipsius mandibulæ superiore cochleariformi, apice unguiculatâ.

Ceux qui ont le bec gros & court ; la mandibule supérieure en forme de cuillière, & onguiculée à son bout.

UNICO genere, *Cochlearii* scilicet, constituitur hæc sectio.

Tom. V,

IL n'y a dans cette section qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Cuillière*.

Sff

*Le genre de la Cuilliere.**Genus Cochlearii.*

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de mem-
branes ; trois devant , un
derrière :

La partie inférieure des jambes
dénuée de plumes :

Le bec gros , court :

La mandibule supérieure en
forme de cuilliere , & ongui-
culée à son bout.

Hujus character est
Digiti quatuor , membranis
destituti ; tres scilicet an-
tici , posticus unus :

Crura in parte inferiore plu-
mis denudata :

Rostrum crassum , breve :

Mandibula superior cochlea-
riformis , apice unguicu-
lata.

** I. LA CUIILLIERE.

Cochlearius superne cinereo-albus , infernè fusco-rufescens ;
capite superiore nigro ; syncipite , genis & collo inferiore
albis ; dorso supremo saturatè cinereo ; reatricibus cinereo-
albis COCHLEARIIUS.

Onocrotalus Americanus , cinereus , non maculosus. *Barr. Ornith.*
Class. III. Gen. XI. sp. 1.

Les François de la Guiane l'appellent SAOUAKOU.

Elle est un peu moins grosse
que le *Courly*. Sa longueur de-
puis le bout du bec jusqu'à celui
de la queue est d'un pied cinq
pouces six lignes , & jusqu'à ce-
lui des ongles d'un pied dix pou-
ces six lignes. Son bec, qui a un
pouce six lignes de largeur, a
depuis son bout jusqu'aux coins
de la bouche deux pouces neuf
lignes de long ; sa queue deux
pouces six lignes ; la partie de
ses jambes qui est dégarnie de

Numenio paululum cras-
sitie cedit. Ipsi longitu-
do ab apice rostri ad cau-
dam extremam unum pedem
quinque pollices & sex li-
neas æquat , & ad extremos
ungues unum pedem de-
cem pollices & sex lineas.
Rostrum , quod sesquipolli-
cis latitudinem obtinet , ab
ipsius apice ad oris angulos
usque duos pollices & no-
vem lineas longum est ; cauda

duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis nudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus duos pollices; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extremum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput superius nigro tingitur colore. Synciput, caput ad latera sive genæ, collumque inferius & ad latera albicant. Pars colli superior, dorsum infimum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices ex cinereo albescent. Dorsi partem supremam tingit color saturatè cinereus. Pectus, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufes-

plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur deux pouces; & celui de derrière quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. Elle a deux pieds onze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. Le synciput, les côtés de la tête ou les joues, la partie inférieure & les côtés du col sont blancs. Le dessus du col, la partie inférieure du dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. La partie supérieure du dos est d'un cendré foncé. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-roussâtre. Le haut des jambes est d'un gris-blanc. Les couvertures du dessous des ailes sont blanches. Le bord de l'aile, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est

de la même couleur. Toutes les plumes de l'aîle sont d'un gris-blanc. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-blanc. Le demi-bec supérieur est d'un cendré foncé, excepté ses bords, qui sont blanchâtres; le demi-bec inférieur est entièrement blanchâtre, & garni en-dessous d'une membrane de la même couleur, capable d'une très-grande extension. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. On la trouve dans *la Guiane*. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

centes. Crurum suprema pars ex cinereo-albicat. Inferiores alarum tectrices sunt candidæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, concolores. Remiges omnes cinereo-albæ. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-albis cauda constat. Mandibula superior saturatè cinerea, attamen ad margines candicans; inferior penitùs albida, & subtus membranâ concolore, valdè inflabili, instructa. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridi-flavicantes; ungues verò grisei. Habitat in *Guiana*. A *Cayana* in *musæum Realmurianum* missus à *D. Artur*.

A. LA CUILLIÈRE TACHETÉE.

Cochlearius nævius.

Onocrotalus Americanus, cinereus, maculatus. *Barr. Ornith. Class. III.*

Gen. XI. sp. 2.

Les Indiens de la Guiane l'appellent ARAPAPA. Barr.

Elle est de la grandeur & de la grosseur de la précédente. Elle en diffère seulement en ce qu'elle est variée de taches brunes. On la trouve aussi dans la *Guiane*.

Magnitudine & crassitie cum præcedente convenit. Ab illo tantùm discrepat maculis fuscis quibus variegatus est. In *Guiana* similiter habitat.

2. LA CUIILLIERE BRUNE.

Cochlearius fuscus ; capite nigro ; ventre candidante variegato ; reſtricibus fufcis COCHLEARII FUSCUS.

Cancroſagus major, roſtro cochlearis inſtar excavato, ingluvie magna extuberante. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag. 128.*

Tamatia Braſilienſibus dicta. *Marcgr. Hiſt. Br. pag. 208. hujus icon non ſatis accurata pag. 209.*

Jonſt. Avi. pag. 143. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59, ſub titulo, Tamatia alia.

Gallinula aquatica, Tamatia Braſilienſibus dicta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 238.*

Gallinula aquatica, Tamatia Braſilienſibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag. 116. N^o. 12.*

Les François de la Guiane l'appellent SAOUAKOU DES BOIS. Barr.

Les Braſiliens, TAMATIA. Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj. Barr.

Præcedentem craſſitie circiter æmulatur. Roſtrum, quod quindecim circiter linearum latitudinem obtinet, ab ipſius extremitate ad oris angulos uſque duos pollices & ampliùs longum eſt. Caudam habet valdè brevem ; pedes eâdem circiter longitudine pollentes ac pedes præcedentis. Caput ipſius obtegunt pennæ nigræ. Quæ guttur, collum, univerſumque corpus veſtiunt, ſicut & ſcapulares, alas ſuperne & infernè cooperientes, tectricesque caudæ ſuperiores & inferiores, fuſco tinguntur colore ; in ventre tamen candidantis aliquid admifcetur. Remiges alarum eodem im-

Elle eſt à peu près de la grandeur de la précédente. Son bec, qui a environ quinze lignes de largeur, a depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche plus de deux pouces de long. Sa queue eſt fort courte. Ses pieds ſont à peu près auſſi longs que ceux de la précédente. Sa tête eſt couverte de plumes noires. Celles qui couvrent la gorge, le col & tout le corps, ainſi que les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue, ſont brunes ; le ventre eſt cependant varié d'un peu de blanchâtre. Les plumes de l'aîle ſont du même brun que le dos. Les plus proches du corps ſont

fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de douze plumes brunes. Les yeux sont noirs. Le demi-bec supérieur est de la même couleur; l'inférieur est jaunâtre, & garni en-dessous, comme celui de la précédente, d'une membrane capable d'une grande extension. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la première articulation. On la trouve dans *la Guiane* & au *Bresil*.

buuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur. Corpori viciniore sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda conflatur. Oculi sunt nigri. Mandibula superior similiter nigra; inferior flavicans, & præcedentis instar, membranâ maximè inflabili subtus instructa. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridi-flavicantes; ungues verò nigricantes. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Guiana* & *Brasilia*.

SECTION X.

SECTIO X.

Ceux qui ont le bec court, droit & conique vers le bout.

Eæ quæ rostrum habent breve, rectum, apice conicum.

CETTE section ne contient encore qu'un seul genre, sçavoir celui de l'*Oiseau-royal*.

IN illa sectione unicum quoque continetur genus, scilicet *Balearica*.

Tous les Oiseaux de cette section ont la tête ornée d'une hupe composée de plumes ressemblantes à des racines de Chiendent.

Omnes hujus sectionis Alites in capite ornantur corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ.

LXXXIV.

LXXXIV.

Genus Balearicæ.

Le genre de l'Oiseau-royal.

Hujus character est
 Digiti quatuor, membranis
 destituti; tres scilicet an-
 tici, posticus unus:

Son caractere est d'avoir
 Quatre doigts, dénués de
 membranes; trois devant,
 un derriere:

Crura in parte inferiore plu-
 mis denudata:

La partie inférieure des jambes
 dénuée de plumes:

Rostrum breve, rectum,
 apice conicum:

Le bec court, droit & coni-
 que vers le bout:

Caput ornatum corollâ plu-
 mis, Graminis radicum
 æmulis, conflatâ.

La tête ornée d'une hupe com-
 posée de plumes ressemblan-
 tes à des racines de Chien-
 dent.

** I. L'OISEAU-ROYAL.

Voyez la femelle Pl. XLI.

Balearica cinereo-coerulescens (*mas*) nigricans, ad viride
 vergens (*fœmina*); vertice splendide nigro; capite ad la-
 tera nudo, candido, rubro adumbrato; tectricibus alarum
 albis; remigibus minoribus castaneis, majoribus, rectrici-
 busque nigricantibus BALEARICA.

Grus Balearica. *Jonst. Avi. pag. 116. maris & fœminæ icones ab Aldro-
 vando mutuata Tab. 54.*

*Charlet. Exer. pag. 114. N^o. 1. hujus icon satis accurata (rostro excepto)
 pag. 115.*

Charlet. Onomazt. pag. 110. N^o. 1.

Grus Balearica Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 361. icones non satis
 accurata, maris pag. 362, & fœminæ pag. 363.*

Grus Balearica Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 201. hujus icon satis
 accurata Tab. XLVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 95. N^o. 3.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 314. N^o. 1.

Grus Balearica vel Japonica. *Mus. Besl. pag. 36. N^o. 5. capitis icon minùs
 accurata Tab. IX. N^o. 5.*

- Grus Balearia, Aldrovandi, Willughbeji. *Klein. Avi. pag. 121. N^o. 3.*
 Grus Capensis fulca, capite aureo galeato. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon
 pessima Tab. LXXXVI. fig. 9.*
 Ciconia. *Moehr. Avi. Gen. 83.*
 Ardea cristata fetosa erecta, temporibus palearibusque binis nudis. Ardea
 pavonina. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 76. sp. 1.*
 Struthio ex China, *Vischer. Klein.*
 Pavo excinereo fuscus, pappo deaurato coronatus. *Barr. Ornith. Class. IV:
 Gen. XII. sp. 4.*
 Pavo nigricans, brevicaudus, pappo rariori coronatus. *Barr. Ornith.
 Class. IV. Gen. XII. sp. 5. (famina).*
 Pavo sine cauda Chinensis. *Jonst. Avi. hujus icon satis accurata (exceptis
 capite & corollâ) Tab. XXI.*
 Pavo Chinensis sine cauda. *Charlet. Exer. pag. 80. N^o. 3.
 Charlet. Onomazt. pag. 72. N^o. 3.*
 Pavo cauda brevi. *Linn. Systh. Nat. ed. 6. Gen. 65. sp. 2.*
 Pavo marinus. *Clus. exot. Lib. V. cap. XI. pag. 105, in qua capitis icon
 minus accurata.*
 Oiseau-royal. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 201; avec une
 assez bonne figure Pl. 28.*
 Grue panachée de l'Afrique. *Edwards. Tom. IV. pag. CXCII; avec des
 figures assez exactes du mâle & de la femelle Pl. 192.*
 Paon. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 145; avec une figure
 tirée de Jonston pag. 164. N^o. 2.*
 Les Anglois l'appellent CROWNED AFRICAN CRANE. *Edwards.*

Il est à peu près de la grosseur du Héron hupé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds huit pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces six lignes; son pied huit pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts

Cum *Ardea cristata* crassitie circiter convenit. Ipsi longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & novem pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes & octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & sex lineas; pes octo pollices & decem lineas; trium digitorum

rum anticorum medius cum ungue tres pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum septem lineis, intimus duos pollices & quatuor lineas; posticus autem unum tantum pollicem. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & sex pollicum intervallo distant, alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis verticem, à syncipite versùs occipitium usque, cooperiunt pennæ tactu mollissimæ, nigra, holoserici villosi instar splendentes: nigredo autem utrinque ducitur, & ponè utramque genam strictram efficit taniam, sub gutture protensam. Caput ad latera plumis denudatur, & cute solummodo obducitur candidâ, in utraque extremitate aliquo rubore adumbratâ. Sub gutture quædam extat membrana carnosa, rugosa, eleganti rubedine tincta: quæ in quibusdam individuis satis amplam obtinet crassitiem, dum est in aliis valdè exigua. Ab occipitio copiosus oritur fascis pennarum, Graminis radices satis benè referentium: quæ pennæ quatuor pollicum lon-

antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces six lignes, l'extérieur deux pouces sept lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derrière un pouce seulement. Il a cinq pieds six pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert, depuis le synciput jusque vers l'occiput, de plumes très-douces au toucher & d'un noir de velours: cette couleur descend de chaque côté, & forme derrière chaque joue une bande assez étroite, qui s'étend jusque sous la gorge. Les côtés de la tête sont dégar nis de plumes, & couverts seulement d'une peau blanche, nuancée d'une légère teinte de rouge aux deux extrémités. Sous la gorge est une espèce de membrane charnue, raboteuse & d'un beau rouge: cette membrane est assez considérablement grosse dans quelques individus, & fort petite dans d'autres. De l'occiput part un gros faisceau de plumes, qui ressemblent assez bien à des racines de Chiendent: elles ont jusqu'à quatre pouces de longueur, & forment une belle hupe. Chacune de ces plumes n'est autre chose qu'une tige

rouffâtre, fort applatie, contournée en forme de viz, & garnie de quelques barbes très-clair-semées, lesquelles sont blanches vers l'origine de la plume, & noires dans le reste de sa longueur. Le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un cendré-bleuâtre dans le *mâle*, & d'un noirâtre tirant sur le verd dans la *femelle*. Les plumes qui couvrent le col, surtout celles dont il est garni dans le bas de sa partie inférieure, sont très-longues, très-étroites, se terminent en pointe, & retombent sur la poitrine : car quelques-unes ont jusqu'à sept pouces de longueur. Toutes les couvertures du dessous des aîles, ainsi que les petites du dessus, sont blanches : les grandes du dessus les plus proches du corps sont rouffâtres : & les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette dernière couleur : les moyennes sont de couleur de marron. De ces dernières, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plu-

gitudinem obtinent, elegantemque cristam efformant. Ex istis autem pennis quælibet scapo constat rufescente, valdè plano, spiræ in modum intorto, & quibusdam pinnulis rarissimis, versus pennæ exortum candidis, in reliqua longitudine nigris, obsito. Collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores in *mare* ex cinereo coerulescunt, in *femina* verò nigricant, & ad viride vergunt. Pennæ collum obtegentes, istæ præsertim quibus obsita est colli inferioris pars infima, sunt longissimæ, strictissimæ, in acumen desinentes & pectori incumbentes : quædam enim septem pollicum longitudine pollent. Tectrices alarum inferiores omnes, sicut & superiores minores, albet : superiores majores corpori finitimæ rufescunt : majores à corpore remotiores nigricant. Remiges majores sunt quoque nigricantes : minores castaneo imbutæ colore. Ex minoribus autem corpori viciniore maxiam obtinent longitudinem, & dum ala complica-



Royal, femelle.





Desriés et Gravé par Martinet.

Oiseau-Royal, femelle.



tur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Oculorum irides eleganter cinereo - albæ. Rostrum griseo-fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinereo-nigricantes; ungues verò penitus nigricant. Habitat in *Africa & Balearibus Insulis. Ex museo Realmuriano.*

mes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. L'iris des yeux est d'un joli gris-blanc. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un cendré-noirâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Afrique & dans les Isles Baléares. Du cabinet de M. de Reaumur.*

SECTIO XI.

SECTION XI.

Eæ quæ rostrum habent conico-incurvum.

Ceux qui ont le bec en cône courbé.

HÆC sectio binis conflatur generibus Avium, alis à se invicem discrepantium. Aliæ enim alis donantur inermibus, ut *Cariama*: aliæ alis corniculis sive calcaribus binis in parte anteriore armatis præditæ sunt, ut *Anhima*.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par leurs aîles. Les uns ont les aîles sans armes, comme le *Cariama*: & les autres ont les aîles armées de deux especes de cornes ou d'éperons placés dans la partie antérieure, comme le *Kamichy*.

Hujus novissimi generis Aves corniculum cylindraceum antrorsum arcuatum in fronte gerunt.

Les Oiseaux de ce dernier genre portent sur le front une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant.

Le genre du Cariama. (1).

Genus Cariamæ. (1).

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de
membranes; trois devant,
un derrière :

La partie inférieure des jambes
démunie de plumes :

Le bec en cône courbé :

Les ailes point armées.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis
destituti; tres scilicet an-
tici, posticus unus :

Crura in parte inferiore plu-
mis denudata :

Rostrum conico-incurvum :

Alæ inermes.

(1) *Cariama*, nom que les *Brafilien*s
donnent à l'espece de ce genre.

(1) *Cariama*, nomen hujus generis
speciei à *Brafilien*sibus inditum.

I. LE CARIAMA.

Cariama cristata, grisea, fusco & rufescente varia; cristâ ni-
grâ, cinereo variegatâ; remigibus majoribus, rectricibus-
que fuscis, griseo & rufescente variegatis
CARIAMA.

*Cariama. Pison. Hist. Nat. pag. 81, in qua hujus icon à Marcgravio mu-
tuata.*

*Cariama Brafilien*sibus. *Marcgr. Hist. Br. pag. 203, in qua hujus icon
non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 138. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 59.

*Cariama Brafilien*sibus *Marcgravii. Willugh. Ornith. pag. 202. hujus icon
à Marcgravio mutuata Tab. LI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 96. N^o. 6.

*Les Brafilien*s l'appellent CARIAMA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Il est à peu près de la gran-
deur du *Héron*. Son bec est
court : ses jambes & ses pieds
sont fort longs, ainsi que ses
doigts ; il faut cependant en
excepter celui de derrière, qui
est court & placé plus haut que

Ardeam magnitudine cir-
citer adæquat. Rostrum ha-
bet breve : crura & pedes,
sicut & digitos, longissimos ;
attamen excipiendus est pos-
ticus digitus, qui brevis est,
& aliùs quàm in *Ardeis*

collocatus; ita ut, ambulando, tribus tantum digitis anterioribus incedat. Crura sunt per mediam ipsarum longitudinem plumis nudata. Trium digitorum anteriorum medius duobus digitis lateralibus coadunatur membranâ ad primum circum articulum usque productâ. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multum protenduntur. In syncipite, immediatè supra rostri exortum, erigitur crista pennis conflata nigris, cinereo variis. Caput, guttur, collum, universumque corpus obtinent pennæ griseæ, fusco & pauco rufescente variegatæ. Scapulares, quæ alas supernæ & infernæ cooperiunt, rectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Alarum remiges majores tingit color fuscus, rufescente & griseo variegatus: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt rectrices fusæ, griseo & rufescente variegatæ. Oculorum pupilla nigra: ipsorum

dans les *Hérons*; de façon qu'en marchant il ne s'appuie que sur les trois doigts de devant. Les jambes sont dégarnies de plumes dans la moitié de leur longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec les deux latéraux par une membrane, qui s'étend environ jusqu'à la première articulation. Ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origine de la queue. Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du bec, s'élève une hupe composée de plumes noires, variées de cendré. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes grises, variées de brun & d'un peu de rouffâtre. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des ailes, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aile sont d'un brun varié de rouffâtre & de gris: les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernières, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aile est pliée, presque aussi loin que les plus grandes plumes de l'aile. La queue est composée de plumes brunes, variées de gris & de

rouffâtre. La prunelle des yeux est noire : leur iris est de couleur d'or. Le bec est d'un jaunâtre rembruni. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds font d'un jaune obscur ; & les ongles bruns. On le trouve au *Brefil*.

irides aureo colore imbutæ; Rostrum ex flavicante fuscescit. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt obscurè flavi; ungues verò fusci. Habitat in *Brafilia*.

LXXXVI.

Le Genre du Kamichy. (1).

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derrière :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec en cône courbé :

Une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant sur le front :

Les ailes armées de deux espèces de cornes ou d'éperons dans la partie antérieure.

(1) *Kamichy*, nom que les habitans de la *Guiane* donnent à l'espèce de ce genre.

LXXXVI.

Genus Anhimæ. (1).

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet anteriori, posteriori unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Rostrum conico-incurvum :
Corniculum cylindraceum antrosum arcuatum in fronte :

Alæ corniculis sive calcariibus binis in parte anteriore armatæ.

(1) *Anhima*, nomen hujus generis speciei à *Brasiliensibus* inditum.

** I. LE KAMICHY.

Anhima nigricans, albo variegata ; vertice ex albo & nigro vario ; collo infimo & pectore cinereo, albo & nigro variegatis ; ventre albo ; remigibus, rectricibusque nigricantibus ANHIMA.

Anhima Brasiliensibus. Marcgr. Hist. Br. pag. 215, in qua hujus icon satis accurata (rostro excepto).

Jonst. Avi. pag. 147. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. 61.

Anhima Brasiliensium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag. 202. hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 96. N^o. 7.

Anhyma. Pison. Hist. Nat. pag. 91, in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.

Aquila Americana, nigra, aquatica, maxima, cornuta. Barr. Ornith. Class. III. Gen. IV. sp. 4.

Aquila aquatica, cornuta. Barr. Hist. Fr. Eq. pag. 124.

Avis quædam ex rapacibus. Jonst. Avi. pag. 125.

Palamedæa. Moehr. Avi. Gen. III.

Bambiaya. Joan. de Laët. Nov. orb. pag. 13.

Cahuitahu. Comdam. Voy. des Amazo. pag. 174.

Les Habitans de la Guiane l'appellent KAMICHY. Barr.

Les Brasiliens, ANHIMA. Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. CAHUITAHU. Comdam.

Cignum crassitie paululùm antecellit. Ipsiùs longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes duos pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes & quatuor pollices. Rostrium ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & tres lineas longum est; cauda decem pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices; pes quinque pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & sex lineas, extimus tres pollices cum sex lineis, intimus tres pollices & quatuor lineas; posticus autem unum pollicem cum decem lineis. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & decem pollicum in-

Il est un peu plus gros qu'un *Cigne*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; sa queue dix pouces; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, deux pouces; son pied cinq pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces six lignes, l'extérieur trois pouces six lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes; & celui de derrière un pouce dix lignes. Il a cinq pieds dix pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'à la moitié de la longueur

de la queue. Sur le bord de chaque aîle, un peu au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, sont deux especes de cornes ou d'éperons, gros comme le bout du petit doigt, dont le supérieur est long d'un pouce, & l'inférieur de neuf lignes seulement : ils ont à peu près la figure d'une pyramide triangulaire, dont le sommet est un peu obtus ; & sont d'un gris-brun. La petite corne cylindrique qu'il porte sur le front, a deux pouces trois lignes de longueur, environ deux lignes de diametre, & est blanchâtre. Le sommet de la tête est varié de blanc & de noir. Le reste de la tête, la partie du col qui en est la plus voisine, & la gorge sont noirâtres. La partie du col qui est la plus proche du corps, & la poitrine sont variées de cendré, de blanc & de noir. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, celles du dessus de la queue, le haut des jambes & les côtés sont noirâtres, & variés d'un peu de blanc. Le ventre est entièrement blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est varié de blanc-rouffâtre. Les plumes de

tervallo distant ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. In utriusque alæ margine, paulò infra articulum carpo humano respondentem, bina extant cornicula sive calcaria, minimi digiti extremitatis crassitie æmula, quorum superius pollicis unius longitudinem æquat, inferius verò novem tantùm lineas longum est : quæ calcaria figuram pyramidalem triangularem, apice nonnihil obtuso donatam, circiter æmulantur ; & griseo-fusco colore imbuuntur. Corniculum cylindraceum quod in fronte gerit, duos pollices & tres lineas longum est, ipsiusque diameter binas circiter lineas æquat : candicante imbuatur colore. Summum caput albo & nigro variegatur. Reliquum caput, pars colli ipsi finitima, gutturque nigricant. Pars colli corpori vicinior & pectus cinereo, albo & nigro variegantur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne & infernè cooperientes, superiores caudæ tectrices, crurum suprema pars & latera nigricant, & pauco albo variegantur. Venter & inferior

res caudæ tectrices penitus albicant. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, sunt albo-rufescente variæ. Remiges nigricantes. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Palpebræ, oculorumque pupilla nigræ: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci; ungues verò nigricantes. Semper mas & foemina junctim incedunt. E luto nidum construunt, illumque ad caudices arborum super terram ædificant. Habitat in *Brasilia & Guiana*. Una à *Cayana* in *musæum Realmurianum* missa est à *D. Artur*.

l'aîle font noirâtres. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Les paupières & la prunelle des yeux sont noires: leur iris est de couleur d'or. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns; & les ongles noirâtres. On trouve toujours le mâle & la femelle ensemble. Ils construisent leur nid avec de la boue, & le placent par terre au pied des arbres. On les trouve au *Bresil* & dans la *Guiane*. *M. de Reaumur* en a reçu un de *Cayenne*, qui lui a été envoyé par *M. Artur*.

SECTIO XII.

SECTION XII.

Eæ quæ rostrum habent conicum, lateraliter compressum.

Ceux qui ont le bec en cone aplati par les côtés.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Porphyronis*.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Poule-sultane*.

Omnes hujus generis Aves calvitio in fronte donantur.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le front chauve.

LXXXVII.

LXXXVII.

Le genre de la Poule-Sultane.

Genus Porphyronis.

Son caractère est d'avoir
Quatre doigts, dénués de mem-
branes ; trois devant , un
derrière :

La partie inférieure des jam-
bes dénuée de plumes :

Le bec en cône aplati par les
côtés :

Le front chauve.

Hujus character est
Digiti quatuor , membranis
destituti ; tres scilicet an-
tici , posticus unus :

Crura in parte inferiore plu-
mis denudata :

Rostrum conicum , laterali-
ter compressum :

Calvitium in fronte.

** 1. LA POULE-SULTANE.

Voyez Pl. XLII. Fig. 1.

Porphyrio superne obscurè viridis , infernè splendidè viola-
ceus ; calvitio in fronte saturatè rubro ; capite & collo su-
perioribus splendidè violaceis ; genis , gutture & collo in-
feriore cœruleo-violaceis ; tectricibus caudæ inferioribus
albis ; rectricibus obscurè viridibus PORPHYRIO.

Porphyrio cœsius , pedibus & rostro sanguineis. *Barr. Ornith. Class. III.*
Gen. XXXIV. sp. 3.

Porphyrio. *Gesn. Avi. pag. 716. hujus icon satis accurata (exceptis*
pedibus) pag. 717.

Aldrov. Avi Tom. III. pag. 437. hujus icones minimè accurata pag. 439
& 440.

Clus. Exot. Auctuar. pag. 370.

Willugh. Ornith. pag. 238.

Raj. Syn. Avi. pag. 116. N^o. 13.

Porphyrio. *Gesn. icon. Avi. pag. 126 , in qua hujus icon satis accurata*
(exceptis pedibus).

Jonst. Avi. pag. 106. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. 52.

Charlet. Exer. pag. 110. N^o. VI.

Charlet. Onomazt. pag. 104. N^o. VI.

Rallus aquaticus , rostro , fronte , pedibusque rubris ; reliquo corpore
cyaneò , sub cauda plumis albis. *Klein. Avi. pag. 104. N^o. 6.*

Fulica fronte calva, corpore violaceo, digitis simplicibus. Porphyrio.

Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 82. sp. 3.

Quachilton. *Euf. Nieremb. pag. 217.*

Quachilton, seu Avis filiquastrini capitis. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag. 20. cap. XXVI.*

Quachilto, seu Avis filiquastrini capitis. *Jonst. Avi. pag. 127.*

Quachilto, sive Porphyrio Americanus Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag. 238.*

Quachilto, sive Porphyrio Americanus Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag. 116. N^o. 14.*

Porphyrio. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag. 226.*

Bel. Port. d'Ois. pag. 52 a, dans laquelle il y a une mauvaise figure.

Oiseau pourpré ou Porphyrio. *Alb. Tom. III. pag. 35; avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl. 84.*

Poule-Sultane. *Hist. de l'Acad. Tom III. Part. III. pag. 51; avec une figure assez exacte Pl. 11.*

Poule-Sultane ou Bluet. *Edwards. Tom. II. pag. LXXXVII; avec une figure exacte Pl. 87.*

Les Grecs l'appellent Πορφυρίων. *Bel. Aldrov.*

Les Espagnols, TELAMON. *Gesn. Aldrov. Jonst. CALAMON. Aldrov.*

Les Catalans, PORC MARI. *Barr.*

Les Allemands, PURPUR-VOGEL; FREMBDER-VOGEL. *Gesn.*

Les Mexiquains, QUACHILTON. *Fern. & quelques-uns, YACACINTLI. Nieremb. Fern. Jonst. Willugh.*

Cum Gallina crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & tres lineas æquat, & ad extremos unguis unum pedem undecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda tres pollices & sex lineas; pars crurum plumis nudata unum pollicem cum septem lineis; pes tres polli-

Elle est à peu près de la longueur d'une Poule. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarinée de plumes, un pouce sept lignes; son pied trois pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec

L'ongle , quatre pouces cinq lignes , l'extérieur trois pouces sept lignes , l'intérieur trois pouces quatre lignes & demie ; & celui de derriere deux pouces trois lignes. Tous ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a deux pieds quatre pouces six lignes de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le front , depuis l'origine du bec jusqu'au milieu du sommet de la tête , est chauve , & couvert d'une membrane épaisse d'un rouge foncé. Le reste du dessus de la tête & la partie supérieure du col sont d'un violet brillant. Le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd sombre , mais brillant. Les côtés de la tête ou les joues , la gorge & la partie inférieure du col sont d'un bleu-violet. La poitrine , le ventre , le haut des jambes & les côtés sont d'un violet éclatant. Les couvertures du dessous de la queue sont blanches. Les petites du dessous des ailes sont d'un violet brillant : les grandes sont d'un cendré-noirâtre. Les petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont d'un

ces & quinque lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum quinque lineis , extimus tres pollices & septem lineas , intimus tres pollices & quatuor cum semi lineas ; posticus autem duos pollices cum tribus lineis. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Frons , ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque , calva est , & membranâ crassâ saturatè rubrâ obducitur. Reliquum caput superius , collumque superius sunt splendidè violacea. Dorsum , uropygium , scapulares pennas & superiores caudæ tectrices tingit color viridis obscurus quidem , sed splendens. Caput ad latera sive genæ , guttur & pars colli inferior sunt cœruleo-violaceæ. Pectus , venter , crurum suprema pars & latera violaceo imbuuntur splendido. Pennæ caudam subtus obtegentes albæ. Inferiores alarum tectrices mi-

nores splendide violaceæ : majores cinereo-nigricantes. Superiores alarum minores, sicut & majores corpori viciniores, splendide violaceæ : majores à corpore remotiores in latere exteriori & apice concolores ; in latere interiore fusco-nigricantes : ex majoribus corpori finitimis quædam insuper eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur. Alarum componunt viginti tres remiges, omnes subter cinereo-nigricantes ; superne verò septemdecim primores sunt in latere exteriori splendide violaceæ, in interiore fusco-nigricantes : decima octava & decima nona concolores, sed exteriori aliquâ viridis tincturâ adumbratæ : quatuor corpori finitimæ virides obscure quidem, sed, dorsi instar, splendentes. Duodecim rectricibus valde obscure viridibus cauda conflatur. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem nonnihil excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utriusque extremam usque breviorē. Oculi sunt nigri : ipsorum irides fulvæ. Rostrum saturatè rubrum. Pars cru-

violet éclatant : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un brun-noirâtre du côté intérieur : de plus quelques-unes des grandes les plus proches du corps sont du même verd que le dos. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, toutes d'un cendré-noirâtre en-dessous ; mais en-dessus les dix-sept premières sont d'un violet éclatant du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre du côté intérieur : la dix-huitième & la dix-neuvième sont de la même couleur ; mais leur côté extérieur est nuancé d'une légère teinte de verd : les quatre plus proches du corps sont d'un verd sombre, mais brillant, comme celui du dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd très-sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont noirs : & leur iris est fauve. Le bec est d'un rouge foncé. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve dans les *Indes Orientales*, & en différens endroits

de l'Amérique, sous la Zone torride. Elle a été envoyée de Cayenne à M. de Reaumur par M. Artur.

rum plumis denudata, pedes, unguisque rubri. Habitat in India Orientali & variis Americae regionibus sub Zona torrida positis. A Cayana in museum Reaumurianum missus à D. Artur.

A. LA POULE-SULTANE A TESTE NOIRE.

Porphyrio melanocephalos.

Poule ou Gallinula palustris. *Feuillee. Journ. des Obs. phys. pag. 288. (éd. 1725).*

Elle est de la même grandeur & de la même grosseur que la précédente. Elle lui ressemble aussi par sa couleur; & n'en diffère que parce qu'elle a la tête noire. On la trouve en Amérique.

Magnitudine & crassitie præcedentem æmulatur. Cum illo colore quoque convenit; & ab eo non discrepat nisi capite nigro. Habitat in America.

** 2. LA PETITE POULE-SULTANE.

Voyez Pl. XLII. Fig. 2.

Porphyrio superne obscurè viridis, infernè splendide violaceus; calvitio in fronte rubro; capite splendide violaceo; collo superiore viridi-coeruleo; rectricibus caudæ inferioribus albis; rectricibus obscurè viridibus. . . . PORPHYRIO MINOR.

Elle est à peu près de la grosseur de la Barge. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de qua-

Crassitie *Limosam* circiter æquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues qua-

tuordecim pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices & undecim lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus viginti quinque lineas; posticus autem unum pollicem & septem lineas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & septem pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Frons, ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque, calva est, & membranâ crassissimâ rubrâ obducta. Reliquum caput, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crurum suprema pars & latera splendido imbuuntur violaceo. Collum superius & ad latera viride, splendidissimo cœruleo adumbratum. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices obscurè quidem, sed

torze pouces onze lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue deux pouces onze lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derrière un pouce sept lignes. Tous ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a un pied sept pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec jusqu'au milieu du sommet de la tête, est chauve, & couvert d'une membrane rouge fort épaisse. Le reste de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un violet éclatant. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un verd nuancé de bleu fort brillant. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd sombre, mais brillant. Les couvertures du dessous de la

queue sont blanches. Les petites du dessous des ailes sont d'un bleu-violet, nuancé de verd : les grandes sont cendrées ; & dans quelques individus elles sont bordées de blanchâtre par le bout. Les plus petites couvertures du dessus des ailes sont d'un verd-bleu : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un verd sombre, mais brillant ; les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & brunes du côté intérieur. L'aile est composée de vingt-trois plumes, toutes cendrées en-dessous ; mais en-dessus les dix-huit premières sont d'un verd nuancé de bleu du côté extérieur, & brunes du côté intérieur : les cinq plus proches du corps sont d'un verd sombre, mais brillant, comme celui du dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est rouge depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est jaune. La partie des jambes

splendidè virides. Pennæ caudam subtus obtegentes albæ. Tectrices alarum inferiores minores cœruleo-violeæ, viridi adumbratæ : majores cineræ, & in quibusdam individuis candicante in apice marginatæ. Superiores alarum minimæ viridi-cœruleæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniores, obscurè quidem, sed splendidè virides : majores à corpore remotiores in latere exteriori & apice concoloræ, in latere interiore fuscæ. Alam componunt viginti tres remiges, omnes subtus cineræ ; superne verò octodecim primores sunt in latere exteriori virides, cœruleo adumbratæ, in interiore fuscæ : quinque corpori finitimæ obscurè virides ; sed, dorfi instar, splendentes. Duodecim reëtrici-bus obscurè viridibus cauda constat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque brevioram. Rostrum ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque rubrum, inde ad apicem luteum. Pars crurum plumis denudata ; pedes,

pedes, unguisque rubri. Præcedentis instar, in *India Orientali & America* habitat. A *Cayana* in *musæum Realmurianum* missus est à *D. Artur.*

qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve, comme la précédente, dans les *Indes Orientales* & en *Amérique*. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

** 3. LA POULE-SULTANE VERTE.

Porphyrio superne obscurè viridis, infernè albus; calvitio in fronte viridi-flavicante; genis candidis; rectricibus obscurè viridibus . . . PORPHYRIO VIRIDIS.

An Porphyrio olivarius, pedibus leucophæis ? *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp. 7.*

Les Catalans l'appellent RASCLET. Barr.

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & sex lineas æquat, & ad extremos unguës quatuordecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus duos pollices & tres lineas; posticus autem oc-

Tom. V.

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derrière un pouce six lignes.

XXX

Tous ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a un pied six pouces de vol ; & ses ailes , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le front , depuis l'origine du bec jusque vers le milieu du sommet de la tête , est chauve , & couvert d'une membrane épaisse d'un verd-jaunâtre. Le reste du dessus de la tête , la partie supérieure du col , le dos , le croupion , les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd sombre , mais brillant. Les côtés de la tête ou les joues , la gorge , la partie inférieure du col , la poitrine , le ventre , le haut des jambes , les couvertures du dessous de la queue , celles du dessous des ailes & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des ailes , ainsi que les grandes les plus proches du corps , sont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout , & d'un cendré-brun du côté intérieur. L'aile est composée de vingt-trois plumes , toutes cendrées en-dessous ; mais en-dessus les dix-huit premières sont d'un verd sombre , mais brillant , du

todecim lineas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis , extremitates majorum remigum unius pedis & sex pollicum intervallo distant , alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Frons , ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque , calva est , & membranâ crassâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput superius , pars colli superior , dorsum , uropygium , pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt obscurè quidem , sed splendidè virides. Caput ad latera sive genæ , guttur , collum inferius , pectus , venter , latera , crurum suprema pars , inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albescunt. Superiores alarum tectrices minores , sicut & majores corpori finitimæ , eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores sunt in latere exteriori & apice eodem colore imbutæ , interiorius verò cinereo-fuscæ. Alam componunt vigintitres remiges , omnes subtus cinereæ ; superne verò octodecim primores sunt in la-

tere exteriorè obscure quidem, sed splendidè virides, in interiorè cinereo-fuscæ: quinque corpori finitimæ in utroque latere eodem viridi imbutæ ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices obscure virides. Binæ intermediæ lateraliū longitudinem paululū excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorè. Rostrum ex viridi flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-flavescentes; ungues verò grisei. Habitat in *India Orientali*, unde in *museum Real-murianum* missus à *D. Bour-gine*.

côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur: les cinq plus proches du corps sont des deux côtés du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un verd-jaunâtre. La partie des jambes qui est dé-garnie de plumes & les pieds sont d'un gris-jaunâtre; & les ongles gris. On la trouve dans les *Indes Orientales*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Bour-gine*.

4. LA POULE-SULTANE BRUNE.

Porphyrio superne fuscus, infernè albus; calvitio in fronte viridi-flavicante; genis candidis; reëtricibus fuscis
PORPHYRIO FUSCUS.

Glottis. *Gesn. icon. Avi. pag. 105, in qua hujus icon pessima.*

Gallinulæ aquaticæ secundum genus, quod Glutt nominant, quasi Glottidem. *Gesn. Avi. pag. 505, in qua eadem icon.*

Gallinula Chloropos Ornithologi, quam apud Germanos Glutt, quasi Glottidem vocari ait. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 452, in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*

Gallinula Chloropus tertia. *Jonst. Avi. pag. 110.*

Porphyrio olivarius pedibus & rostro viridibus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp. 1.*

Les Catalans l'appellent GALLINA SEGA; PULLA D'AIGUA. *Barr.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, GLUTT. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Elle est à peu près de la grosseur & de la grandeur de la précédente. Son front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un verd-jaunâtre. Le reste du dessus de la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessus des ailes sont brunes, & variées à leur extrémité d'un peu de blanc. Les plumes de l'aile sont entièrement brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. Tous les doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne* sur les bords des lacs & des étangs.

Magnitudine & crassitie præcedentem circiter æquat. Frons ipsius calva est, & membranâ crassâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput superius, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ. Scapulares & superiores caudæ teatrices concolores. Caput ad latera sive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albicant. Superiores alarum teatrices sunt fuscæ, paucò albo in extremitate variegatæ. Remiges penitus fuscæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridi-flavicantes; ungues verò grisei. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque directi. Habitat in *Germania*, ibique lacuum & piscinarum ripas frequentat.

5. LA POULE-SULTANE ROUSSATRE.

Porphyrio superne fuscus, marginibus pennarum rufescentibus, infernè rufescens; calvitio in fronte viridi-flavicante; reſtrictibus fuscis, exterius & apice rufescente marginatis....
PORPHYRIO RUFESCENS.

Gallinula terreſtris. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 495, in qua hujus icon à Gefnero mutuata.*

Jonſt. Avi. pag. III. hujus icon à Gefnero mutuata Tab. 31.

Gallinula terreſtris Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag. 236.*

Gallinula terreſtris, quæ vulgò Germanis Heggſchara dicitur. *Gefn. Avi. pag. 496. hujus icon non ſatis accurata pag. 497.*

Trochilus terreſtris, vel Rallus terrenus. *Gefn. icon. Avi. pag. 68, in qua eadem icon.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur l'appellent POLLE. Gefn. Aldrov. Jonſt. Willugh.

Les Allemands, HEGGESCHAER ou HEGGSCHAER; EGGENSCHAER. Gefn. HEGGESCHAR; HEGESAR; EGGENSCHAR. Aldrov. Willugh. & quelques-uns, GROSZ WASSER HEUNLE. Gefn. GROSSE WASSER HUNLE. Aldrov. Willugh.

Præcedentes magnitudine & craſſitie circiter æmulantur. Frons ipſius calva eſt, & membranâ craſſâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput, collum ſuperius, dorſum & uropygium pennis veſtiuntur fuscis, rufescente marginatis. Scapulares, alas ſuperne cooperientes & ſuperiores caudæ teſtrices concolores. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem ſupremam, inferioresque caudæ teſtrices tingit color rufes-

Elle eſt à peu près de la groſſeur & de la grandeur des précédentes. Son front eſt chauve, & couvert d'une membrane épaiſſe d'un verd jaunâtre. Le reſte de la tête, la partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes, bordées de rouſſâtre. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la

queue font rouffâtres. Les plumes de l'aîle sont brunes, & bordées extérieurement de rouffâtre. La queue est composée de douze plumes brunes, bordées pareillement de rouffâtre extérieurement & par le bout. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds font d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. Tous les doigts, qui sont extrêmement longs, sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne*.

cens. Alarum remiges sunt fusca, exterius rufescente fimbriata. Cauda duodecim constat reſtricibus fuscis, rufescente ſimiliter in latere exteriori & in ſuper apice marginatis. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedesque ex viridi flavicant; ungues verò ſunt grisei. Digiſi omnes, qui quidem longiſſimi, ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Habitat in *Germania*.

6. LA POULE-SULTANE ROUSSE.

Porphyrio ſuperne rufus, maculis nigricantibus varius, infernè albus; calvitio in fronte pallidè flavo; palpebris croceis; pennis baſim roſtri ambientibus, & genis candidis; reſtricibus rufis, nigricante maculatis PORPHYRIO RUFUS.

Ochropus magnus. *Gefn. icon. Avi. pag. 103, in qua hujus icon peſſima.*
Gallinula aquatica quartum genus, Schmirring dictum, nobis Ochropus magnus. *Gefn. Avi. pag. 507, in qua eadem icon.*

Gallinula Ochropus major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. hujus icon à Gefnero mutuata pag. 462.*

Jonſt. Avi. pag. 110.

Gallinula Ochropus major Gefnero, Aldrovandi. *Willugh. Orniuh. pag. 236.*

Raj. Syn. Avi. pag. 115. N^o. 6.

Gallinula aquatica Ornithologis; Trochilus junio; aliis Glareola. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag. 281.*

Gallinula aquatica quarta Gefneri; Ochropus magnus ejuſdem; Glareola tertia Schwenckfeldii. *Rzac. Auſt. Hiſt. nat. Pol. pag. 380.*

Glareola tertia. *Schwenck. Avi. Sil. pag. 281.*

Glareola tertia Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag. 101. N^o. 2.*

Les Allemands l'appellent WASSER-HUN. Rzac. GEEL-FEUSSEL. Schwenck.

Les Allemands aux environs de Strasbourg, SCHMIRING. Gefn. Aldrov. Schwenck. Willugh. Rzac.

Les Polonois, KOKOSZKA WODNA. Rzac.

Præcedenti multum crassitie cedit. Frons ipsius calva est, & membranâ crassâ pallidè luteâ obducta. Reliquum caput superius, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt rufæ, maculis nigricantibus variâ. Pennæ basim rostri ambientes, caput ad latera sive genæ, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albescent. Superiores alarum tectrices minores sunt rufæ, maculis nigricantibus, paucis cinereofusco admixto, variegatæ, & rubricæ fabrilis colore in apice fimbriatæ : majores à corpore remotiores concoloræ : majores corpori finitimæ candidæ. Remiges alarum nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices rufæ, nigricante maculatæ. Palpebræ sunt croceo colore imbutæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque pallidè luteum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè lutei ; un-

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Son front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune pâle. Le reste du dessus de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roux varié de taches noirâtres. Les plumes qui entourent la base du bec, les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des ailes sont rousses, variées de taches noirâtres & d'un peu de cendré-brun, & bordées d'un rouge de brique par le bout : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont blanches. Les plumes de l'aile sont noires. La queue est composée de douze plumes rousses, tachetées de noirâtre. Les paupières sont de couleur de safran. Le bec est d'un jaune pâle depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est noir. La partie des jambes qui est dépourvue de plumes, & les pieds sont d'un

jaune pâle ; & les ongles noirs. Tout ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne*.

gues verò nigricantes. Digi-
tati omnes sunt à se invicem ad
exortum usque discreti. Ha-
bitat in *Germania*.

7. LA POULE-SULTANE MOUCHETÉE.

Porphyrio superne fusco-rufescens, maculis partim nigris partim candidis aspersus ; infernè fuscus , calvitio in fronte obscure flavo ; pennis basim rostri ambientibus , genis , gutture & collo inferiore albis ; reatricibus binis intermediis nigris , albo terminatis , lateralibus fuscis PORPHYRIO PUNCTULATUS.

Glareola nona. Schwenck. Avi. Sil. pag. 284.

Glareola nona Schwenckfeldii. Klein. Avi. pag. 101. N^o. 8.

Erythra. Gesn. icon. Avi. pag. 108 , in qua hujus icon non satis accurata.

Erythra , quam Germani Matkern dicunt. Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 466. hujus icon à Gesnero mutuata pag. 467.

Gallinulæ aquaticæ nonum genus quod Erythram nuncupo : vulgus Matkern. Gesn. Avi. pag. 512 , in qua hujus icon non satis accurata.

Gallinula Erythra. Jonst. Avi. pag. 110. hujus icon à Gesnero mutuata Tab. 31.

Gallinula Erythra Gesneri , quam Germani Matkern vocant. Raj. Syn. Avi. pag. 109. N^o. 10.

Gallinula novalis minor. Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 281.

Matkerneltzell Leonardi Baltneri. Willugh. Ornith. pag. 226. hujus icon minimè accurata Tab. LVI.

Cenchramus nonnullis. Schwenck.

Les Allemands l'appellent REIN-VOGEL. Gesn. Aldrov. BRACH-VOGEL ; Rzac. KLEIN BRACH-VOGEL. Schwenck.

Les Allemands aux environs de Strasbourg , MATKERN. Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh.

Les Polonois , SIEWNICZKA ; SIEWKA ; SIEYKA. Rzac.

Elle est à peu près de la longueur du *Râle de Genet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plu-

Cum *Rallo Genistarum* crassitie circiter convenit. Ipsi-
us longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat. Pars crurum plumis denudata ; pedesque ,

pedesque, simul commensurati, septem pollicum longitudinem obtinent. Digiti, qui longiusculi, sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Frons calva est, & membranâ crassâ obscurè flavâ obducta. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufescentes: qui color in dorso & alis maculis partim nigris partim candidis aspergitur. Pennæ basin rostri ambientes, caput ad latera sive genæ, guttur & collum inferius albicant. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices fusco tinguntur colore. Remiges alarum majores sunt nigræ: minores nigricantes. Duodecim rectricibus cauda conflatur: binæ intermediæ nigræ, albo terminatæ: laterales omnes fuscæ. Rostrum obscurè flavum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque grisei. Habitat in *Germania*, ibique paludes frequentat.

mes, & les pieds, joints ensemble, ont sept pouces de long. Ses doigts, qui sont assez longs, sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Le front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune obscur. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des ailes & celles du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre: cette couleur est variée sur le dos & les ailes de taches en partie noires & en partie blanches. Les plumes qui entourent la bête du bec, les côtés de la tête ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un beau blanc. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont bruns. Les grandes plumes de l'aile sont noires: les moyennes sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont noires, & terminées de blanc: toutes les latérales sont brunes. Le bec est d'un jaune obscur. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les pieds & les ongles sont gris. On la trouve en *Allemagne*, où elle se tient dans les marais.

8. LA POULE-SULTANE TACHETÉE.

Porphyrio superne pennis in medio nigris, ad margines fordidè rufis, albo fimbriatis, vestitus, infernè rufescens, lateribus fusco & albo transversim striatis; calvitio in fronte croceo; taniâ utrinque supra oculos cinereo-albâ; gutture cinereo-cœrulescente; collo inferiore & pectore maculis nigris aspersis; marginibus alarum candidis; rectricibus fusco-nigricantibus, rufo adumbratis, binis intermediis albo utrinque fimbriatis PORPHYRIO NÆVIUS.

Gallinulæ aquaticæ tertium genus, quod Deffyt nominatur vulgò, à nobis Poliopus. *Gesn. Avi. pag. 506, in qua hujus icon pessima.*

Poliopus. *Gesn. icon. Avi. pag. 104, in qua eadem icon.*

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 465. hujus icon minùs accurata pag. 466.

Poliopus Gallinula minor Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag. 114. N^o. 5.*

Grinetta, Mediolani Gillerdine, Poliopus Gallinula minor Aldrovandi.

Willugh. Ornith. pag. 235. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVIII.

Petite Poule d'eau. *Alb. Tom. II. pag. 47; avec une figure mal coloriée Pl. 73.*

Les Italiens l'appellent GRINETTA. Raj.

Les Florentins, TORDO GELSEMINO. Willugh.

Les Boulonnois, PORCELLANA. Aldrov.

Les habitans de Mantouë, PORZANA; SCORZANA. Aldrov.

Les Milanois, GILLERDINE. Willugh. Raj. GRUGNETTO; & ailleurs,

GIRARDELLA COLUMBA. Aldrov.

Les Allemands, DEFFYT. Gesn. Aldrov.

Les Anglois, SMALL WATER-HEN. Alb.

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a environ dix lignes de long; sa queue un

Rallo aquatico nonnihil crassitie cedit. Ipsiùs longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices cum tribus lineis. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque decem circiter lineas longum.

est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas: laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Frons, ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque, calva est, & membranâ crassâ croceo colore imbutâ obducta. Reliquum caput & partem colli superiorem obtegunt pennæ in medio nigræ, ad margines rufæ. Quæ dorsum cooperiunt, sicut & scapulares, sunt quoque in medio nigræ, ad margines sordidè rufæ, albo fimbriatæ. Quæ uropygium vestiunt, superioresque caudæ tectrices nigricantes, rufo marginatæ. In utroque capitis latere tænia extat cinereo-alba, prope rostri exortum orta, & supra oculos producta.

pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derrière est le plus court de tous. Tous les doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a quinze pouces de vol; & ses ailes, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le front, depuis l'origine du bec jusque vers le milieu du sommet de la tête, est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune de safran. Le reste de la tête & le dessus du col sont couverts de plumes noires dans leur milieu, & rouffes sur leurs bords. Celles qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont pareillement noires dans leur milieu, ensuite d'un roux sale, & bordées de blanc. Celles qui couvrent le croupion, & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, & bordées de roux. De chaque côté de la tête est une bande d'un gris-blanc, qui part d'après de l'origine du bec, & s'étend au dessus des yeux.

La gorge est d'un cendré-bleuâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre, tout parsemé de taches noires. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont roussâtres. Les côtés sont rayés transversalement de brun & de blanc. Le bord de l'aile, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est blanc. Les couvertures du dessus des ailes sont rousses, & variées de bandes blanches transversales & en zigzags. Les plumes de l'aile sont d'un brun-noirâtre, nuancé de roux : la première est bordée extérieurement de blanc. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des ailes, les deux du milieu seulement étant bordées de blanc des deux côtés. Ces deux dernières sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont petits : leur iris est d'un verd-jaunâtre. Le bec est de la même couleur, laquelle s'obscurcit un peu à l'origine & à l'extrémité du demi-bec supérieur. La partie des jambes qui est dégarinée de plumes, les

Guttur ex cinereo cœrulescit. Pars colli inferior & pectus ex cinereo ad olivaceum vergunt, & maculis asperguntur nigris. Venter, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt rufescentes. Latera fusco & albo transversim striata. Alarum marginēs ab ipsarum exortu ad extremitatem usque candidæ. Superiores alarum tectrices rufæ, tenuis transversis & undatis albis variegatæ. Remiges fusco nigricantes, rufo adumbratæ : ex istis autem prior exteriùs albo marginatur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores, binis tantummodo intermediis albo in utroque latere simbriatis. Quæ binæ novissimè dictæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extremam usque breviorē. Oculi exigui : ipsorum irides viridiflavicantes. Rostrum quoque viridi-flavicans, obscuriùs tamen in exortu & apice mandibulæ superioris. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguesque fordidè virides. Juxta fluviorum & piscinarum ripas versatur,

LES OISEAUX, *Classe III. Ordre XVII.* 541
 & paludes frequentat. pieds & les ongles font d'un
 verd sale. On la trouve sur le
 bords des rivieres & des étangs,
 & dans les marais.

9. LA POULE-SULTANE DE LA BAYE DE HUDSON.

Porphyrio superne fuscus, pennis in medio obscurioribus,
 infernè albo-rufescens, lateribus nigro transversim striatis;
 calvitio in fronte luteo; pennis basim rostri ambientibus, &
 gutture nigris; genis, collo inferiore & pectore cinereo-
 cœrulescentibus; marginibus alarum candidis; rectricibus
 saturatè fuscis, exteriùs fusco dilutiore marginatis . . .
 PORPHYRIO Freti HUDSONIS.

Rallus grisea, fronte nigra, pectore plumbeo, rostro flavo, pedibus
 virescentibus. Rallus Carolinus. *Linn. Systh. Nat. ed. 10. Gen. 83.*
sp. 5.
 Petite Foulque d'eau de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXLIV;*
avec une figure exacte Pl. 144.
Les Anglois l'appellent LITTLE AMERICAN WATER HEN. Edwards.

Præcedentem crassitie cir-
 citer æmulatur. Ipsius lon-
 gitudò ab apice rostri ad
 caudæ extremitatem octo
 circiter pollices explet, &
 ad extremos unguis decem
 pollices. Rostrum ab ipsius
 apice ad oris angulos usque
 undecim lineas longum est;
 cauda sesquipollicem; pars
 crurum plumis denudata sex
 cum semî lineas; pes unum
 pollicem cum quinque li-
 neis; trium digitorum anti-
 corum medius cum ungue
 eandem obtinet longitudi-
 nem; extimus quatuordecim

Elle est à peu près de la gros-
 seur de la précédente. Sa lon-
 gueur depuis le bout du bec jus-
 qu'à celui de la queue est d'en-
 viron huit pouces, & jusqu'à
 celui des ongles de dix pouces.
 Son bec depuis son bout jus-
 qu'aux coins de la bouche a
 onze lignes de long; sa queue
 un pouce six lignes; la partie
 de ses jambes qui est dégarnie
 de plumes, six lignes & demie;
 son pied un pouce cinq lignes;
 celui du milieu des trois doigts
 antérieurs, joint avec l'ongle,
 a aussi un pouce cinq lignes de
 longueur; l'extérieur quatorze

lignes, l'intérieur treize lignes; & celui de derrière sept lignes & demie. Tous ses doigts sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le front est chauve, & couvert d'une membrane jaune fort épaisse. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, dont le milieu est d'une couleur un peu plus obscure. Les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. Les plumes qui entourent la bête du bec, & la gorge sont noires : cette couleur s'étend un peu sur la partie inférieure du col. Les côtés de la tête ou les joues, la partie inférieure & les côtés du col, & la poitrine sont d'un cendré-bleuâtre. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre. Les côtés sont de la même couleur, & rayés transversalement de noir. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & marquées de rayes transversales brunâtres peu apparentes. Le bord de l'aîle, depuis son origine jusqu'à son extrémité, est blanc. Les petites

lineas longus, intimus tredecim lineas; posticus autem septem cum semi lineas. Digni omnes sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Frons calva est, membranâque crassâ luteâ obducta. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fulcæ, in medio obscuriore colore imbutæ. Scapulares, superioresque caudæ tectrices concolores. Pennæ basim rostri ambientes, sicut & guttur, nigræ sunt : quæ nigredo in collo inferiore paululum protenditur. Caput ad latera sive genæ, collum inferius & ad latera, pectusque ex cinereo cœrulescunt. Venter, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes ex albo rufescunt. Latera eodem colore tinguntur, nigroque transversim sunt striata. Inferiores alarum tectrices albicant, tæniisque transversis fuscescentibus parùm conspicuis insigniuntur. Alarum margines ab ipsarum exortu ad extremitatem usque candidæ. Tectrices alarum superiores minores rufescentes : majores

scapularibus concolores. Ex majoribus autem, quæ medium locum occupant, exterius candicante marginantur. Remiges sunt saturatè fuscæ, oris exterioribus fusco dilutiore imbutis : in illis tamen quæ medium locum tenent, oræ exteriores sunt candicantes. Caudam componunt duodecim rectrices saturatè fuscæ, exterius fusco dilutiore marginatæ. Rostrum luteum. Pars crurum plumis denudata, pedes, unguisque viridescentes. Habitat in *Freto Hudsonis*.

couvertures du dessus des ailes sont rouffâtres : les grandes sont de la même couleur que les scapulaires. Parmi ces dernières, celles qui occupent le milieu, sont bordées extérieurement de blanchâtre. Les plumes de l'aile sont d'un brun foncé, & bordées extérieurement de brun plus clair : il faut cependant en excepter celles qui occupent le milieu, qui sont bordées extérieurement de blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun foncé, & bordées extérieurement de brun plus clair. Le bec est jaune. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont verdâtres. On la trouve à la *Baye de Hudson*.

10. LA POULE-SULTANE DE MADRAST.

Porphyrio superne cinereus, infernè albus; calvitio in fronte & genis candidis; collo inferiore & pectore maculis lunulatis nigris aspersis; rectricibus cinereis . . . PORPHYRIO MADERASPATANUS.

Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta. *Raj. Syn. Avi. pag. 194. N^o. 6. hujus icon pessima Tab. I. fig. 4.*

Les Anglois l'appellent MADERAS RAIL-HEN. Raj.

Les Habitans de Malabar, CAUNANGOLY. Raj.

Les Gentils, BOOLLU CORY. Raj.


Magnitudine *Anatem* circiter æquat. Caudam habet brevissimam; rostrum & digitos longiusculos. Digitu au-

Elle est à peu près de la grandeur d'un *Canard*. Sa queue est fort courte. Son bec & ses doigts sont assez longs. Ces

derniers sont entièrement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Son front est chauve, & couvert d'une membrane blanche fort épaisse. Le reste du dessus de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un joli cendré. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs : cette couleur est variée à la partie inférieure du col & sur la poitrine de taches noires en forme de croissant. Les plumes de l'aîle sont cendrées, & bordées extérieurement de noir. La queue est composée de douze plumes cendrées. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On la trouye aux environs de *Madraſt*.

tem sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Frons calva est, membranâque crassissimâ candidâ obducta. Reliquum caput superius, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ rectrices eleganti cinereo tinguntur. Caput ad latera sive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ rectrices alben: in collo inferiore autem & pectore albedinem variant maculæ lunulata nigra. Remiges alarum cineræ, exterius nigro fimbriatæ. Duodecim rectricibus cinereis cauda constat. Cujus coloris sint rostrum, pedesque, penitus me latet. Circa *Maderaspatanum* habitat.

Fin du Tome cinquième.



2. Petite Poule - Sultane.




Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Poule - Sultane.

2. Petite Poule - Sultane.



INDEX TABLE

Avium in quinto volumine contentarum, secundum ordinem in quo disponuntur.

Des Oiseaux contenus dans le cinquième volume, selon l'ordre dans lequel ils sont rangés.

ORDO XV.

SECTIO I.

LXII. *Genus Struthionis.*

1. **S**truthio.

SECTIO II.

LXIII. *Genus Rheæ.*

1. Rhea.

LXIV. *Genus Casuarii.*

1. Casuarius.

SECTIO III.

LXV. *Genus Raphi.*

1. Raphus.

ORDO XVI.

SECTIO I.

LXVI. *Genus Otidis.*

1. Otis.
2. Otis minor, *Anas campestris vulgò dicta.*
3. Otis Arabica.

5

ORDRE XV.

SECTION I.

LXII. *Genre de l'Autruche.*

1. **L**'Autruche.

SECTION II.

LXIII. *Genre du Thouyou.*

1. Le Thouyou.

LXIV. *Genre du Casoar.*

1. Le Casoar.

SECTION III.

LXV. *Genre du Dronte.*

1. Le Dronte.

ORDRE XVI.

SECTION I.

LXVI. *Genre de l'Outarde.*

1. L'Outarde.
2. La petite Outarde, appelée vulgairement *Cannepetière.*
3. L'Outarde d'Arabie.

a

SECTION II.

LXVII. *Genre de l'Echasse.*

1. L'Echasse.
2. L'Echasse du Mexique.

LXVIII. *Genre de l'Huitrier.*

1. L'Huitrier, appelé vulgairement Pie de Mer.

SECTION III.

LXIX. *Genre du Pluvier.*

1. Le Pluvier doré.
2. Le petit Pluvier doré.
3. Le Pluvier doré de S. Domingue.
4. Le Pluvier doré de la Baye de Hudson.
5. Le petit Pluvier ou le Guignard.
6. Le Guignard d'Angleterre.
7. Le Pluvier à collier.
8. Le petit Pluvier à collier.
9. Le Pluvier à collier de Virginie.
10. Le Pluvier à collier de S. Domingue.
11. Le Pluvier à collier de la Jamaïque.
12. Le grand Pluvier, appelé vulgairement Courly de terre.
13. Le grand Pluvier de Bengale.
14. Le Pluvier hupé de Perse.
15. Le Pluvier armé du Sénégal.

SECTIO II.

LXVII. *Genus Himantopi.*

1. Himantopus.
2. Himantopus Mexicanus.

LXVIII. *Genus Ostralega.*

1. Ostralega, Pica marina vulgò dicta.

SECTIO III.

LXIX. *Genus Pluvialis.*

1. Pluvialis aurea.
2. Pluvialis aurea minor.
3. Pluvialis Dominicanensis aurea.
4. Pluvialis aurea Freti Hudsonis.
5. Pluvialis minor sive Morinellus.
6. Morinellus Anglicanus.
7. Pluvialis torquata.
8. Pluvialis torquata minor.
9. Pluvialis Virginiana torquata.
10. Pluvialis Dominicanensis torquata.
11. Pluvialis Jamaicensis torquata.
12. Pluvialis major, Oedicnemus vulgò dicta.
13. Pluvialis Bengalensis major.
14. Pluvialis Persica cristata.
15. Pluvialis Senegalensis armata.

ORDO XVII.

SECTIO I.

LXX. *Genus Vanelli.*

1. Vanellus.
2. Vanellus griseus.
3. Vanellus varius.
4. Vanellus Helveticus.
5. Vanellus Bononiensis major.
6. Vanellus Senegalensis armatus.
7. Vanellus Ludovicianus armatus.
8. Vanellus Dominicensis armatus.

LXXI. *Genus Jacanæ.*

1. Jacana.
2. Jacana armata.
3. Jacana armata nigra.
4. Jacana armata fusca.
5. Jacana armata varia.

SECTIO II.

LXXII. *Genus Arenariæ.*

1. Arenaria.
2. Arenaria cinerea.

SECTIO III.

LXXIII. *Genus Glareolæ.*

1. Glareola.
2. Glareola torquata.
3. Glareola nævia.

ORDRE XVII.

SECTION I.

LXX. *Genre du Vanneau.*

1. Le Vanneau.
2. Le Vanneau gris.
3. Le Vanneau varié.
4. Le Vanneau de Suisse.
5. Le grand Vanneau de Bologne.
6. Le Vanneau armé du Sénégal.
7. Le Vanneau armé de la Louisiane.
8. Le Vanneau armé de S. Domingue.

LXXI. *Genre du Jacana.*

1. Le Jacana.
2. Le Jacana armé ou le Chirurgicalien.
3. Le Chirurgicalien noir.
4. Le Chirurgicalien brun.
5. Le Chirurgicalien varié.

SECTION II.

LXXII. *Genre du Coulon-chaud.*

1. Le Coulon-chaud.
2. Le Coulon-chaud cendré.

SECTION III.

LXXIII. *Genre de la Perdrix-de-mer.*

1. La Perdrix-de-mer.
2. La Perdrix-de-mer à collier.
3. La Perdrix-de-mer tachetée.

4. La Perdrix-de-mer du Sénégal.

4. *Glareola Senegalensis.*

SECTION IV.

SECTIO IV.

LXXIV. *Genre du Râle.*LXXIV. *Genus Ralli.*

1. Le Râle d'eau.
2. Le petit Râle d'eau ou la Marouïette.
3. Le Râle de Genet ou Roi de Cailles.
4. Le Râle des Philippines.
5. Le Râle rayé des Philippines.
6. Le Râle à collier des Philippines.
7. Le Râle brun des Philippines.
8. Le Râle de Virginie.

1. *Rallus aquaticus.*
2. *Rallus aquaticus minor* sive *Maruëta.*
3. *Rallus Genistarum* sive *Oryzometra.*
4. *Rallus Philippensis.*
5. *Rallus Philippensis striatus.*
6. *Rallus Philippensis torquatus.*
7. *Rallus Philippensis fuscus.*
8. *Rallus Virginianus.*

SECTION V.

SECTIO V.

LXXV. *Genre du Beccasseau.*LXXV. *Genus Tringæ.*

1. Le Beccasseau, appelé vulgairement Cul-blanc.
2. La Guignette.
3. Le Chevalier.
4. Le Chevalier rouge.
5. Le Chevalier rayé.
6. Le Chevalier tacheté.
7. Le Chevalier cendré.
8. Le Chevalier blanc.
9. Le Chevalier de Bengale.
10. L'Alouette-de-mer.
A. *La petite Alouette-de-mer.*
11. L'Alouette-de-mer à collier.
12. L'Alouette-de-mer de S. Domingue.
13. La petite Alouette-de-mer de S. Domingue.
14. La Maubéche.
15. La Maubéche tachetée.

1. *Tringa.*
2. *Guinetta.*
3. *Totanus.*
4. *Totanus ruber.*
5. *Totanus striatus.*
6. *Totanus nævius.*
7. *Totanus cinereus.*
8. *Totanus candidus.*
9. *Totanus Bengalensis.*
10. *Cinclus.*
A. *Cinclus minor.*
11. *Cinclus torquatus.*
12. *Cinclus Dominicanensis.*
13. *Cinclus Dominicanensis minor.*
14. *Calidris.*
15. *Calidris nævia.*

- 16. *Calidris grisea.*
- 17. *Calidris grisea minor.*
- 18. *Pugnax.*
- 19. *Merula aquatica.*
- 20. *Turdus aquaticus.*
- 21. *Canutus.*

- 16. La Maubéche grise.
- 17. La petite Maubéche grise.
- 18. Le Combattant ou Paon-de-mer.
- 19. Le Merle-d'eau.
- 20. La Grive-d'eau.
- 21. Le Canut.

LXXVI. *Genus Limosæ.*

- 1. *Limosa.*
- 2. *Limosa grisea.*
- 3. *Limosa grisea major.*
- 4. *Limosa fusca.*
- 5. *Limosa rufa.*
- 6. *Limosa rufa major.*
- 7. *Limosa Americana rufa.*
- 8. *Limosa candida.*

LXXVI. *Genre de la Barge.*

- 1. La Barge.
- 2. La Barge grise.
- 3. La grande Barge grise.
- 4. La Barge brune.
- 5. La Barge rousse.
- 6. La grande Barge rousse.
- 7. La Barge rousse d'Amérique.
- 8. La Barge blanche.

LXXVII. *Genus Scolopacis.*

- 1. *Scolopax.*
A. *Scolopax candida.*
- 2. *Gallinago.*
- 3. *Gallinago minor.*
- 4. *Gallinago Maderaspatana.*
- 5. *Gallinago Anglicana.*

LXXVII. *Genre de la Beccaffe.*

- 1. La Beccaffe.
A. *La Beccaffe blanche.*
- 2. La Beccaffine.
- 3. La petite Beccaffine.
- 4. La Beccaffine de Madras.
- 5. La Beccaffine d'Angleterre.

SECTION VI.

SECTION VI.

LXXVIII. *Genus Numeni.*

- 1. *Numenius.*
A. *Numenius candidus.*
- 2. *Numenius minor.*
- 3. *Numenius Madagascariensis.*
- 4. *Numenius viridis.*
- 5. *Numenius castaneus.*
- 6. *Numenius Americanus fuscus.*
- 7. *Numenius Mexicanus varius.*

LXXVIII. *Genre du Courly.*

- 1. Le Courly.
A. *Le Courly blanc.*
- 2. Le petit Courly ou le Corlieu.
- 3. Le Courly de Madagascar.
- 4. Le Courly verd.
- 5. Le Courly marron.
- 6. Le Courly brun d'Amérique.
- 7. Le Courly varié du Mexique.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 8. Le grand Courly d'Amérique. | 8. Numenius Americanus major. |
| 9. Le petit Courly d'Amérique. | 9. Numenius Americanus minor. |
| 10. Le Courly blanc du Brésil. | 10. Numenius Brasiliensis candidus. |
| 11. Le Courly brun du Brésil. | 11. Numenius Brasiliensis fuscus. |
| 12. Le Courly rouge du Brésil. | 12. Numenius Brasiliensis coccineus. |
| 13. L'Ibis. | 13. Ibis. |
| 14. L'Ibis blanc. | 14. Ibis candida. |

SECTION VII.

LXXIX. *Genre de la Spatule.*

1. La Spatule.
2. La Spatule couleur de rose.
3. La Spatule rouge.

SECTION VIII.

LXXX. *Genre de la Cigogne.*

1. La Cigogne brune.
2. La Cigogne blanche.
3. La Cigogne d'Amérique.
4. La Cigogne du Brésil.
5. La Cigogne de la Guiane.
6. La Grue.
7. La Grue des Indes Orientales.
8. La Grue du Mexique.
9. La Grue du Japon.
10. La Grue d'Amérique.
11. La Grue de la Baye de Hudson.
12. La Grue de Numidie, appelée vulgairement Demoiselle de Numidie.

LXXXI. *Genre du Héron.*

1. Le Héron.

SECTIO VII.

LXXIX. *Genus Platea.*

1. Platea.
2. Platea rosea.
3. Platea coccinea.

SECTIO VIII.

LXXX. *Genus Ciconia.*

1. Ciconia fusca.
2. Ciconia alba.
3. Ciconia Americana.
4. Ciconia Brasiliensis.
5. Ciconia Guianensis.
6. Grus.
7. Grus Orientalis Indica.
8. Grus Mexicana.
9. Grus Japonensis.
10. Grus Americana.
11. Grus Freti Hudsonis.
12. Grus Numidica, Virgo Numidica vulgò dicta.

LXXXI. *Genus Ardea.*

1. Ardea.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 2. Ardea cristata. | 2. Le Héron hupé. |
| 3. Ardea Cayanensis cristata. | 3. Le Héron hupé de Cayenne. |
| 4. Ardea cinerea. | 4. Le Héron cendré. |
| 5. Ardea Mexicana cinerea. | 5. Le Héron cendré du Mexique. |
| 6. Ardea Americana cinerea. | 6. Le Héron cendré d'Amérique. |
| 7. Ardea Freti Hudsonis. | 7. Le Héron de la Baye de Hudson. |
| 8. Ardea nævia. | 8. Le Héron tacheté. |
| 9. Ardea grisea. | 9. Le Héron gris. |
| 10. Ardea Virginiana cristata. | 10. Le Héron hupé de Virginie. |
| 11. Ardea Mexicana cristata. | 11. Le Héron hupé du Mexique. |
| 12. Ardea purpurascens. | 12. Le Héron pourpré. |
| 13. Ardea Mexicana purpurascens. | 13. Le Héron pourpré du Mexique. |
| 14. Ardea cristata purpurascens. | 14. Le Héron pourpré hupé. |
| 15. Ardea candida. | 15. Le Héron blanc. |
| 16. Egretta. | 16. L'Aigrette. |
| 17. Ardea Brasiliensis candida. | 17. Le Héron blanc du Brésil. |
| 18. Ardea Carolinensis candida. | 18. Le Héron blanc de la Caroline. |
| 19. Ardea Mexicana candida. | 19. Le Héron blanc du Mexique. |
| 20. Ardea candida minor. | 20. Le petit Héron blanc. |
| 21. Ardea nigra. | 21. Le Héron noir. |
| 22. Ardea nigra torquata. | 22. Le Héron noir à collier. |
| 23. Ardea Brasiliensis. | 23. Le Héron du Brésil. |
| 24. Botaurus. | 24. Le Butor. |
| 25. Botaurus Freti Hudsonis. | 25. Le Butor de la Baye de Hudson. |
| 26. Botaurus minor. | 26. Le petit Butor. |
| 27. Botaurus striatus. | 27. Le Butor rayé. |
| 28. Botaurus major. | 28. Le grand Butor. |
| 29. Botaurus rufus. | 29. Le Butor roux. |
| 30. Botaurus Brasiliensis. | 30. Le Butor du Brésil. |
| 31. Botaurus nævius. | 31. Le Butor tacheté ou le Pouaï cre. |
| 32. Botaurus Americanus nævius. | 32. Le Butor tacheté d'Amérique. |
| 33. Cancrofagus. | 33. Le Crabier. |
| 34. Cancrofagus castaneus. | 34. Le Crabier marron. |

35. Le Crabier roux.
 36. Le Crabier roux
 37. Le Crabier jaune.
 38. Le Crabier des Philippines.
 39. Le Crabier d'Amérique.
 40. Le Crabier du Brésil.
 41. Le Crabier de Bahama.
 42. Le Crabier bleu.
 43. Le Crabier verd.
 44. Le Crabier verd tacheté.
 45. Le Bihoreau.
 46. Le Blongios.
 47. Le Blongios tacheté.

LXXXII. *Genre de l'Ombrette.*

1. L'Ombrette.

SECTION IX.

LXXXIII. *Genre de la Cuilliere.*

1. La Cuilliere.
 A. *La Cuilliere tachetée.*
 2. La Cuilliere brune.

SECTION X.

LXXXIV. *Genre de l'Oiseau-royal.*

1. L'Oiseau-royal.

SECTION XI.

LXXXV. *Genre du Cariama.*

1. Le Cariama.

LXXXVI. *Genre du Kamichy.*

1. Le Kamichy.

SECTION XII.

LXXXVII. *Genre de la Poule-Sultane.*

1. La Poule-Sultane.

35. *Cancrofagus rufus.*
 36. *Cancrofagus rufus nævius.*
 37. *Cancrofagus luteus.*
 38. *Cancrofagus Philippensis.*
 39. *Cancrofagus Americanus.*
 40. *Cancrofagus Brasiliensis.*
 41. *Cancrofagus Bahamensis.*
 42. *Cancrofagus cœruleus.*
 43. *Cancrofagus viridis.*
 44. *Cancrofagus viridis nævius.*
 45. *Nictycorax.*
 46. *Ardeola.*
 47. *Ardeola nævia.*

LXXXII. *Genus Scopi.*

1. *Scopus.*

SECTIO IX.

LXXXIII. *Genus Cochlearii.*

1. *Cochlearius.*
 A. *Cochlearius nævius.*
 2. *Cochlearius fuscus.*

SECTIO X.

LXXXIV. *Genus Balearicæ.*

1. *Balearica.*

SECTIO XI.

LXXXV. *Genus Cariamæ.*

1. *Cariama.*

LXXXVI. *Genus Anhimæ.*

1. *Anhima.*

SECTIO XII.

LXXXVII. *Genus Porphyriionis.*

1. *Porphyrio.*

A. *Porphyrio*

-DES OISEAUX.

ix

A. *Porphyrio melanocephalos.*

A. *La Poule-Sultane à tête
noire.*

2. *Porphyrio minor.*
3. *Porphyrio viridis.*
4. *Porphyrio fuscus.*
5. *Porphyrio rufescens.*
6. *Porphyrio rufus.*
7. *Porphyrio punctulatus.*

8. *Porphyrio nævius.*
9. *Porphyrio Freti Hudsonis.*

10. *Porphyrio Maderaspatanus.*

2. *La petite Poule - Sultane.*
3. *La Poule-Sultane verte.*
4. *La Poule-Sultane brune.*
5. *La Poule - Sultane roussâtre.*
6. *La Poule-Sultane rousse.*
7. *La Poule-Sultane mouche-
tée.*
8. *La Poule-Sultane tachetée.*
9. *La Poule-Sultane de la Baye
de Hudson.*
10. *La Poule - Sultane de Ma-
drast.*





T A B L E I N D E X

Des Genres.

Generum.

LXII	Genre . . .	page	3	LXII	Genus . . .	pagina	3
LXIII	Genre . . .		8	LXIII	Genus . . .		8
LXIV	Genre . . .		10	LXIV	Genus . . .		10
LXV	Genre . . .		14	LXV	Genus . . .		14
LXVI	Genre . . .		18	LXVI	Genus . . .		18
LXVII	Genre . . .		33	LXVII	Genus . . .		33
LXVIII	Genre . . .		38	LXVIII	Genus . . .		38
LXIX	Genre . . .		42	LXIX	Genus . . .		42
LXX	Genre . . .		94	LXX	Genus . . .		94
LXXI	Genre . . .		121	LXXI	Genus . . .		121
LXXII	Genre . . .		132	LXXII	Genus . . .		132
LXXIII	Genre . . .		141	LXXIII	Genus . . .		141
LXXIV	Genre . . .		151	LXXIV	Genus . . .		151
LXXV	Genre . . .		177	LXXV	Genus . . .		177
LXXVI	Genre . . .		261	LXXVI	Genus . . .		261
LXXVII	Genre . . .		292	LXXVII	Genus . . .		292
LXXVIII	Genre . . .		311	LXXVIII	Genus . . .		311
LXXIX	Genre . . .		351	LXXIX	Genus . . .		351
LXXX	Genre . . .		361	LXXX	Genus . . .		361
LXXXI	Genre . . .		391	LXXXI	Genus . . .		391
LXXXII	Genre . . .		503	LXXXII	Genus . . .		503
LXXXIII	Genre . . .		506	LXXXIII	Genus . . .		506
LXXXIV	Genre . . .		511	LXXXIV	Genus . . .		511
LXXXV	Genre . . .		516	LXXXV	Genus . . .		516
LXXXVI	Genre . . .		518	LXXXVI	Genus . . .		518
LXXXVII	Genre . . .		522	LXXXVII	Genus . . .		522



TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ;
& la lettre E, l'espece.

A.

	G.	V.	E.		G.	V.	E.
A Boyeur des Anglois,	76		2	Bécassine d'Etang,	75		3
Aigrette,	81		16	— (Plus petite espece			
Allouette de mer,	72		2	de)	77		3
Alouette de mer,	69		8	Bécasson,	77		2
—-de-mer,	75		10	Beccasse,	77		
—-de-mer à collier,	75		11	—	77		1
—-de-mer de S. Do-				— blanche,	77	A.	1
mingue,	75		12	— de mer,	68		1
—-de-mer de S. Do-				Beccasseau,	75		
mingue, (Petite)	75		13	—	75		1
—-de-mer, (Petite)	75	A.	10	Beccassine,	77		2
Autre Beccassine,	75		1	— (Autre)	75		1
Autruche,	62			— blanche,	75		8
—	62		1	— d'Angleterre,	77		5
— de Guiane,	63		1	— de Madraft,	77		4
				— (Mâle de la)	77		3
				— (Petite)	77		3
				Béquasse,	77		1

B.

	G.	E.		G.	V.	E.
B Arge,	76			Bergeronette,	75	10
—	76		1	Bihoreau,	81	45
— blanche,	76		8	Bistarde,	66	1
— brune,	76		4	Bitarde,	69	12
— grise,	76		2	Blongios,	81	46
— grise, (Grande)	76		3	— tacheré,	81	47
— rousse,	76		5	Bluet,	87	1
— rousse d'Amérique,	76		7	Butor,	81	24
— rousse, (Grande)	76		6	— brun,	81	32
Bec à Cuiller,	79		1	— brun, (Petit)	81	47
Bécaffe,	77		1	— de la Baye de Hud-		
— grande,	77		1	son,	81	25
— petite,	77		2	— du Brésil,	81	30
Bécaffeau,	77		2	— (Grand)	81	28
Bécaffine,	77		2	— huppé,	81	41

b ij

	G.	E.		G. V. E.
Butor , (Petit)	81	26	Cigogne blanche ,	80 2
—	81	43	— brune ,	80 1
—	81	46	— d'Amérique ,	80 3
— rayé ,	81	27	— de la Guiane ,	80 5
— roux ,	81	29	— du Brésil ,	80 4
— tacheté ,	81	31	— noire ,	80 1
— tacheté d'Amérique ,	81	32	— noire , (Espece de)	78 13
			— ordinaire ,	80 2
			Cocoiian ,	74 2
			Combattant ,	75 18
			Corbeau de nuit ,	81 45
			Corlieu ,	78 1
			—	78 2
			— blanc ,	78 10
			— brun ,	78 11
			— (Petit)	76 2
			—	78 2
			— rouge ,	78 12
			Corlis ,	78 5
			Coulon-chaud ,	72 5
			—	72 5
			—-chaud cendré ,	72 2
			Courly ,	78 1
			—	78 1
			— blanc ,	78 A. 5
			— blanc du Brésil ,	78 10
			— brun d'Amérique ,	78 6
			— brun du Brésil ,	78 11
			— d'Amérique , (Grand)	78 8
			— d'Amérique , (Petit)	78 9
			— de Madagatcar ,	78 3
			— de terre ,	79 12
			— marron ,	78 5
			— (Petit)	78 2
			— rouge du Brésil ,	78 12
			— varié du Mexique ,	78 7
			— verd ,	78 4
			Cra-cra ,	81 39
			Crabier ,	81 33
			— bleu ,	81 42
			— d'Amérique ,	81 39
			— de Bahama ,	81 41
			— des Philippines ,	81 38

DES NOMS FRANÇOIS.

		G. V. E.			G.	xiiij
						E.
Crabier du Brésil,	81	40	Foulque d'eau de l'A-			
— jaune,	81	37	Amérique, (Petite)	87	9	
— marron,	81	34	Fouton,	77	3	
— roux,	81	35	Francolin,	76	6	
— roux tacheté,	81	36	— à poitrine rouge,	76	5	
— (Second)	81	3	— blanc de la Baye			
— verd,	81	43	de Hudson,	76	8	
— verd tacheté,	81	44	— de l'Amérique			
Crex, (Oiseau nommé)	76	2	(Grand)	76	7	
Cueiller,	79	I				
Cuiller, (Bec à)	79	I	G.			
Cuilliere,	83					
—	83	I				
— brune,	83	2				
— tachetée,	83	A. I	G Alerand,	81	24	
Cul-blanc,	75	I	Grand Butor,	81	28	
Curiaca,	78	8	— Chevalier d'Italie,	67	I	
			— Courly d'Amérique,	78	8	
D.			— Francolin de l'A-			
			Amérique,	76	7	
D Emoifelle de Numi-			— Héron lupé,	81	10	
die,	80	12	— Pluvier,	69	12	
Deux-pour-un,	77	3	— Pluvier de Bengale,	69	13	
Dixhuit,	70	I	— Vanneau de Bolog-			
Dotralle de la Provin-			ne,	70	5	
ce de Lincoln,	69	6	Grande Barge grise,	76	3	
— des Anglois,	69	5	— Barge rousse,	76	6	
Dronte,	65		— Grue de la Baye de			
—	65	E	Hudson,	80	10	
E.			— Grue des Indes,	80	7	
			Grive-d'eau,	75	20	
E Chasse,	67		Grue,	80	6	
—	67	F	— blanche de l'Amé-			
— du Mexique,	67	2	rique,	80	10	
Espatule,	79	2	— brune & cendrée,	80	11	
— rouge,	79	3	— d'Amérique,	80	10	
Espec de Cigogne noire,	78	13	— de la Baye de Hud-			
— de Héron,	81	45	son,	80	11	
F.			— de la Baye de Hud-			
			son, (Grande)	80	10	
F Emelle du Chevalier			— de Numidie,	80	12	
aux pieds rouges,	76	3	— des Indes, (Grande)	80	7	
Flamant gris,	78	11	— des Indes Orientales,	80	7	
— rouge,	78	12	— du Japon,	80	9	

	G.	E.		G.	E.
Grue du Mexique,	80	8	Héron ordinaire,	81	1
Guignard,	69	5	— (Petit)	79	1
— d'Angleterre,	69	6	— pourpré,	81	12
Guignette,	75	2	— pourpré du Mexi- que,	81	13
H.			— pourpré hupé,	81	14
H Éron,	81		— tacheré,	81	8
—	81	1	Houtarde,	66	1
—	81	2	Huitres, (Preneur d')	68	1
—	81	6	Huitrier,	68	
—	81	39	—	68	1
— blanc,	75	18			
—	81	15	I.		
— blanc de la Caroli- ne,	81	18	J Acana,	71	E.
— blanc de M. Old- ham,	75	7	— armé,	71	1
— blanc du Brésil,	81	17	Ibis,	78	13
— blanc du Mexique,	81	19	— blanc,	78	14
— blanc, (Petit)	81	18	K.		
—	81	20	K Amichy,	86	E.
— bleu,	81	3	—	86	1
—	81	42	M.		
— cendré,	81	1	M Ale de la Beccassine,	77	E.
—	81	4	Marouïette,	74	3
— cendré d'Amérique,	81	6	Maubéche,	75	2
— cendré de l'Amérique Septentrionale,	81	7	— grise,	75	14
— cendré du Mexique,	81	5	— grise, (Petite)	75	16
— de la Baye de Hud- son,	81	7	— tacherée,	75	17
— du Brésil,	81	23	Mere des Cailles,	74	15
— (Espece de)	81	45	—	74	1
— étoilé,	75	18	Merle-d'eau	75	3
— gris,	81	9	O.		19
— hupé,	81	2	O Iseau appelé Hæ- matopus marinus,	68	E.
— hupé de Cayenne,	81	3	— de Riviere,	78	1
— hupé de Virginie,	81	10	— nommé Crex,	76	8
— hupé du Mexique,	81	11	— pourpré,	87	2
— hupé, (Grand)	81	10	— -Royal,	84	1
— noir,	81	21	—	84	1
— noir à collier,	81	22	Olive,	66	2

DES NOMS FRANÇOIS.

xv

	G.	E.		G. V. E.
Ombrette,	82		Petite Alouette-de-mer,	75 A. 10
—	82	1	— Alouette-de-mer de	
Onouré des bois,	81	23	S. Domingue,	75 13
Ostarde,	66	1	— Beccaffine,	77 3
—	69	12	— Espece de Beccaffine,	
Ostardeau,	69	12	(Plus)	77 3
Otarde,	66	1	— Foulque d'eau de	
Outarde,	66		l'Amérique,	87 9
—	66	1	— Maubéche grise,	75 17
—	69	12	— Outarde,	66 2
— d'Arabie,	66	3	— Poule d'eau,	87 8
— des Indes,	69	13	— Poule-Sultane,	87 2
— (Petite)	66	2	Pie de mer,	68 1
			Pittouër,	81 24
			Plus petite Espece de	
	G.	E.	Beccaffine,	77 3
P Ale,	79	1	Pluvier,	69
Palette,	79	1	—	69 1
Paon,	84	1	—	69 8
— -de-mer,	75	18	— à collier,	69 7
Papechieu,	70	1	— à collier de la Jamaï-	
Pélican,	79	1	que,	69 11
— Américain,	78	8	— à collier de S. Do-	
Perdrix-de-mer,	73		mingue,	69 10
—	73	1	— à collier de Virginie,	69 9
— -de-mer à collier,	73	2	— à collier, (Petit)	69 8
— -de-mer du Sénégal,	73	4	— armé du Sénégal,	69 15
— -de-mer rachetée,	73	3	— criard,	69 9
Petit Butor,	81	26	— de Bengale, (Grand)	69 13
—	81	43	— des Indes à la gorge	
—	81	46	noire,	69 14
— Butor brun,	81	47	— doré,	69 1
— Corlieu,	76	2	— doré de la Baye de	
—	78	2	Hudson,	69 4
— Courly,	78	2	— doré de S. Domingue,	69 3
— Courly d'Amérique,	78	9	— doré, (Petit)	69 2
— Héron,	79	1	— (Grand)	69 12
— Héron blanc,	81	18	— gris,	70 2
—	81	20	— hupé de Perse,	69 14
— Pluvier,	69	5	— moucheté,	69 4
— Pluvier à collier,	69	8	— (Petit),	69 5
— Pluvier doré,	69	2	— verd,	69 1
— Râle d'eau,	74	2	Poche,	79 1

xvj *TABLE ALPHABETIQUE, &c.*

	G.	V.	E.		G.	E.
Porphyrio,	87	1		Roi de Cailles,	74	3
Porphyriou,	87	1		Roupeau,	81	45
Pouacre,	81	31		Roy des Cailles,	74	1
Poule,	87	A. 1		—	74	3
—-d'eau,	71	2			S.	
—-d'eau aux ailes épe-					G.	E.
ronnées,	71	5		S anderling d'Arbres,	75	10
—-d'eau, (Petite)	87	8		— de Cornouaille,	75	17
—-Sultane,	87			Saouakou,	83	1
—	87	1		—des bois,	83	2
—-Sultane à tête noi-				Second Crabier,	81	3
re;	87	A. 1		Spatule,	79	
—-Sultane brune,	87	4		—	79	1
—-Sultane de la Baye				—	79	2
de Hudfon,	87	9		— couleur de rose,	79	2
—-Sultane de Madraft,	87	10		— rouge,	79	3
—-Sultane mouchetée,	87	7			T.	
—-Sultane, (Petite)	87	2			G.	E.
—-Sultane rouffâtre,	87	5		T houyou,	63	
—-Sultane rouffe,	87	6		—	63	1
—-Sultane tachetée,	87	8		Tourne pierre de la Baye		
—-Sultane verte,	87	3		de Hudfon,	72	1
Preneur d'Huitres,	68	1		Tringa tacheté,	75	20
				Truble,	79	1
					V.	
					G.	E.
				V aneau,	70	1
				Vanneau,	70	
				—	70	1
				— armé de la Louifia-		
				ne,	70	7
				— armé de S. Domin-		
				gue,	70	8
				— armé du Sénégal,	70	6
				— de Bologne, (Grand)	70	5
				— de Suiffe,	70	4
				— gris,	70	2
				— varié,	70	3
				Videcocq,	77	1
				Videcoq,	77	1
				Wimbrel,	78	2

INDEX

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum,
Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; Littera V, varietatem; &
Littera S, Speciem.

A.

	G	S.		G. V. S.
A Bastrus,	62	I	Ajaja,	79 2
— Aboyeur des An-			Aigeron,	81 24
— glois,	76	2	Αιγαίφραδος,	76 I
Acacalotl,	78	7	Aigrette,	81 16
— Hernandezii,	78	7	— Gallorum,	81 16
— Nierembergii,	78	7	Αιματοπος,	68 I
Acceggia,	77	I	Airon,	81 I
Acker-Trapp,	66	I	— bianco,	81 15
— Trappe,	66	I	— negro,	81 I
Adebar,	80	2	איז,	70 I
Ægocephala,	76	6	Albardeola,	79 I
Ægocephalus Bellonii,	76	I	—	81 15
—	76	6	— Willughbeii,	79 I
— (Glareola)	76	6	Alfwargrim,	69 4
Aengsnaerpa,	74	3	Alhabari,	66 I
Aers, (Dod-)	65	I	Alia Ardeæ species,	81 2
Aesch-Heunlein,	74	I	—	81 17
— Heunlin,	74	I	—	81 30
Agro,	81	I	— quædam Ardea,	81 2
— blanc,	81	15	— quædam Ardea ex Or-	
Agroti,	81	16	nithologo,	81 2
Aguapecaca,	71	2	Aliis Butio,	81 24
— dicta, (Gallinula			— Glareola,	87 6
— Brasiliensis)	71	2	Allouette de mer,	72 2
— dicta, (Jacanæ alia			Alouette de mer,	69 8
— species, Brasilien-			Alouette-de-mer,	75 10
— sibus)	71	2	— -de-mer à collier,	75 11
Aiaia,	79	3	— -de-mer de S. Domin-	
Ajaia,	79	2	— gue,	75 12
— Brasiliensibus,	79	2	— -de-mer de S. Domin-	
— dicta Marcgravii, (Pla-			— gue, (Petite)	75 13
— tea Brasiliensis)	79	2	— -de-mer, (Petite)	75 A. 19

S

C

	G.	V.	S.		G.	S.
Alte Knechte ,	74	3		Arcuata major ,	78	1
Alwargrim ,	69	4		— minor , &c.	78	5
American Godwit, (Grea- ter)	76	7		Arcuato ,	78	1
— Scarlet Pelecan ,	79	3		Ardea ,	80	2
— Scarlet Spoon-bill ,	79	3		—	81	
— Water Hen, (Little)	87	9		—	81	1
Amfel , (Bach-)	75	19		—	81	2
— (Brach-)	70	2		— æquinoctialis ,	78	24
— (See-)	75	19		— alba ,	79	14
— (Waffer-)	75	19		—	81	1
Anas campestris ,	66	2		— alba , &c.	81	15
— rostro plano , &c.	79	1		— alba , &c.	80	2
Andugoacu ,	63	1		— alba cirrata Jonstoni ,	81	15
Anghiron ,	81	1		— alba major ,	81	15
Anhima ,	86			— alba major cristâ ca- rens ,	81	15
—	86	1		— alba major Willugh- beji ,	81	15
— Brasiliensibus ,	86	1		— alba maxima ,	81	15
— Brasiliensium Marc- gravii ,	86	1		—	81	16
Anhyma ,	86	1		— alba minor ,	81	16
Anser Chilenfis ,	71	4		— alba minor Aldrovan- di ,	81	16
— Cochlearius ,	79	1		— alba minor alia ,	81	16
— platorynchos ,	79	1		— alba minor Caroli- niensis ,	81	18
— Trappa ,	66	1		— alba minor cristata ,	81	16
<i>Ανσπανοειδής</i> ,	80	12		— alba minor Gefneri ,	81	16
Antigone ,	80	7		— alba minor secunda ,		
Aokerhoena ,	69	1		— Aldrovandi ,	81	16
Aokerhoens ,	69	1		— alba minor tertia Al- drovandi ,	81	20
—	69	4		— alba tota , &c.	81	15
Aouarou ,	80	5		— alia alba ,	81	15
Apoa , (Nhandu)	80	4		— (Alia quædam)	81	2
— Tupinambis Marc- gravii , (Nhandu)	80	4		— Americana , &c.	63	1
— Tupinambis , (Nhan- du)	80	4		—	75	18
Aquila Americana , &c.	86	1		— Americana , alba ma- xima Sloan.	81	16
— aquatica , cornuta ,	86	1		— Americana cinerea ,	81	6
Arapapa ,	83	A. 1		— Americana , sylvati- ca , &c.	81	23
Arcafe ,	78	1		— Arundinum ,	81	24
Arcia ,	77	1				
Arcuata ,	78	1				
— Cosmii ,	78	1				

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Ardea Asterias ;	81	24	Ardea cirrata, alba, &c.	80	2
— Brasiliensis,	81	23	—	81	45
— Brasiliensis candida,	81	17	— coerulea,	81	41
— Brasiliensis Cocoi dic-			—	81	42
ta Marcgravio,	81	3	— coeruleo-nigra,	81	42
— Brasiliensis, rostro fer-			— cristâ dependente,	81	1
rato, cinereæ fi-			— cristâ flava, &c.	81	41
milis Marcgravii,	81	30	— cristâ occipitis tripen-		
— Brasiliensis, rostro fer-			ni dependente, &c.	81	45
rato, stellari simi-			— cristâ fetosa erecta,		
lis Marcgravii,	81	30	&c.	84	1
— Canadensis,	80	11	— cristata,	81	2
— candens,	81	15	— cristata, &c.	81	28
— candida,	81	15	— cristata maxima Ame-		
— candida minor,	81	20	ricana,	81	10
— capite lævi, &c.	78	13	— cristata purpurascens,	81	14
—	78	14	— cyanea,	81	42
—	81	15	— ex Ornithologo, (Alia		
— capite læviusculo,			quædam)	81	2
&c.	81	24	— Freti Hudsonis,	81	7
— capite nudo, &c.	80	7	— fusca,	81	32
— Carolinensis candida,	81	18	— fusca, Nova species,	81	27
— castanei coloris alia,	81	36	— grisea,	81	9
— Cayanensis cristata,	81	3	— Hæmatopos,	81	35
— cinerea,	81	1	— Hæmatopus, Aldro-		
—	81	4	vandi,	81	35
— cinerea alia,	81	28	— major grisea cristata		
— cinerea altera,	81	45	&c.	81	41
— cinerea cristata,	81	1	— maxima, lutescens,		
— cinerea flavescens,			&c.	81	28
nova species,	81	12	— Mexicana,	81	13
— cinerea flavescens, no-			— Mexicana candida,	81	19
va species, Marsilli,	81	12	— Mexicana cinerea,	81	5
— cinerea major,	81	1	— Mexicana cristata,	81	11
—	81	2	— Mexicana minima can-		
— cinerea major Jonsto-			didissima Hernan-		
ni,	81	1	dezii,	81	19
— cinerea minor,	81	45	— maxima purpurascens,	81	13
— cinerea minor Mexica-			— minor,	81	24
na,	81	5	— minor alia rostro ar-		
— cinerea rostro crassiori,	81	45	cuato,	81	4
— cinerea Schwenckfel-			— minor alia rostro ar-		
dii,	81	1	cuato Aldrovandi,	81	4

	G.	S.		G.	S.
Ardea minor alia vertice			Ardea stellaris;	81	24
croceo,	81	20	— stellaris altera;	81	29
— minor, subfusco-gri-			— stellaris Aristoteli,	81	24
sea, &c.	81	32	— stellaris cristata Ame-		
— naevia,	81	8	ricana,	81	41
— nigra,	81	21	— stellaris Gesneri,	81	24
—	81	22	— stellaris Gesnero,	81	24
— nigra, &c.	80	1	— stellaris major,	81	28
— nigra Aldrovandi,	81	22	— stellaris major Orni-		
— nigra Jonstoni,	81	22	thologo,	81	28
— nigra torquata,	81	22	— stellaris minima,	81	43
— nivea,	81	17	— stellaris minor,	81	24
— occipite crista pendu-			—	81	32
la, &c.	81	1	— stellaris Plinio,	81	24
— occipite cristato, &c.	81	10	— stellaris, tertium ge-		
—	81	42	nus,	81	29
— occipite subcristato,			— stellaris, tertium ge-		
&c.	81	43	nus Aldrovandi,	81	29
— pallida, &c.	81	24	— stellaris Willughbe-		
— palustris,	81	24	ji,	81	24
— pavonina,	84	1	— subcœrulea,	81	1
— pella Schwenckfel-			— subfusca major, &c.	81	23
dii,	81	1	— superciliis albis, &c.	80	12
— Phœnicea, Spatula dic-			— sylvatica, &c.	81	23
ta,	79	3	— syncipite nudo papil-		
— plumbea cristata, &c.	81	42	loso, &c.	80	11
— Porphyrio,	78	12	— varia,	81	39
— pulla,	81	1	—	81	45
— pulla Schwenckfeldii,	81	1	— varia major Chilien-		
— purpurascens,	81	12	sis,	81	39
— Quaiotta,	81	33	— varia Schwenckfel-		
— quam Sguacco vocant			dii,	81	45
in vallibus dictis			— ventre subalbo, &c.	80	1
Malalbergi, Al-			— vertice croceo,	81	20
drovandi,	81	37	— vertice nigro, &c.	81	24
— rosea, Spatula dicta,	79	2	— vertice nudo papillo-		
— rostro maximè arcua-			so, &c.	80	6
to,	81	4	— vertice papilloso,	80	6
— rostro rubro, &c.	80	6	— vertice temporibus-		
— rubra,	81	34	que nudis papillo-		
— rubra Aldrovandi,	81	28	fis, &c.	80	10
— rubra, Carollina,	78	12	— violacea,	81	41
— rubra cirrata,	81	28	— virescens,	81	43

ALPHABETICUS.

		G. S.		G. S.	
Ardea Virginiana cristata,	8r	10	Arenaria cinerea,	72	2
— viride-flavescens, Nova species,	8r	26	— nostra,	75	17
— viride-flavescens, Nova species Marsilii,	8r	26	Arquata,	78	I
— vulgò Squaiotta dicta Malalbergi, Aldrovandi,	8r	33	— albicans, &c.	78	I
Ardeæ alia species, quæ vulgò Squaiotta dicitur Malalbergi,	8r	33	— Aldrovandi,	78	I
— aliud genus, quam Sguacco vocant,	8r	37	— Americana cinerea,	78	II
— cineræ congener,	8r	8	— Americana cinerea, &c.	80	5
— cineræ tertium genus,	8r	8	— Americana Phœnicea,	78	12
— cineræ tertium genus Aldrovandi,	8r	8	— cinerea,	78	II
— congener,	8r	22	— Gesneri,	78	I
— congener Aldrovandi,	8r	22	— major,	78	I
— species,	78	4	— minor,	69	12
— species, (Alia)	8r	2	— minor Gesneri,	78	2
—	8r	17	— minor nostras,	78	2
—	8r	30	— Phœnicea,	78	12
— species Marcgravii,	8r	15	Arquatæ congener,	69	12
— species Marsilii,	78	4	Aschenfarbener Reger,	8r	I
— stellaris tertium genus,	8r	29	Ascolopax,	77	I
— stellaris tertium genus Aldrovandi,	8r	29	Ash-colour'd Heron from North-America,	8r	7
Ardeola,	8r	40	— coloured Heron,	8r	I
—	8r	46	— coloured Heron, (Lef-fer)	8r	45
— Brasiliensis Marcgravii,	8r	40	Ασκαλόπαξ,	77	I
— cinerea,	8r	I	Ασκολόπαξ,	77	I
— nævia,	8r	47	Asterias,	8r	24
— pulla,	8r	I	— (Ardea)	8r	24
Arenaria,	72		Αστερίας,	8r	24
—	72	I	— (Eradis)	8r	24
—	75	77	Αστερίας ἐράδιος, Arist.	8r	24
			Avestruz,	62	I
			Avis Aldrovandi, (Stella)	66	2
			— Aldrovandi, (Tarda)	66	I
			— Anglica, (Morinellus)	69	5
			— Brasiliana Guara dicta,	78	12
			— (Canuti)	75	2I
			— (Capella)	70	I

	G.	S.		G. V. S.
Avis cornuta,	71	4	Balearica,	84
— dicta, (Stella)	66	2	—	84
— Eme,	63	1	— (Grus)	84
—	64	1	Bambiaya,	86
— (Emeu)	64	1	Baranek,	70
— falcata,	78	4	—	77
— (Hirundo marina)	73	1	Barge,	76
— hospita,	80	2	—	76
— peregrina,	80	2	— Bellonii,	76
— pietatis cultrix,	80	2	— blanche,	76
— Porphyrio, Amboi-			— brune,	76
nensis,	78	12	— Gallorum,	76
— pugnax,	75	18	— grise,	76
— pugnax, Aldrovan-			— grise, (Grande)	76
di,	75	18	— rouffe,	76
— quædam ex rapacibus,	86	1	— rouffe d'Amérique,	76
— quædam quam in Bel-			— rouffe, (Grande)	76
gio Kemperken vo-			Barker,	76
cant,	75	18	— Albin, (Glareola)	76
— quædam quam in Bel-			Bastard Plover,	70
gio Pugnacem vo-			Bec à cuiller,	79
cant,	75	18	Bec-llarg,	76
— ficca,	81	11	Becada,	77
— filiquastrini capitis,	87	1	Becadell,	77
— (Stella)	66	2	Bécaffé,	77
— (Tarda)	66	1	— grande,	77
— The Stint dicta,	75	10	— petite,	77
— vivivora,	79	3	Bécafféau,	77
— Xoxouquihaactli,	81	13	Bécaffine,	77
Aukoh,	81	1	— d'Étang,	75
Autre Beccaffine,	75	1	— (Plus petite espece de)	77
Autruche,	62		Bécaffon,	77
—	62	1	Beccaroveglia,	79
— de Guiane,	63	1	Beccassa,	77
Ayaya,	79	2	Beccasse,	77
Ayron negro,	78	4	—	77
Aztatl,	81	15	— blanche,	77
			— de mer,	68
			Beccasseau,	75
			—	75
			Beccaffine,	75
			—	77
			— (Autre)	75

ALPHABETICUS.

xxij

	G.	S.		G.	S.
Beccaffine blanche,	75	8	Bittern, from Hudson's-		
— d'Angleterre,	77	5	Bay,	81	25
— de Madraft,	77	4	— (Little Brown)	81	47
— (Mâle de la)	77	3	— (Small)	81	32
— (Petite)	77	3	—	81	43
Becquaroveglia,	79	1	Bittorn,	81	24
Bein, (Rot-)	75	3	Bittour,	81	24
— (Rott-)	75	3	Black Gaulding,	81	42
Beinen, (Wasser-Heun-			— Stork,	80	1
lin mit Roten)	75	3	Blaw-Gruner,	70	1
Bekas,	77	2	Blawer Reger,	81	1
Belgis Scur-Vogel Marc-			Blauwer Reigel,	81	1
gravii,	80	4	Blew Gaulding,	81	42
— vulgò Negro,	80	5	— Heron,	81	3
Bengall Water Rail,	75	9	—	81	42
Béquaffe,	77	1	Blongios,	81	46
Berg-Schnepfe,	77	1	— tacheré,	81	47
— Schneppe,	77	1	Blue Gaulding,	81	42
Bergeronette,	75	10	Bluet,	87	1
Bernard Piscaira,	81	1	Bocian,	80	2
Beyffer, (Stein-)	75	10	— bialy,	80	2
Bicker, (Stein-)	75	10	— czarny,	80	1
Bihoreau,	81	45	— fniady,	80	1
Bilcock,	74	1	Boczan,	80	2
Bill, (American Scarlet			Boo-onk,	81	46
Spoon-)	79	3	Boollu Cory,	87	10
— (Spoon-)	79	1	Botaurus,	81	24
Bill'd Bird of America,			— Americanus nævius,	81	32
(Scarlet Spoon-)	79	3	— Brasiliensis,	81	30
— Heron, (White and			— Freti Hudsonis,	81	25
Spoon-)	79	1	— major,	81	28
Bird of America, (Scar-			— minor,	81	26
let Spoon-bill'd)	79	3	— nævius,	81	31
Bistard,	66	1	— Ornithologis,	81	24
Bistarda,	66	1	— Ornithologorum,	81	24
— Alberti magni,	66	1	— rufus,	81	29
— Alberto,	66	1	— striatus,	81	27
— (Recentiorum)	66	1	Brach-Amfel,	70	2
Bistarde,	66	1	— hun,	78	1
Bitarde,	69	12	—	78	2
Bittern,	81	24	— hun, (Gallinula quam		
— (Brown)	81	32	nostri vocant)	78	2
— (Crested)	81	41	— Vogel,	69	1

	G.	S.		G.	S.
Brach-Vogel ,	73	1	Butor tacheté ,	81	31
—	78	1	— tacheté d'Amérique ,	81	32
—	78	2	Butorius ,	81	24
—	87	7	Buttour ,	81	24
— Vogel , (Groffer)	69	1	Bybe ,	70	1
—	70	2			
—	78	1			
— Vogel , (Klein)	87	7			
— Vogel , (Kleiner)	69	2	C Ahuitahu ,	86	1
Braun-Schwartzer Storch ,	80	1	Caillies , (Mere des)	74	1
Braufz-hahn ,	75	18	—	74	3
Brook-Ouzell ,	74	1	— (Roi de)	74	3
Brown and Ash-colour'd			— (Roy des)	74	1
Crane ,	80	11	—	74	3
— Bittern ,	81	32	Calamon ,	87	1
— Bittern , (Little)	81	47	Calidris ,	75	14
— Curlew ,	78	11	— Bellonii ,	75	3
Bruch-Schnepfle ,	77	2	— cinerea ,	75	21
Brushane ,	75	18	— grisea ,	75	16
Bubacz ,	81	24	— grisea minor ,	75	17
Bucacz ,	79	1	— leucophæa ,	81	6
Bukacz ,	81	24	— nævia ,	75	15
Bunck ,	81	24	— nigra ,	75	4
Bundt Waffer Heunlin ,	75	1	Callydris nigra ,	75	21
Bundter Reger ,	81	45	Calpetre ,	79	1
Bustard ,	66	1	Camelus ,	62	1
— (Indian)	69	13	— Africanus , pullus ,		
— (Little)	66	2	(Struthio-)	62	1
Butio ,	81	24	— Americanus Marcgra-		
— (Aliis)	81	24	vio , (Struthio-)	63	1
Butor ,	81	24	— Americanus , (Stru-		
— brun ,	81	32	thio-)	63	1
— brun , (Petit)	81	47	— (Struthio-)	62	1
— de la Baye de Hud-			—	63	1
fon ,	81	25	— (Strutho-)	62	1
— du Bréfil ,	81	30	Canard de pré de France ,	66	2
— (Grand)	81	28	Cancrofagus ,	81	33
— huppé ,	81	41	— Americanus ,	81	39
— (Petit)	81	26	— Bahamensis ,	81	41
—	81	43	— Brasiliensis ,	81	40
—	81	43	— castaneus ,	81	34
—	81	46	— cœruleus ,	81	42
— rayé ,	81	27	— luteus ,	81	37
— roux ,	81	29	— major , &c.	83	1

ALPHABETICUS.

XXV

	G.	S.		G.	S.
Cancrofolagus Philippen-			Cenchramus Plinii,	74	3
fis,	81	38	Chalidris Bellonii,	75	3
— rufus,	81	35	— cinerea,	75	21
— rufus nævius,	81	36	— nigra,	75	7
— yiridis,	81	43	— nigra Bellonii,	75	7
— viridis nævius,	81	44	Charadita,	80	2
Canne-petiere,	66	2	Charadrios,	69	8
— petiere Gallorum,	66	2	—	69	12
Canut,	75	21	Χαράδριος,	69	8
Canuti Avis,	75	21	Charadrius,	69	1
Canucus,	75	21	—	69	8
Capella,	70	1	—	69	12
— Avis,	70	1	— abdomine rufefcente,		
— cœleftis,	77	2	&c.	69	5
— cœleftis Authorum,			— Ægyptius,	69	7
(Scolopax, quæ)	77	2	— Alexandrinus,	69	7
— Gazæ,	70	1	— apicarius,	69	4
Capra,	70	1	— Aristotelis,	69	12
Capu d'Aigua,	81	1	— brevicaudus, &c.	69	12
Caput chilli nocturnum,	71	4	— cristatus,	69	14
— nocturnum,	71	4	— fasciâ pectorali ni-		
Cariama,	85		grâ, &c.	69	7
—	85	1	— fasciis pectoris, colli,		
— Brafilienfibus,	85	1	frontis, genarum-		
— Brafilienfibus Marc-			que nigris, &c.	69	9
gravii,	85	1	— fufcus, &c.	69	7
Charlotte,	69	12	— grifeus, &c.	69	12
Caroli,	78	1	— gulâ, pileo, pectore-		
Cafearius,	64	1	que nigris, &c.	69	14
Cafoar,	64		— Lapponicus,	69	5
—	64	1	— nigricans,	75	7
Cafoarîs,	64	1	— nigro-lutefcente varie-		
Caffawar,	64	1	gatus, &c.	69	4
Caffoware,	64	1	— nigro, lutefcenteque		
Caffowary,	64	1	variegato, &c.	69	5
Cafuar,	64	1	— pectore ferrugineo,		
Cafuarius,	64		&c.	69	5
—	64	1	— pectore nigro, &c.	69	4
Catcher, (Crab-)	81	32	—	69	8
— (Oyfter)	68	1	— pedibus cinereis, &c.	69	1
Cannangoly,	87	10	— remigibus, pectore,		
Cela,	64	1	abdomine, pedi-		
Cenchramus Nonnullis,	87	7	busque atris, &c.	69	15

	G.	S.		G. V. S.
Charadrius spinosus,	69	15	Ciconia nigra Willugh-	
— supra niger, &c.	67	1	bei,	80 1
— vociferus,	69	9	Cignus cucullatus,	65 1
— Willughby,	69	8	Cigogna,	80 2
Charlot,	76	1	Cigogne,	80
—	78	1	—	80 2
Chafida,	80	2	— blanche,	80 2
Chattering Plover,	69	9	— brune,	80 1
Chavarita,	80	2	— d'Amérique,	80 3
Chevalier,	75	3	— de la Guiane,	80 5
—	75	4	— du Brésil,	80 4
— aux pieds rouges,	75	4	— noire,	80 1
— aux pieds rouges, (fe-			— noire, (Espec de)	78 13
melle du)	76	3	— ordinaire,	80 2
— blanc,	75	8	Ciguenna,	80 2
— cendré,	75	7	Cincli congener altera,	75 1
— d'Italie, (Grand)	67	1	— congener prior,	75 A. 10
— de Bengale,	75	9	— genus,	75 2
— noir,	75	7	Cinclus,	72 1
— rayé,	75	5	—	75 1
— rouge,	75	3	—	75 9
—	75	4	—	75 19
— tacheté,	75	6	—	77 3
Χιλορνια,	77	1	— Bellonii,	75 1
Chirurgien,	71	2	— Dominicensis,	75 12
— brun,	71	4	— Dominicensis minor,	75 13
— noir,	71	3	— minor,	75 A. 10
— varié,	71	5	— Ornithologi,	75 10
Chorata,	80	2	— prior Aldrovandi,	75 10
Chrosciel,	74	3	— quartus,	77 3
Churge,	69	13	— tertius,	75 1
Cicognino,	80	2	— tertius Aldrovandi,	75 1
Ciconia,	80		— torquatus,	75 11
—	80	2	— Turneri,	75 10
—	84	1	Cirris Virgilii, Scaligeri,	81 35
— alba,	80	2	— Virgilii Scaligero, Al-	
— Americana,	80	3	drovandi,	81 35
— Brasiliensis,	80	4	Clucking Hen,	81 23
— fusca,	80	1	Coceayahqui,	80 8
— fusca Schwenckfel-			Cochlearia,	79 1
dii,	80	1	Cochlearius,	83 1
— Guianensis,	80	5	—	83 1
— nigra,	80	1	— (Anser)	79 1

ALPHABETICUS.

xxvij

	G. V. S.		G. V. S.		G. V. S.
Cochlearius fuscus,	83	2	Corn-Crek,	74	3
— nævius,	83	A. 1	Cornix aquatica,	75	19
Cock, (Jud-)	77	3	Corvus aquaticus,	78	7
— (White Wood-)	77	A. 1	— aquaticus Hernandezii,	78	7
— (Wood-)	77	1	— aquaticus Nierember-		
Cocoi,	81	3	gii,	78	7
—	81	40	— nocturnus Agric.	81	45
— Brasiliensibus,	81	3	Coruz,	69	12
— dicta Marcgravio,			Cory, (Boollu)	87	10
(Ardea Brasilien-			Coturnico-mater Scalige-		
fis)	81	3	ro,	74	3
— primus,	81	40	Coturnicum, (Rex)	74	3
— secundus,	81	3	Coturnix,	74	3
— tertius,	81	23	— magna,	74	3
Cocoiian,	74	2	Coulon-chaud,	72	
Cognatus, (Numenio)	78	1	—	72	1
Colherado,	79	2	— -chaud cendré,	72	2
—	79	3	Courly,	78	
— Marcgravii, (Lusita-			—	78	1
nis)	79	2	— blanc,	78	A. 1
Comaltecatl,	67	2	— blanc du Brésil,	78	10
Combatant,	75	18	— brun d'Amérique,	78	6
Common Heron,	81	1	— brun du Brésil,	78	11
—	81	2	— d'Amérique, (Grand)	78	8
Congener Aldrovandi,			— d'Amérique, (Petit)	78	9
(Ardeæ)	81	22	— de Madagascar,	78	3
— Aldrovandi, (Ædic-			— de terre,	69	12
nemo)	66	1	— marron,	78	5
— altera, (Cincli)	75	1	— (Petit)	78	2
— (Ardeæ)	81	22	— rouge du Brésil,	78	12
— (Arquatae)	69	12	— varié du Mexique,	78	7
— (Ædicnemo)	66	1	— verd,	78	4
— (Pardali Bellonii)	70	3	Cra-cra,	81	39
— prior, (Cincli)	75	A. 10	Crab-Catcher,	81	32
Corbeau de nuit,	81	45	Crabier,	81	33
Corlieu,	78	1	— bleu,	81	42
—	78	2	— d'Amérique,	81	39
— blanc,	78	10	— de Bahama,	81	41
— brun,	78	11	— des Philippines,	81	38
— rouge,	78	12	— du Brésil,	81	40
— (Petit)	76	2	— jaune,	81	37
—	78	2	— marron,	81	34
Corlis,	78	1	— roux,	81	35

	G.	V.	S.		G.	S.
Crabier roux tacheté,	81	36		Curlew,	78	I
— (Second)	81	3		— (Brown)	78	II
— verd,	81	43		— (Jack-)	78	I
— verd tacheté,	81	44		— (Leffer)	78	2
Crake, (Water-)	75	19		— of Brasil, (Scarlet)	78	12
Crane,	80	6		— (Red-)	78	12
— (Brown and Ash-co-				— (Stone)	69	12
lour'd)	80	II		— (Water-)	78	I
— from Hudson's-Bay,				— (White)	78	10
(Hooping-)	80	10		Curlinus,	78	I
— (Greater Indian)	80	7		Curwilet,	75	17
— (Hooping)	80	10		Curwillet,	75	17
— (Numidian)	80	12		Cygnus cucullatus,	65	I
— (Red Legged)	67	I		— cucullatus Nierember-		
Crek, (Corn-)	74	3		gii,	65	I
Crested Bittern,	81	41		Czapla,	81	I
— Gaulding, (Grey)	81	41		Czayka,	70	I
— Heron,	81	2		Cziap,	80	2
— Heron, (Largest)	81	10		Cziepie,	81	I
Crex,	74	3		Czicyka,	70	I
—	76	2				
—	81	13				
— Bellonii,	76	2		D.		
— Indica, ex albo cine-					G.	S.
rea, &c.	87	10		Daker-Hen,	74	3
— (Oiseau nommé)	76	2		Dam, (Ros-)	81	24
Crotaliftria,	80	2		Deer, (Kill-)	69	9
Cryall,	81	16		Deffyt,	87	8
Cueiller,	79	I		Deiutha,	80	2
Cuiller, (Bec à)	79	I		Demoiselle de Numidie,	80	12
Cuilliere,	83			— of Numidia,	80	12
—	83	I		Derkacz,	74	3
— brune,	83	2		Deux-pour-un,	77	3
— tachetée,	83	A. I		Dixhuit,	70	I
Cul-blanc,	75	I		— Gallorum,	70	I
Curiaca,	78	8		Dod-aers,	65	I
Curicaca,	78	8		Dodo,	65	I
— Brasiliensibus,	78	8		— Lusitanorum,	65	I
— Brasiliensium Marc-				Dommel, (Rei-)	81	24
gravii,	78	8		Domp-horn,	81	24
Curicacæ alia species,	78	9		Domps-horn,	81	24
Curlew,	76	3		Dorada,	69	I
—	76	7		Dotralle de la Province		
				de Lincoln,	69	6
				— des Anglois,	69	1

ALPHABETICUS.

xxix

	G.	S.		G.	S.
Dotterel,	69	5	Ema Lusitanis Marcgra-		
— (Sea-)	72	1	vio,	63	1
Dotterell,	69	5	Eme,	64	1
Dotteril,	69	5	— Aldrovandi,	64	1
Dottrell,	69	6	— (Avis)	63	1
— (Sea-)	72	1	—	64	1
—	72	2	— Clusii,	64	1
Dottrell,	69	5	— Nierembergii,	64	1
— (Sea-)	72	1	Emeu,	63	1
Drofa,	66	1	—	64	1
Dronte,	65	1	— Aldrovandi,	64	1
—	65	1	— Avis,	64	1
Drop,	66	1	— Clusii,	64	1
Drum, (Mire-)	81	24	— Nierembergii,	63	1
— (Roer-)	81	24	—	64	1
Drumbel, (Mire-)	79	1	— nigricans, &c.	63	1
Drummel, (Rohr-)	81	24	— pennis fetosis, &c.	64	1
Duck, (French Field)	66	2	Erdboull,	81	24
Dummel, (Ror-)	81	24	Ερωδιος,	81	1
Dumpf, (Ros-)	81	24	—	81	2
Dumpf, (Ros-)	81	24	Ερωδιος, Arist. (Αστειρας)	81	24
Dunlin,	77	5	Ερωδιος αστεριος,	81	24
— Septentrionalium An-			— λευκος,	81	15
glorum D. John-			Erythra,	87	7
son,	77	5	— (Gallinula)	87	7
E.			— Gefneri, (Gallinula)	87	7
	G.	S.	Erythrontaon Olai ma-		
E Beher,	80	2	gni,	66	1
Echasse,	67	1	Erythropos,	75	3
—	67	1	— major Ornithologi,		
— du Mexique,	67	2	(Gallinula)	75	3
Eggenfschaer,	87	5	— minor, (Gallinula)	73	1
Eggenfschar,	87	5	Erythropus,	75	3
Egret,	81	16	— (Gallinula)	75	3
Egretta,	81	16	— major,	75	3
— Gallorum,	81	16	— major, (Gallinula)	75	3
Elaphis,	76	1	— major Gefneri, Al-		
Elbiger,	80	2	drovando, (Gal-		
Ελωριος,	78	1	linula)	75	3
Ema,	62	1	— major Gefneri, (Gal-		
—	63	1	linula)	75	3
—	80	6	— minor,	73	1
— di Gei,	62	1	— minor, (Gallinula)	73	1

	G.	S.		G.	S.
Erythropus primus Gef- neri,	75	3	Focker,	81	45
Espatule,	79	2	Folot d'acqua,	75	19
— rouge,	79	3	Forzane,	74	1
Especie de Cigogne noi- re,	78	13	Faulque d'eau de l'Amé- rique, (Petite)	87	9
— de Héron,	81	45	Fouton,	77	3
Exul hyemis,	80	2	Francolin,	76	6
Eye, (Hawk's-)	69	4	— à poitrine rouge,	76	5
— (Ox-)	75	10	— blanc de la Baye de Hudson,	76	8
	F.		— de l'Amérique, (Grand)	76	7
F Alcata,	78	4	French Field Duck,	66	2
Falcinello,	78	4	Froembder Vogel,	67	1
Falcinellus,	78	4	Fulica fronte calva, &c.	87	1
— Aldrovandi,	78	4	— fronte carunculata, &c.	71	5
— Aldrovandi colore furvo,	78	4	— spinosa,	71	5
— Gefneri,	78	4	Fufer,	81	24
— Gefneri colore furvo,	78	4	Fyfterlin,	75	2
— puniceo-viridis,	78	4		G.	
Falconellus puniceo-viri- dis, Marfilli,	78	4	G Abilan,	80	6
Falunt d'acqua,	75	19	Galerand,	81	24
Fafanella,	66	2	Galgulus Aliorum,	69	8
Faufser,	81	24	Galla mareza,	74	1
Fedoa,	75	3	Gallina aquatica, minor, &c.	71	2
— altera,	76	1	— arciera,	77	1
— nostra secunda,	76	1	— novalis media,	69	1
— nostra tertia,	69	12	— novalis minor Sch- wenckfeldii,	69	2
— secunda,	76	1	— rustica,	77	1
Fedoæ tertia species,	69	12	— rusticella,	77	1
Femelle du Chevalier aux pieds rouges,	76	3	— salvatica,	77	1
Feuffel, (Geel-)	87	6	— sega,	87	4
— (Greun-)	75	1	Gallinaceus Gallus pere- grinus,	65	1
— (Rot-)	75	3	— peregrinus Clusii, (Gallus)	65	1
Field Duck, (French)	66	2	Gallinæ aquaticæ species prima de novo ad- jecta,	74	1
Filicetta,	70	1			
Flamant gris,	78	11			
— rouge,	78	12			
Focke,	81	45			

ALPHABETICUS.

xxxj

		G.	S.			G.	S.
Gallinæ aquaticæ species				Gallinula Brasiliensis tet-			
secunda de novo				tia Marcgravii, 71		3	
adjecta, 75	1			— Chloropos Ornitholo-			
Gallinaginis genus nomi-				gi, 87		4	
ne ignoto, 74	1			— Chloropus, rarior			
Gallinago, 77	1			species, 74	1		
—, 77	2			— Chloropus tertia, 87	4		
— Anglicana, 77	5			— Erythra, 87	7		
— cinerea, 74	1			— Erythra Gefneri, 87	7		
— cinerea major, 76	1			— Erythropos minor, 73	1		
— Gazæ, 77	1			— Erythropos major Or-			
—, 77	2			nithologi, 75	3		
— Maderaspatana, 77	4			— Erythropus, 75	3		
— Maderaspatana, &c. 77	4			— Erythropus major, 75	3		
— maxima, 77	1			— Erythropus major Gef-			
— minima, 77	3			neri, 75	3		
— minima, &c. 75	10			— Erythropus major Gef-			
— minima Bellonii, 77	3			neri Aldrovando, 75	3		
— minor, 77	2			— Erythropus minor, 73	1		
—, 77	3			— Gefneri, (Phæopus) 78	2		
— minor Aldrovandi, 77	2			— Holofericea, 74	1		
— minor Bellonii, 77	2			— Hypoleucos, 75	2		
— minor Willughby, 77	2			— Melampus, 73	3		
— Serica dicta, 74	1			— Melampus Aldrovan-			
— sylvestris aquatica, 78	13			di, 73	3		
— tertia Bellonii, 77	3			— Melampus Aldrovan-			
— vulgaris minor, 77	2			do, 73	3		
Gallinaza, 77	1			— Melampus Gefneri, 73	3		
Gallinella, 77	1			— Melampus Gefne-			
Gallinula aquatica, 83	2			ro, 73	3		
— aquatica octava Gef-				— Melampus Willugh-			
neri, 75	1			beji, 73	3		
— aquatica Ornithologis, 87	6			— Melampus Willugh-			
— aquatica quarta Gef-				by, 73	3		
neri, 87	6			— minor Aldrovandi,			
— Brasiliensibus Jacana				(Poliopus), 87	8		
dicta Marcgravii, 71	1			— novalis minor, 87	7		
— Brasiliensis Aguape-				— Ochra, 74	2		
caca dicta, 71	2			—, 75	1		
— Brasiliensis, Jacana				— Ochra Gefneri, Al-			
dicta, 71	1			drovandi, 74	2		
— Brasiliensis quarta				— Ochropus, 75	1		
Marcgravii, 71	4			— Ochropus major, 87	6		

	G. V. S.		G.	S.
Gallinula Ochropus major Gefnero, Aldrovandi,	87	6		
— Ochropus medius,	75	1		
— Ochropus minor,	73	2		
— palustris,	87	A. 1		
— pedibus nigricantibus,	75	7		
— pedibus nigris,	75	4		
— pedibus viridibus,	75	1		
— Phæopos altera,	78	2		
— Phæopos,	78	2		
— Phœnicopos,	75	1		
— Phœnicopus Gefneri,	75	1		
— quam nostri vocant Brach-hun,	78	2		
— Rhodopos,	75	1		
— Rhodopus,	75	1		
— Rhodopus Gefneri,	75	1		
— serica,	74	1		
— serica Aldrovandi,	74	1		
— serica dicta,	74	1		
— serica Gefneri,	74	1		
— terrestris,	87	5		
— terrestris Aldrovandi,	87	5		
Gallinulæ aquaticæ decimum genus,	74	2		
— aquaticæ duodecimum genus,	73	2		
— aquaticæ nonum genus,	87	7		
— aquaticæ octavum genus,	75	1		
— aquaticæ primum genus,	75	3		
— aquaticæ quartum genus, Schmirring dictum,	87	6		
— aquaticæ quintum genus,	75	1		
— aquaticæ secundum genus,	87	4		
— aquaticæ septimum genus,	73	3		
Gallinulæ aquaticæ sextum genus,	75			2
— aquaticæ species,	75			19
— aquaticæ tertium genus,	87			8
— aquaticæ undecimum nus,	73			1
— genus nomine ignoto,	74			1
— maritimæ genus,	76			3
— maritimæ genus aliud,	76			2
Gallus Gallinaceus peregrinus Clusii,	65			1
— peregrinus, (Gallinaceus).	65			1
Gambetta,	75			4
— Aldrovandi,	75			4
— Italis dicta,	75			4
Gans, (Loeffel-)	79			1
— (Trapp-)	66			1
Ganss, (Heer-)	81			1
— (Herr-)	81			1
— (Trapp-)	66			1
Ganta,	80			2
Garriga, (Toru de)	81			28
Garza,	81			1
—	81			15
— bianca,	81			16
— biancha,	81			15
— Lusitanis,	81			15
Garzetta,	81			16
— Aldrovandi,	81			16
— bianca,	81			15
—	81			16
— dicta Aldrovandi,	81			16
— Gefneri,	81			16
— Itatorum,	81			16
Gavia Brachyptera, vocifera,	69			9
— cinerea,	70			2
— cinerea Eberi,	70			1
— cinerea Peuceri,	70			1
— Indica,	69			13
— littoralis,	69			8

Gavia

ALPHABETICUS.

xxxiiij

		G. V. S.			G.	S.
Gavia Morinella altera,	69	6	Girardello,		78	2
— Morinellus simplici-			Girardin,		74	2
ter,	69	5	Girardina,		74	2
— quæ Pluvialis arenaria			Girone,		81	15
nostra, Raji,	72	1	Glareola,		73	
— rostro virescente, &c.	69	12	—		73	1
— viridis,	69	1	—		73	3
— vulgaris,	70	1	—		75	1
Gaulding, (Black)	81	42	— alia primæ familis,		75	4
— (Blew)	81	42	&c.		87	6
— (Blue)	81	42	— (Aliis)		76	2
— (Grey Crested)	81	41	— Barker, Albini,		75	15
— (Largest White)	81	15	— castanea,		73	3
— (White)	81	15	— nævia,		87	7
Gazæ Hiaticula,	69	8	— nona,		87	7
Gazola,	81	24	— nona Schwenckfeldii,		87	7
Geel-Feuffel,	87	6	— octava,		75	1
Geifz, (Himel-)	78	1	— octava Schwenckfel-			
— (Himels)	77	2	dii,		75	1
— -Vogel,	78	1	— prima,		75	3
Gelvæ,	81	24	— prima Schwonckfel-			
Gelve,	81	24	dii,		75	3
Γεραυός,	80	6	— pugnax,		75	18
Germanis Nycticorax,	81	45	— quarta,		75	1
Γεραυός,	80	6	— quarta Schwenckfel-			
Gerzab,	80	6	dii,		75	1
Gescheckt Mott Heunle,	75	1	— quinta,		73	2
Giarola,	73	3	— quinta Schwenckfel-			
Giarolo,	75	1	dii,		73	2
—	75	10	— secunda,		73	1
—	75	A. 10	— Senegalensis,		73	4
Giaroncello,	75	1	— sexta,		74	1
—	75	10	— septima,		74	1
—	75	A. 10	— septima Schwenckfel-			
— Italis dicta, (Tringa			dii,		74	1
tertia Aldrovandi)	75	1	— tertia,		87	6
Gid-Snipe,	77	3	— tertia Schwenckfeldii,		87	6
Gillerdine,	87	8	— torquata,		73	2
Giloch,	78	1	Glottis,		76	3
Ginocchiella,	70	5	—		87	4
— vulgò,	70	5	— Aldrovandi,		76	3
Girardel,	76	3	— Baltnero,		76	3
Girardella Columba,	87	8	— Gesneri,		76	3

	G.	S.		G.	S.
<i>Parus</i> ,	60	3	Grey Crested Gauding,	81	41
Glucr,	76	3	— Plover,	69	1
—	87	4	—	70	2
Goat-head,	76	1	— Snipe With à White		
Godwit,	76	1	neck, (Larger)	69	11
—	76	6	Griel,	69	12
— from Hudson's-Bay,			Grinetta,	87	8
(White-)	76	8	Grive-d'eau,	75	20
— (Greater American)	76	7	Grosse Wasser Hunle,	87	5
— (Red-breasted)	76	5	Grosser Brach-Vogel,	69	1
Goose of America, (Spur-			—	70	2
wing'd)	71	4	—	78	1
Gorriones de Oviedo,	69	1	— Ror-Reigel,	81	28
Grand Butor,	81	28	— Schnepf,	77	1
— Chevalier d'Italie,	67	1	Grosz Wasser Heunle,	87	5
— Courly d'Amérique,	78	8	Gru,	80	6
— Francolin de l'Améri-			Grua,	80	6
que,	76	7	Grue,	80	6
— Héron hupé,	81	10	— blanche de l'Améri-		
— Pluvier,	69	12	que,	80	10
— Pluvier de Bengale,	69	13	— brune & cendrée,	80	11
— Vanneau de Bologne,	70	5	— d'Amérique,	80	10
Grande Barge grise,	76	3	— de la Baye de Hud-		
— Barge rousse,	76	6	son,	80	11
— Grue de la Baye de			— de la Baye de Hudson,		
Hudson,	80	10	(Grande)	80	10
— Grue des Indes,	80	7	— de Numidie,	80	12
Grase-Schnepff,	77	2	— des Indes, (Grande)	80	7
Grafs-Schnepff,	77	2	— des Indes Orientales,	80	7
Graver Keuwit,	70	2	— du Japon,	80	9
Grauer Reigel,	81	1	— du Mexique,	80	8
Grawer Gyfitz,	70	2	Grugnetto,	87	8
Grauer Reigel,	81	1	Grúlla,	80	6
Great White Heron,	81	15	Gruner,	70	1
Greater American God-			— (Blaw-)	70	1
wit,	76	7	Grus,	80	6
— Indian Crane,	80	7	— Americana,	80	10
Greatest Snipe,	69	11	— Balearia, Aldrovan-		
Green Plover,	69	1	di,	84	1
Gren Legged Horseman,	76	3	— Balearia Willughbeji,	84	1
Greny,	78	1	— Balearica,	84	1
Greun-Feussel,	75	1	— Balearica Aldrovandi,	84	1
Greuner Keuwit,	69	1	— Balearica Plinii,	84	1

ALPHABETICUS.

xxxv.

		G.	S.			G.	S.
Grus Capensis fusca, &c.	84		I	Guignard,		69	5
— cinerea ferrivora,	63		I	— d'Angleterre;		69	6
— crispa,	81	24		Guignette,		75	2
— Freti Hudsonis,	80		II	Guinetta,		75	2
— Japonensis,	80		9	Guira-tinga,		81	15
— Japonensis alia,	80		9	— tinga Brasiliensibus,		81	15
— Japonensis Charleto- ni,	80		9	— tinga Brasiliensibus Marcgravii,		81	15
— Japonica,	84		I	Gulguruk,		10	I
— Japponensis,	80		9	Gustard,		66	I
— incurvato rostro, &c.	80		5	Gybitz,		70	I
— Indica,	80		8	Gybytz,		70	I
— Indica major,	80		7	Gyfitz,		70	I
— Indica Willughbeji,	80		8	— (Grawer)		70	2
— Mexicana,	80		8	Gyvitt,		70	I
— nostras,	80		6	Gywitt,		70	I
— Numidiæ,	80	12		H.			
— Numidica,	80	12			G.	S.	
— Orientalis Indica,	80		7	H Aeger,		81	I
Gruz,	80		6	H æmastica,		76	5
Guacu Brasiliensibus				Hæmantopus,		67	I
Marcgravio, (Nhan-				Hæmatopos, (Ardea)		81	35
du-)	63		I	Hæmatopus,		67	I
— Brasiliensibus, (Nhan-				—		68	I
du-)	63		I	— Aldrovandi, (Ardea)		81	35
— (Jabiru-)	80		4	— Bellonii,		68	I
— (Nhandu-)	63		I	— marinus, (Oiseau ap- pellé)		68	I
— Petiguaribus, (Jabi- ru-)	80		4	Haer-Sneff,		77	2
— Petiguaribus Marc- gravii,	80		4	Hahn, (Braufz-)		75	18
Guara,	78		6	Half-Schnepf,		77	3
—	78	12		— Snipe,		77	3
— Brasilianis dicta,	78	12		Hanikens,		78	I
— Brasiliensibus,	78	12		Har-Schnepf,		77	2
— Brasiliensibus Marc- gravii,	78	12		Haus-Teuffel,		75	18
— dicta, (Avis Brasilia- na)	78	12		Hawk's-Eye,		69	4
Guaranna,	78		6	Head, (Goat-)		76	I
— Brasiliensibus,	78		6	Heer-gans,		81	I
— Brasiliensibus Marc- gravii,	78		6	— Schnepfe,		77	2
				— Schnepff,		77	2
				Hegesar,		87	5
				Hegeschara,		87	5
				Heggeschaer,		87	5

	G.	S.		G.	S.
Heggfchar,	87	5	Héron ordinaire,	81	1
Heggfchaer,	87	5	— (Petit)	79	1
Hen, (Clucking-)	81	23	— pourpré,	81	12
— (Daker-)	74	3	— pourpré du Mexi-		
— (Little American Wa-			que,	81	13
ter)	87	9	— pourpré hupé,	81	14
— (Maderas Rail-)	87	10	— tacheté,	81	8
— (Small Water-)	87	8	Heron,	81	1
Herodias,	81	9	— (Ash-coloured)	81	1
Héron,	81		— (Blew)	81	3
—	81	1	—	81	42
—	81	2	— (Common)	81	1
—	81	6	—	81	2
—	81	39	— (Crested)	81	2
—	81	45	— from North-America,		
— blanc,	75	18	(Ash-colour'd)	81	7
—	81	15	— (Great White)	81	15
— blanc de la Caroline,	81	18	— (Largest Crested)	81	10
— blanc de M. Oldham,	75	7	— (Lesser Ash coloured)	81	45
— blanc du Brésil,	81	17	— (Little White)	81	18
— blanc du Mexique,	81	19	— (Red Legg'd)	81	16
— blanc, (Petit)	81	18	— (Scythe-bill'd)	78	4
—	81	20	— (White)	81	15
— bleu,	81	3	— (White and Spoon-		
—	81	42	bill'd)	79	1
— cendré,	81	1	Herr-gans,	81	1
—	81	4	Heunle, (Gescheckr Mott)	75	1
— cendré d'Amérique,	81	6	— (Grosz Wasser)	87	5
— cendré de l'Amérique			— (Schwartz Wasser)	74	1
Septentrionale,	81	7	Heunlein, (Aesch-)	74	1
— cendré du Mexique,	81	5	— (Wasser-)	73	3
— de la Baye de Hudson,	81	7	Heunlin, (Aesch-)	74	1
— du Brésil,	81	23	— (Bundt Wasser)	75	1
— (Espece de)	81	45	— mit Roten beinen,		
— étoilé,	75	18	(Wasser-)	75	3
— gris,	81	9	— (Mott-)	74	1
— hupé,	81	2	— (Wasser-)	77	2
— hupé de Cayenne,	81	3	Heyron,	81	1
— hupé de Virginie,	81	10	Hiaticula,	69	8
— hupé du Mexique,	81	11	— (Gazæ)	69	8
— hupé, Grand)	81	10	— Willughby,	69	8
— noir,	81	21	Himantopus,	67	
— noir à collier,	81	22	—	67	1

ALPHABETICUS.

xxxvij

	G.	S.		G.	S.
Hymantopus castaneus,			Huitres, (Preneur d')	68	I
&c.	67	I	Huitrier,	68	
— corpore gracili, &c.	68	I	—	68	F
— Maderaspatanus, &c.	67	I	Hun, (Brach-)	78	I
— Mexicanus,	67	2	—	78	2
— Plinii,	67	I	— (Gallinula quam nos-		
— Plinii, Aldrovandi,	67	I	tri vocant Brach-)	78	2
Himel-Geisz,	78	I	— (Schnepp-)	77	I
Himels Geisz,	77	2	— (Schneppf-)	77	I
— Ziege,	77	2	— (Wasser)	87	6
Himmel-Ziege,	70	I	— (Water-)	71	I
Himmels-Ziege,	77	2	Hunle, (Grosse Wasser)	87	5
Hirundinis ripariæ spe-			Hutti,	69	I
cies,	73	I	Hypoleucos,	75	2
Hirundo marina,	73	I	— (Gallinula)	75	2
— marina Aldrovandi,	73	I			
— marina Avis,	73	I			
Hoactli,	81	II	J Abiru,	80	5
— (Xoxouhqui-)	81	5	— Brasiliensibus,	80	5
—	81	II	— Brasiliensibus Marc-		
— (Xoxouqui-)	81	5	gravii,	80	5
Hoacton,	81	5	— Brasiliensium Marc-		
—	81	II	gravii,	80	5
Hoen, (Water-)	71	I	— -Guacu,	80	4
Hoitzilzatl,	81	19	— -Guacu Petiguaribus,	80	4
— dicta Hernandezii,	81	19	— -Guacu Petiguaribus,		
Holtz-Schneppfe,	77	I	Marcgravii,	80	4
— Schneppf,	75	14	Jaboûtra,	81	39
— Schneppe,	77	I	Jacana,	71	
Hooping Crane,	80	10	—	71	I
— Crane from Hudsen's-			— armata,	71	2
Bay,	80	10	— armata fusca,	71	4
Horn, (Domp-)	81	24	— armata nigra,	71	3
— (Domps-)	81	24	— armata varia,	71	5
Horseman, (Green Leg-			— armé,	71	2
ged)	76	3	— Brasiliensibus,	71	I
— (Red Legged)	75	4	— dicta, (Gallinula,		
Horsgioek,	75	I	Brasiliensis)	71	I
Hortybel,	81	24	— dicta Marcgravii, (Gal-		
Hovare,	80	2	linula Brasiliensibus)	71	I
Houn, (Meer-)	76	2	Jacanae alia species, Bra-		
—	76	3	siliensibus Aguape-		
Houtarde,	66	I	caca dicta,	71	2

	G.	S.		G.	S.
Jacanae quarta species,	71	4	Kemperken vocant, (Avis		
— tertia species,	71	3	quædam quam in		
Jack-Curlew,	78	1	Belgio)	75	18
— Snipe,	77	3	Keuwit, (Graver)	70	2
Jacuah,	62	1	— (Greuner)	69	1
Jandou,	63	1	Kifitz,	70	1
Jardu,	63	1	Κιγκλος,	75	1
Ibidis species,	78	12	—	75	10
Ibis,	78	12	Κικυψ,	80	2
—	78	13	Kill-Deer,	69	9
—	78	14	Kividit,	70	1
— alba Herodoto,	80	2	Kiwit,	70	1
— Bellonii,	78	13	Κλαρος,	80	6
— blanc,	78	14	Klein Brach-Vogel,	87	7
— candida,	78	14	Kleiner Brach-Vogel,	69	2
— nigra,	78	13	Knarren, (Korn)	74	3
— nigra Bellonii,	78	13	Knechte, (Alte)	74	3
— non ex toto nigra,	78	14	Knillis, (Rot-)	73	3
Ἰβίς,	78	13	Knot,	75	21
Icterus,	69	8	— agri Lincolnienfis,	75	21
Jeheras,	78	13	— Lincolnienfibus,	75	21
Jelvé,	77	2	Knuffell Leonardi Balt-		
Ἰμαντόπουλος,	67	1	neri, (Rot-)	73	3
Indian Bustard,	69	13	Kobel Regerlin,	73	1
— Crane, (Greater)	80	7	Koenig, (Wachtel)	74	3
Interpres,	72	1	— (Wachteln)	74	3
Jochualcuachili,	71	4	Kokofska,	73	3
Jud-Cock,	77	3	Kokofzká wodná,	87	6
Junco,	75	10	Koppriegerle,	73	1
— Bellonii,	75	10	Korn knarren,	74	3
Junger Kranich,	80	6	Κόττιφος ἑνυδρος,	75	19
Jut-Vogel,	78	1	Kou, (Mofs-)	81	24
			Kowipa,	70	1
			Kozielek,	70	1
			—	77	2
			Κυκχα,	80	2
	G.	S.	Kran,	80	6
K Aath;	79	1	Kranch,	80	6
Καλιδρίς,	75	3	Krane,	80	6
Kamichy,	86		Kranich,	80	6
—	86	1	— (Junger)	80	6
Kapoüa,	71	2	Κρεξ,	74	3
Kasper,	74	3	Krye,	80	6
Kemperken,	75	18			

ALPHABETICUS.

xxxix

	G.	S.		G.	S.
Kuh, (Moss-)	81	24	Limosa,	76	1
Kunner, (Velvet)	74	1	—	76	3
Kurlu,	78	1	— Americana rufa,	76	7
Kuvitz,	70	1	— candida,	76	8
Kuw, (Mos)	81	24	— fusca,	76	4
Kyvitta fusca,	70	2	— grisea,	76	2
— Schwcnckfeldii,	70	1	— grisea major,	76	3
Kyutz,	70	1	— rufa,	76	5
L.			— rufa major,	76	6
	G.	S.	— Venetorum,	76	3
L Ahul,	69	5	Lingulaca Gazæ,	76	3
Land Rail,	74	3	Little American Water		
Lap-wing,	70	1	Hen,	87	9
— wing Plover,	70	1	— Brown Bittern,	81	47
Larger Grey Snipe, With			— Bustard,	66	2
à White neck,	69	11	— White Heron,	81	18
Largest Crested Heron,	81	10	Loculator,	78	8
— (White Gauding)	81	15	Loeffel-Gans,	79	1
Lark, (Sea-)	69	8	Loeffler,	79	1
Least-Snipe,	75	10	Lohong,	66	3
Leepelaer,	79	1	Longlegs,	67	1
Lesser,	79	1	Looper, (Strand-)	75	10
Legged Horseman, (Red)	75	4	Los-rind,	81	24
Leglék,	80	2	Lusitanis Colherado,		
Leheras,	78	13	Marcgravii,	79	2
Lepelaer,	79	1	Lyfsklicker,	75	10
—	79	2	M.		
—	79	3		G.	S.
Lepler,	79	1	M Achuautha,	80	2
Lerlichirolo,	75	19	Macuarta,	80	2
Lesser Ash coloured He-			Maderas Rail-Hen,	87	10
ron,	81	45	Maguari,	80	3
— Curlew,	78	2	— Brasiliensibus,	80	3
Leucorodia,	79	1	— Brasiliensibus Marc-		
Leucorodios,	81	16	gravii,	80	3
Leucorodius,	79	1	Mâle de la Beccassine,	77	3
— Willughbei,	79	1	Mall-Snaepa,	77	2
— Willughbeii,	79	1	Marouïette,	74	2
Leverfina,	76	3	Marspitt,	68	1
Λευκεράδιος,	81	15	Martinete pescador,	81	11
Λευκοροδῖος,	79	1	Marueta,	74	2
Λευκοροδῖος,	79	1	Mafarino,	78	8
Limosa,	76		Mathoen,	67	1

	G.	S.		G.	S.
Matkern ;	87	7	Morinellus Anglicanus ;	69	6
Matkneltzell Leonardi			— Anglorum ,	69	5
Baltneri ,	87	7	— Avis Anglica ,	69	5
Matkern ,	87	7	— marinus D. Brown ,	72	1
Matknillis ,	75	1	— simpliciter , (Gavia)	69	5
Matuitui ,	69	8	Morkulla ,	77	1
—	78	9	Mos ,	81	24
— Brasiliensibus ;	69	8	— Kuw ,	81	24
Maubéche ,	75	14	— Reigel ,	81	24
— grise ,	75	16	Mosk-Kou ,	81	24
— grise , (Petite)	75	17	— Ochs ;	81	24
— tacherée ,	75	15	— Ochse ,	81	24
Meer-houn ,	76	2	— Reigel ,	81	24
—	76	3	Mosk-Reigel ,	81	24
— rind ,	81	24	Motacilla maritima ,	75	10
Melampus , (Gallinula)	73	3	— pectore albo , &c.	75	19
Melampus ,	73	3	Motacillæ genus ,	75	2
— Aldrovandi , (Gallinula)	73	3	Mott Heunle , (Gefcheckt)	75	1
— Aldrovando , (Gallinula)	73	3	— Heunlin ,	74	1
— Gefneri , (Gallinula)	73	3	Mycteria Americana ,	80	4
— Gefnero , (Gallinula)	73	3	Myrpytta ,	69	4
— Willughbeji , (Gallinula)	73	3			
— Willughby , (Gallinula)	73	3	N.		
Mere des Cailles ,	74	1	N Amicha ,	62	1
—	74	3	Nacht-rab ,	81	45
Merle-d'eau ,	75	19	— rabe ,	81	45
Merlo aquaiolo grande ,	67	1	— ram ,	81	45
Merula aquatica ,	75	19	Neamah ,	62	1
— aquatica Ornithologi ,	75	19	Negro ,	80	5
— novalium ,	70	2	Neppe ,	77	1
— rivalis ,	75	19	Nhandu apoa ,	80	4
Mire-Drum ,	81	24	— apoa Tupinambis ,	80	4
— Drumbel ,	79	1	— apoa Tupinambis ,		
Molliceps Aristotelis ,	77	2	Marcgravii ,	80	4
Monk Swan of S. Maurice's Island ,	65	1	— guacu ,	63	1
Moos-Kuh ,	81	4	— guacu Brasiliensibus ,	63	1
Morinella altera , (Gavia)	69	6	— guacu Brasiliensibus		
Morinellus ,	69	5	Marcgravio ,	63	1
			Nicticorax Gefneri ,	81	45
			Night-Raven ,	81	45
			Numenius ,	78	
			—	78	1
			— albus ,	78	10

ALPHABETICUS.

xlj

		G. V. S.				G. S.	
Numenius Aldrovandi,	78	I		O.			
— Americanus fuscus,	78	6					
— Americanus major,	78	8		O	Chs, (Mofs-)	81	24
— Americanus minor,	78	9			Ochse, (Mofs-)	81	24
— Brasiliensis candidus,	78	10			Ochsz, (Wasser-)	81	24
— Brasiliensis coccineus,	78	12			Ochra,	74	2
— Brasiliensis fuscus,	78	11			— (Gallinula)	74	2
— candidus,	78	A. I			—	75	I
— capite lineis quatuor,					— Gesneri, Aldrovandi,		
&c.	77	2			(Gallinula)	74	2
— castaneus,	78	5			Ochropus,	75	I
— fuscus,	78	11			— (Gallinula)	75	I
— Gesneri,	78	I			— magnus,	87	6
— holosericus,	78	13			— magnus Gesneri,	87	6
— Indicus,	78	12			— major, (Gallinula)	87	6
— Indicus Clusii,	78	12			— major Gesnero, Al-		
— Jonstoni,	78	I			drovandi, (Gal-		
— Madagascariensis,	78	3			linula)	87	6
— major,	78	I			— medius,	75	I
— medius,	76	I			— medius, (Gallinula)	75	I
— Mexicanus varius,	78	7			— medius Gesneri,	75	I
— minor,	78	2			— minor,	73	2
— niger,	78	8			— minor, (Gallinula)	73	2
— pedibus virescentibus,					Odeboer,	80	2
&c.	76	3			Odenfwala,	80	I
— pullus subtus albi-					Oedicnemo congener,	66	I
dus,	70	2			— congener Aldrovan-		
— puniceo-viridis,	78	4			di,	66	I
— rostri apice lævi,					Oedicnemus,	69	12
&c.	77	I			— Bellonii,	69	12
— rostro arcuato, &c.	78	I			οἰδικνυμνος,	69	12
—	78	2			Oiseau appellé Hæmato-		
— ruber,	78	12			pus marinus,	68	I
— subaquilus,	78	4			— de Riviere,	78	8
— veterum,	78	I			— nommé Crex,	76	2
— viridis,	78	4			— pourpré,	87	I
— uropygio albo, &c.	76	I			— -Royal,	84	
Numenio cognatus,	78	I			—	84	I
Numidian Crane,	80	12			οἰκνός,	81	24
Nycticorax,	81	45			— Aristotelis,	81	24
— (Germanis)	81	45			Olive,	66	2
— Ornithologi,	81	45			Ombrette,	82	
					—	82	I

	G.	V.	S.	G.	S.	
Onk, (Boo-)	81	46		66	3	
Onocrotalus Americanus, &c.	83	1		69	13	
—	83	A. 1		66	2	
Onouré des bois,	81	23		80	2	
Ortygometra,	74	3		75	19	
— Aldrovandi,	74	3		74	1	
— alis fuscis,	74	1		75	10	
— alia rufo-ferrugineis,	74	3		80	2	
— Bellonii,	74	1		66	1	
— Gesneri,	74	3		68	1	
— melina, &c.	66	2		66	1	
— subtrus albescens, &c.	74	1		66	1	
— tota rufa, &c.	74	3				
Ortygometra,	74	3		G.	S.	
Ostarde,	66	1		69	8	
—	69	12		86	1	
Ostardeau,	69	12		79	1	
Ostralega,	68			79	1	
—	68	1		70	1	
Ostralegus,	68	1		84	1	
Ostrich,	62	1		— de-mer,	75	18
Ostridge,	62	1		Paoncello,	70	1
Otarde,	66	1		Paonchello,	70	1
Orida,	66	1		Paonzello,	70	1
Oris,	66			Papechieu,	70	1
—	66	1		Parcus,	70	1
— Aldrovandi,	66	1		Pardales de Oviedo,	69	1
— Arabica,	66	3		Pardali Belloniicongener,	70	3
— Aristotelis,	66	1		Pardalis,	69	1
— auribus erecto-cristatis,	66	3		Παρδαλος,	70	2
— capite juguloque lævi,	66	2		Pardalus,	70	2
— Græcis,	66	1		— Aristotelis,	70	2
— jugulo utrinque cristato,	66	1		— minor,	69	2
— minor,	66	2		— primus,	78	1
Oris,	66	1		— primus Schwenckfeldii,	78	1
Otus plumbeus,	80	12		— quartus,	69	2
Outarde,	66	1		— secundus,	70	2
—	66	1		— tertius,	69	1
—	69	12		— tertius Schwenckfeldii,	69	1
				Parra Plinii,	70	1
				Partridge-Snipe,	77	4

ALPHABETICUS.

xliij

	G.	S.		G.	V. S.
Pavo agrestis Bellonio,	70	1	Petit Butor,	81	26
— agrestis Gefneri,	70	1	—	81	43
— agrestis Gefnero,	70	1	—	81	46
— cauda brevi,	84	1	— Butor brun,	81	47
— Chinenfis sine cauda,	84	1	— Corlieu,	76	2
— ex cinereo fuscus, &c.	84	1	—	78	2
— marinus,	84	1	— Courly,	78	2
— nigricans, brevicau-			— Courly d'Amérique,	78	9
dus, &c.	84	1	— Héron,	79	1
— sine cauda Chinenfis,	84	1	— Héron blanc,	81	18
Pavonzino,	70	1	—	81	20
Πελαγος,	80	2	— Pluvier,	69	5
Πελαργος,	80	2	— Pluvier à collier,	69	8
Πελαργος μέλις,	80	1	— Pluvier doré,	69	2
Pelecan,	79	1	— Râle d'eau,	74	2
— (American Scarlet)	79	3	Petite Alouette-de-mer,	75	A. 10
Pelecanus,	79	1	— Alouette-de-mer de		
— Aldrovandi,	79	1	S. Domingue,	75	13
— Ornithologi,	79	1	— Beccassine,	77	3
Pelekan,	79	1	— Espece de Bécassine,		
Πελεκάν,	79	1	(Plus)	77	3
Πελεκάνος, Arist.	79	1	— Foulque d'eau de		
Pélican,	79	1	l'Amérique,	87	9
— Américain,	78	8	— Maubéche grise,	75	17
Pelican,	79	1	— Outarde,	66	2
— (Wood)	78	8	— Poule d'eau,	87	8
Pelicanus,	79	1	— Poule-Sultane,	87	2
— Aldrovandi,	79	1	Pfisterlein Leonardi Balt-		
— Gefneri,	79	1	neri,	75	2
Pelikan,	79	1	Pful-Schnepff,	76	2
Pella Aristoteli,	81	1	Phæopos altera, (Galli-		
Pellicane,	79	1	nula)	78	2
Pellicano,	79	1	Phæopus,	78	2
Πελλάς,	81	1	— alter,	78	1/2
Perdix rustica,	77	1	— altera,	78	2
— rustica major,	77	1	— altera Gefneri,	78	2
— rustica minor,	77	2	— (Gallinula)	78	2
Perdrix-de-mer,	73		— Gallinula Gefneri,	78	2
—	73	1	Philomachus,	75	18
— -de-mer à collier,	73	2	Pica marina,	68	1
— -de-mer du Sénégal,	73	4	— marina Anglorum,	68	1
— -de-mer tachetée,	73	3	— marina Gallorum,	68	1
Perr,	75	10	Pickart,	81	24

	G.	S.		G.	S.
Pie de mer,	68	1	Platea fanguinea tota,	79	3
— (Sea-)	68	1	— Willughbeii,	79	1
Pigra,	70	1	Platelea Ciceronis,	79	1
Pilente,	75	2	Plateola,	79	1
Pilwegichen,	75	2	Platyrinchos,	79	1
Pilwenckgen,	75	2	Plover, (Bastard)	70	1
Pinirolo,	75	1	— (Chattering)	69	9
— Italis dicta, (Tringa			— (Green)	69	1
tertia Aldrovandi)	75	1	— (Grey)	69	1
Piper, (Sand-)	75	2	—	70	2
Pittoor,	81	24	— (Lap-Wing)	70	1
Pittouër,	81	24	— (Spotted-)	69	4
Pivier,	69	1	— (Stone-)	70	2
—	78	1	—	76	1
— Montano,	70	2	—	76	6
Piviero,	69	1	— (Whistling)	69	1
Piwip,	70	1	Pluiero,	76	3
Pizzaccara,	76	1	Plus petite espece de Bé-		
—	77	1	cassine,	77	3
Pizzardella,	77	2	Pluvialis,	69	
Plaskonos,	79	1	—	69	1
Platalea,	79	1	— altera species,	69	2
— corpore albo,	79	1	— arenaria nostra, Raji,		
— corpore fanguineo,	79	2	(Gavia, quæ)	72	1
—	79	3	— aurea,	69	1
Platea,	79	1	— aurea Freti Hudsonis,	69	4
—	79	1	— aurea minor,	69	2
— Aldrovandi,	79	1	— Bengalensis major,	69	13
— Americana, &c.	79	2	— cinerea,	70	2
— Americana phœnicea,	79	3	— cinerea flavescens,	70	2
— Brasiliensis,	79	2	— cinerea, Squatarola		
— Brasiliensis, Ajaia dic-			Venetiis dicta,	70	2
ta Marcgravii,	79	2	— cinereus, &c.	69	1
— candida,	79	1	— Dominicanensis aurea,	69	3
— coccinea,	79	3	— Dominicanensis torqua-		
— incarnata,	79	3	ta,	69	10
— Mexicana,	79	3	— ex fusco & albo varia,		
— Mexicana Hernandez-			&c.	69	11
zii,	79	3	— flavescens,	69	1
— Mexicana Nierember-			— flavo-cinerea,	75	6
gii,	79	3	— flavo-virescens,	69	1
— Plinii,	79	1	— fusco-cinerea, rarior		
— rosea,	79	2	species,	75	2

ALPHABETICUS.

xlv

	G.	S.		G. V. S.
Pluvialis Jamaicensis torquata,	69	11	Pluvier, (Petit)	69 5
— major,	69	12	— verd,	69 1
—	76	3	Poche,	79 1
— major Aldrovandi,	76	3	Pol-Schnep,	76 2
— major Aldrovando,	76	3	Poliopus,	87 8
— miniatis cruribus,	69	8	— Gallinula minor Al-	
— minor,	69	2	drovandi,	87 8
—	69	5	Polit,	78 1
— nigro-flavus,	69	4	Polla,	77 1
— Perfica cristata,	69	14	Polle,	87 5
— Senegalensis armata,	69	15	Pool-Snipe,	75 3
— torquata,	69	7	—	75 8
— torquata minor,	69	8	Porc mari,	87 1
— totus cinereus,	70	2	Porcellana,	87 8
— Virginiana torquata,	69	9	Porphyrio,	87
— viridis,	69	1	—	87 1
— viridis, &c.	69	11	— Amboinenfis, (Avis)	78 12
— viridis Gesneri,	69	1	— Americanus, &c.	71 2
Pluvier,	69		— Americanus Hernan-	
—	69	1	dezii,	87 1
—	69	8	— Americanus Nierem-	
— à collier,	69	7	bergii,	87 1
— à collier de la Jamaïque,	69	11	— (Ardea)	78 12
— à collier de S. Domingue,	69	10	— cæsius, &c.	87 1
— à collier de Virginie,	69	9	— Freti Hudsonis,	87 9
— à collier, (Petit)	69	8	— fuscus,	87 4
— armé du Sénégal,	69	15	— Maderaspatanus,	87 10
— criard,	69	9	— melanocephalos,	87 A. 1
— de Bengale, (Grand)	69	13	— minor,	87 2
— des Indes à la gorge			— nævius,	87 8
noire,	69	4	— nigricans, &c.	75 1
— doré,	69	1	— olivarius, &c.	87 3
— doré de la Baye de			—	87 4
Hudson,	69	4	— punctulatus,	87 7
— doré de S. Domingue,	69	3	— rufescens,	87 5
— doré, (Petit)	69	2	— rufus,	87 6
— (Grand)	69	12	— viridis,	87 3
— gris,	70	2	Porphyrio,	87 1
— hupé de Perse,	69	14	Πορφυριαν,	87 1
— moucheré,	69	4	Porzana,	74 1
			—	74 2
			—	87 8
			— Italarum,	74 2

I N D E X

	G.	V.	S.		G.	S.
Porzana minor,	74		2			
Pouacre,	81		31			
Poule,	87	A.	1			
—-d'eau,	71		2	Q		
—-d'eau aux ailes épe-				Uachilto,	87	1
ronnées,	71		5	— Hernandezii,	87	1
—-d'eau, (Petite)	87		8	— Nierembergii,	87	1
—-Sultane,	87			Quachilton,	87	1
—	87		1	Quack,	81	45
—-Sultane à tête noi-				Quaglie, (Re de)	74	3
re,	87	A.	1	Quaiotta, (Ardea)	81	33
—-Sultane brune,	87		4	Quiratinga,	81	15
—-Sultane de la Baye						
de Hudson,	87		9	R		
—-Sultane de Madrast,	87		10	Ab, (Nacht-)	81	45
—-Sultane mouchetée,	87		7	Rabe, (Nacht-)	81	45
—-Sultane, (Petite)	87		2	Rail,	74	3
—-Sultane rouffâtre,	87		5	— (Bengall Water)	75	9
—-Sultane rouffe,	87		6	—-Hen, (Maderas)	87	10
—-Sultane tachetée,	87		8	— (Land)	74	3
—-Sultane verte,	87		3	— (Water-)	74	1
Pratincola,	73		1	Râle,	74	
Preneur d'Huitres,	68		1	— à collier des Philip-		
Pstros,	62		1	pines,	74	6
Ptak bitny,	75		18	— brun des Philippines,	74	7
— deszczowy,	69		1	— d'eau,	74	1
— deszczowy popiela-				— d'eau de Bengale,	75	9
ty,	70		2	— d'eau, (Petit)	74	2
Pugnacem vocant, (Avis				— de Genet,	74	3
quædam, quam in				— de l'Amérique,	74	8
Belgio)	75		18	— de Virginie,	74	8
Pugnax,	75		18	— des Philippines,	74	4
— Aldrovandi, (Avis)	75		18	— rayé des Philippines,	74	5
— (Avis)	75		18	Ralla Anglorum,	74	1
— (Glareola)	75		18	— Anglorum aquatica,	74	1
Pulla d'Aigua,	87		4	— Gallorum,	74	1
Pulrosz,	69		1	Ralle,	74	1
Pulver,	69		1	Rallus,	74	
Pulvier,	69		1	— alis griseis, &c.	74	1
Purpur-Vogel,	87		1	— alis rufo-ferrugineis,	74	3
Pusch-Schneppe,	77		1	— aquaticus,	74	1
				— aquaticus, &c.	87	1
				— aquaticus Aldrovandi,	74	1
				— aquaticus Bengalen-		
				sis,	75	9

ALPHABETICUS.

xlviij

	G.	S.		G.	S.
Rallus aquaticus minor,	74	2	Reeve,	75	18
— Benghalensis,	75	9	Regen-Vogel,	78	F
— Carolinus,	87	9	—	78	2
— corpore vertice oculisque albis, &c.	75	9	Reger,	81	F
— digitis triuncialibus, &c.	71	5	— (Aschenfarbener)	81	F
— Genistarum,	74	3	— (Blawer)	81	F
— grisea, &c.	87	9	— (Bundter)	81	45
— Philippensis,	74	4	— (Rodter)	81	34
— Philippensis fuscus,	74	7	— (Sand-)	81	34
— Philippensis striatus,	74	5	— (Schild)	81	45
— Philippensis torquatus,	74	6	— (Schwartzter)	81	21
— terrenus,	87	5	— (Weisser)	81	15
— terrestris,	74	3	Regerlin, (Kobel)	73	F
— terrestris Americanus,	74	8	— (Sand)	73	2
— Virginianus,	74	8	Rei-Dommel,	81	24
Ram, (Nacht-)	81	45	Reigel,	81	F
Raphus,	65	F	— (Blauwer)	81	F
—	65	F	— (Grauer)	81	F
Rarg,	81	F	— (Grauwer)	81	F
Raflet,	87	3	— (Grosser Ror-)	81	28
Rasse,	74	F	— (Mos-)	81	24
— de Genet,	74	3	— (Mofs-)	81	24
— noir,	74	F	— (Mofz-)	81	24
— rouge,	74	3	— (Rohr-)	81	24
Raven, (Night-)	81	45	— (Ros-)	81	24
Rayer,	81	F	— (Weisser)	81	15
Re de Quaglie,	74	3	Reiger,	81	F
Recentiorum Bistarda,	66	F	—	81	15
— Tarda,	66	F	— (Wyffer)	81	15
Recurvirostra pectore croceo,	76	5	Reigher,	81	F
Red-breasted Gotwit,	76	5	Reiher,	81	F
— Curlew,	78	12	Rein-Vogel,	87	7
— Legg'd Heron,	81	16	Rex Coturnicum,	74	3
— Legged Crane,	67	F	Rhaad,	66	2
— Legged Horseman,	75	4	Rhea,	63	F
— Shank,	68	F	—	63	F
—	75	3	Rhodopos, (Gallinula)	75	F
— Shank, (White)	75	8	Rhodopus,	75	F
Redshanca Turneri,	75	3	— (Gallinula)	75	F
			— Gesneri, (Gallinula)	75	F
			Riegerle,	73	2
			Riegerlin,	73	2
			Rieggher,	81	F

	G.	S.		G.	S.
Riet-Schnepff,	77	1	Rusticula major,	77	1
Rind, (Los-)	81	24	— minor,	77	2
— (Meer-)	81	24	— sylvatica,	75	14
— (Us-)	81	24			
Rodter Reger,	81	34	S.		
Roer-Drum,	81	24		G.	S.
Rohr-Drummel,	81	24	S Af-Saf,	66	2
— Reigel,	81	24	Sagifer,	78	4
— Trumen,	81	24	Samethounle,	74	1
Roi de Cailles,	74	3	Sand-piper,	75	2
Ronzefa,	77	1	— Reger,	81	34
Ropezora,	77	1	— Regerlin,	73	2
Ror-Dummel,	81	24	— Vogel,	73	1
— Reigel, (Groffer)	81	28	Sanderling,	75	17
Ros-Dam,	81	24	— d'Arbres,	75	10
— Dump,	81	24	— de Cornouaille,	75	17
— Dumpf,	81	24	Saouakou,	83	1
— Reigel,	81	24	— des bois,	83	2
— trumm,	81	24	Scarlet Curlew of Brasil,	78	12
Rostrum Sudis,	75	4	— Pelecan, (American)	79	3
Rot-bein,	75	3	— Spoon-bill, (Ameri-		
— Feuffel,	75	3	can)	79	3
— Knillis,	73	3	— Spoon-bill'd Bird of		
— knuffel Leonardi			America,	79	3
Baltneri,	73	3	Schalach,	81	1
Roten beinen, (Wasser-			Schalenuna,	81	1
Heunlin mit)	75	3	Schild Reger,	81	45
Rott-bein,	75	3	Schmirring,	87	6
Roupeau,	81	45	— dictum, (Gallinulae		
Roy des Cailles,	74	1	aquaticae quartum		
—	74	3	genus)	87	6
Ruff,	75	18	Schnep-Hun,	77	1
Ruffe,	75	18	— (Pol-)	76	2
Rukicola,	77	1	Schnepf, (Groffer)	77	1
Ruffey,	81	24	— (Half-)	77	3
Rusticola,	77	1	— (Har-)	77	2
— Aldrovandi, (Scolo-			Schnepfe, (Berg-)	77	1
pax,)	76	1	— (Heer-)	77	2
— aquatica,	78	6	— (Holtz-)	77	1
— maritima minor,	78	6	— (Wald-)	77	1
Rusticula,	77	1	— (Wasser-)	77	2
—	77	2	Schnepff,	77	1
— aquatica Brasiliensibus,	78	6	— (Grafe-)	77	2

ALPHABETICUS.

xlix

	G. V. S.		G.	S.	
Schnepff, (Grafs-)	77	2	Scolopax minima,	77	3
— (Heer-)	77	2	— minima, &c.	77	3
— (Holtz-)	75	14	— minor,	77	2
— -Hun,	77	1	— minor aliis,	77	2
— (Pful-)	76	2	— quæ Capella cœlestis		
— (Riet-)	77	1	Authorum,	77	2
— (Wald-)	75	14	— rostro arcuato, &c.	78	1
Schnepffe,	77	1	—	78	2
—	77	2	—	78	10
— (Wasser-)	77	2	—	78	11
Schnepfflin,	77	2	—	78	12
Schnepfle, (Bruch-)	77	2	— rostro recto, &c.	75	3
Schneppe, (Berg-)	77	1	—	76	3
— (Holtz-)	77	1	—	76	6
— (Pusch-)	77	1	— rostro recto apice tu-		
— (Wald-)	77	1	berculato, &c.	77	2
Schnercker,	74	3	— rostro recto flavescen-		
Schœniclos,	75	10	te, &c.	76	5
Schœniclus,	75	10	— rostro recto lævi, &c.	76	1
Schoffer,	79	1	—	77	1
Σχοιινκλος,	75	10	— rostro recto longo,		
Schovelard,	79	1	&c.	76	7
Schoveler,	79	1	— rostro subrecurvato,		
Schryck,	74	3	&c.	76	5
Schrye,	78	1	— rubra,	78	12
Schryk,	74	3	— Rusticola Aldrovan-		
Schuffler,	79	1	di,	76	1
Schwartz Wasser Heunle,	74	1	— simpliciter Aldrovan-		
Schwartzzer Reger,	81	21	di,	77	1
— Storch,	80	1	— simpliciter Aristote-		
— Storch, (Braun-)	80	1	lis,	77	1
— Storck,	80	1	— subtus fulva, &c.	77	1
Scolopax,	77		Scops,	80	12
—	77	1	Scopus,	82	
—	77	2	—	82	1
— alba,	77	A. 1	Scorzana,	87	8
—	78	10	Scur-Vogel,	80	4
— Aldrovandi,	77	1	— Vogel, Marcgravii,		
— candida,	77	A. 1	(Belgis)	80	4
— cinerea minor, &c.	77	2	Scythe-bill'd Heron,	78	4
— fusca,	78	11	Sea-Dotterel,	72	1
— Lapponica,	76	5	— Dotterel,	72	1
— media,	77	2	—	72	2

INDEX

	G.	S.		G.	S.
Sea-Dottrell ,	72	1	Snipe , (Jack-)	77	3
— Lark ,	69	8	— (Least-)	75	10
— Pie ,	68	1	— (Partridge-)	77	4
— Swallow ,	73	1	— (Pool-)	75	3
Second Crabier ,	81	3	—	75	8
See-Amsel ,	75	19	Snite ,	77	2
— Taube ,	69	1	Soco ,	81	23
Segonya ,	80	2	— Brasiliensibus ,	81	23
Serica dicta , (Gallinago)	74	1	— Brasiliensibus Marc-		
— dicta , (Gallinula)	74	1	gravio ,	81	23
Σίπυς ,	80	6	Soree ,	74	8
Sgainolo ,	75	1	Spar ,	75	10
Sguacco ,	81	37	Spatula dicta , (Ardea		
—	81	45	Phoenicea ,)	79	3
— vocant , (Ardeæ aliud			— dicta , (Ardea rosea ,)	79	2
genus , quam)	81	37	Spatule ,	79	
— vocant in vallibus dic-			—	79	1
tis Malalbergi , Al-			—	79	2
drovandi , (Ardea			— couleur de rose ,	79	2
quam)	81	37	— rouge ,	79	3
Shank , (Red-)	68	1	Spinzago ,	78	1
—	75	3	Spoon-bill ,	79	1
— (White Red-)	75	8	— bill , (American Scar-		
Sichler ,	78	4	let)	79	3
Siewká ,	87	7	— bill'd Bird of America		
Siewniczká ,	87	7	(Scarlet)	79	3
Sieyka ,	87	7	— bill'd Heron , (White		
Σκολοπαξ ,	77	1	and)	79	1
Slangen-Vreeter ,	79	1	Spotted-Plover ,	69	4
Slomká ,	77	1	— Tringa ,	75	20
Small Bittern ,	81	32	Spur - Wing'd Goose of		
—	81	43	America ,	71	4
— Water-Hen ,	87	8	Squaiotta ,	81	33
Snaeppa ,	75	2	— dicta Malalbergi , Al-		
— (Mall-)	77	2	drovandi , (Ardea		
— (Wald-)	77	2	vulgò)	81	33
Sneff , (Haer-)	77	2	— dicitur Malalbergi ,		
Sneppe ,	77	1	(Ardeæ alia spe-		
Snipe ,	75	10	cies , quæ vulgò-)	81	33
—	77	2	— Italarum ,	81	33
— (Gid-)	77	3	Squatarola ,	70	2
— (Greateft)	69	11	— Venetiis dicta , (Plu-		
— (Half-)	77	3	vialis cinerea)	70	2

ALPHABETICUS.

	G.	S.		G.	S.
Starda,	66	I	Στρούδος μεγάλη,	62	I
Stare, (Watn-)	75	19	Struijs, (Vogel)	62	I
Stein-beyffer,	75	10	Strus,	62	I
— bicker,	75	10	Strufs,	62	I
Steingaellyl,	75	I	Struthio,	62	I
Steingallell Leonardi			—	62	I
Baltneri,	75	I	—	63	●
Stella,	66	2	— Africa,	62	I
— Avis,	66	2	— Americanus,	63	I
— Avis Aldrovandi,	66	2	—-Camelus,	62	I
— Avis dicta,	66	2	—	63	I
Stint,	75	10	—-Camelus Africanus,		
— dicta, (Avis The)	75	10	pullus,	62	I
Stone Curlew,	69	12	—-Camelus America-		
— from Hudson's Bay,			nus,	63	I
(Turn-)	72	I	—-Camelus Americanus		
— Plover,	70	2	Marcgravio,	63	I
—	76	I	— cucullatus,	65	I
—	76	6	— digito postico rotun-		
— (Turn-)	72	I	dato mutilo,	63	I
—	72	2	— ex China, Vischer,	84	I
Storch,	80	2	— Libycus,	62	I
— (Braun-Schwartz)	80	I	— nothus,	63	I
— (Schwartz)	80	I	— pedibus didactylis,	62	I
— (Weisser)	80	2	— pedibus tetradactylis,		
Storck,	80	2	&c.	65	I
— (Schwartz)	80	I	— pedibus tridactylis,		
Stork,	80	2	&c.	64	I
— (Black)	80	I	— pennis candidissimis,		
— (White)	80	2	&c.	62	I
Strand-Looper,	75	10	Strutho-Camelus,	62	I
Strandfkjura,	68	I	Strutz,	62	I
Strandpipare,	69	8	Strutza,	62	I
Straus,	62	I	Struzzo,	62	I
—-Vogel,	62	I	Στρούδος,	62	I
Straufs,	62	I	Sturnus niger, &c.	75	19
Στρούφοκαμήλος,	62	I	Sturzo,	62	I
Στρούφοχάμαιλος,	62	I	Sudis, (Rostrum)	75	4
Στρούθοϊοκαμήλος,	62	I	Suri,	63	I
Στρούθοκαμήλος,	62	I	Swallow, (Sea-)	73	I
Στρούδος,	62	I	— (Water-)	75	10
Στρούδοιοκαμήλος,	62	I	Swan of S. Maurice's Is-		
Στρούδος λιθικός,	62	I	land, (Monk-)	65	I

	G.	S.		G.	S.
<i>Συρίσις</i> ,	80	6	<i>Τέρπιξ</i> ,	66	1
T.			Teuffel, (Haus-)	75	18
Tail, (Wag-)	70	2	Tewit,	70	1
Tamacia,	83	2	Thouyou,	63	
— alia,	83	2	—	63	1
— Brasiliensibus dicta,	83	2	Thouyouyou,	63	1
— Brasiliensibus dicta			Tiklin,	74	4
Marcgravii,	83	2	—	74	5
— Brasiliensibus Marc-			—	74	6
gravii,	83	2	—	74	7
Tantalus,	78	8	Tinga Brasiliensibus,		
<i>Ταὸς Ἄγριος</i> ,	70	1	(Guira-)	81	15
Tarangolo,	78	2	— Brasiliensibus Marc-		
Taraniolo,	78	2	gravii, (Guira-)	81	15
Tarax Nemesiani,	66	1	— (Guira-)	81	15
Tarda,	66	1	Titulus tepidi temporis		
— Aldrovandi,	66	1	Petronio,	80	2
— Arabs,	66	3	Tlahquechul,	79	3
— Avis,	66	1	— Hernandezii,	79	3
— Avis Aldrovandi,	66	1	— Nierembergii,	79	3
— Isidori,	66	1	Tlauquechul,	79	3
— Isidoro,	66	1	Tobaçtli,	81	11
— Mechaensis Arabica,	66	3	Tolck,	72	1
— nana,	66	2	Toquilocoyotl,	80	8
— Pyrenaica, fulva, &c.	66	1	Tordo Gelfemino,	87	8
— Recentiorum,	66	1	Torquato,	78	1
— (Recentiorum)	66	1	Toru de Garriga,	81	28
— simpliciter,	66	1	Totano,	76	2
Tarlino,	78	1	—	76	3
Taube, (See)	69	1	Totanus,	75	3
Taurus Plinii,	81	24	—	76	1
Tcheluk,	77	1	—	76	2
Telamon,	87	1	— Aldrovandi,	76	1
Terlino,	78	1	— alter,	75	4
Terrabusa,	81	24	— Bengalensis,	75	9
Terrabuso,	81	24	— candidus,	75	8
Tetraon Longolio,	66	1	— cinereus,	75	7
Tetrax,	66	2	— cinereus, &c.	76	1
— Bellonii,	66	2	— fulvus, &c.	76	5
— Bellonii, Aldrovan-			— Gesneri,	75	3
di,	66	2	— nævius,	75	6
— Nemesiani,	66	1	— Ornithologi,	76	2
			— ruber,	75	4

ALPHABETICUS.

liij

	G.	S.		G.	S.
Totanus striatus,	75	5	Tringa rostro lævi,	75	1
Tourne pierre de la Baye			&c.	75	2
de Hudson,	72	1	—	75	7
Trana,	80	6	—	75	21
Trapp,	66	1	— rostro nigro, &c.	70	2
— (Acker-)	66	1	—	75	3
— gans,	66	1	— rostro pedibusque ru-		
— gans,	66	1	bris, &c.	75	4
Trappa, (Anfer)	66	1	— (Spotted)	75	20
Trappe,	66	1	— subcinerea, &c.	69	11
— (Acker)	66	1	— tacheté,	75	20
Tree Widdle,	75	10	— tertia,	75	1
Triel,	69	12	— tertia Aldrovandi,	75	1
Tringa,	75		— tertia Aldrovandi,		
—	75	1	Giaroncello Italis		
— Aldrovandi,	75	1	dicta,	75	1
— alia,	75	1	— tertia Aldrovandi,		
— Augusti mensis,	70	2	Pinirolo Italis dic-		
— cinerea, &c.	75	21	ta,	75	1
— cristâ dependente,			Trochilus Junio,	87	6
&c.	70	1	— terrestris,	87	5
— facie papillis granula-			Trombone,	81	24
lis, &c.	75	18	Trostle, (Wasser-)	75	19
— littorea,	75	7	Truble,	79	1
— luteo cinereoque ma-			Trumbotto,	81	24
culata, &c.	75	4	Trumen, (Rohr-)	81	24
— maritima,	72	1	Trumm, (Ros-)	81	24
— minor,	75	2	Τρυγας,	75	1
— nigra, albo punctata,			Trynga,	75	1
&c.	75	1	—	75	19
— nigro, albo, ferrugi-			— alia,	75	1
neoque variegata,			— altera,	75	1
&c.	72	1	— quarta,	75	10
— nigro-fusca, &c.	70	2	— secunda,	75	1
— pedibus rubris,	75	18	Tryngas,	75	1
— pedibus rubris, &c.	70	1	Tullfiz,	73	2
—	72	1	Turdus aquaticus,	75	19
— prima,	75	1	—	75	20
— pulla, &c.	75	10	Turn-Stone,	72	1
— quinta,	75	2	—	72	2
— remigibus fuscis, &c.	75	7	— Stone from Hudson's		
— rostri apice punctato,			Bay,	72	1
&c.	75	1			

	V.	G.	S.	G.	S.
Vogel, (Frembder-)				87	I
— (Froembder)				67	I
— (Geifz-)				78	I
— (Groffer Brach-)				69	I
—				70	2
— Alberto magno,		70	I	78	I
— Aldrovandi,		70	I	78	I
— Bononienfis major,		70	5	87	7
— Dominicanfis arma-				69	2
— tus,		70	8	80	4
— fufcus,		70	2	87	I
— grifeus,		70	2	78	I
— Helveticus,		70	4	78	2
— Indicus,		69	14	87	7
— Ludovicianus arma-				73	I
— tus,		70	7	80	4
— Senegalenfis arma-				62	I
— tus,		70	6	62	I
— torquatus, &c.		70	I	65	I
— varius,		70	3	78	4
Vanneau,		70		78	I
—		70	I	78	I
— armé de la Louifia-				79	I
— ne,		70	7	81	24
— armé de S. Domin-				74	3
— gue,		70	8	74	3
— armé du Sénégal,		70	6	70	2
— de Bologne, (Grand)		70	5	77	I
— de Suiſſe,		70	4	75	14
— gris,		70	2	77	I
— varié,		70	3	77	2
Velvet Kunner,		74	I	65	I
Vetola,		76	I	78	I
Videcocq,		77	I	75	19
Videcocq,		77	I	87	5
Virgo,		80	12	74	I
— Numidica,		80	12	73	3
Vivago Bodini,		69	I	77	2
Vogel, (Brach-)		69	I	75	I
—		73	I	— Heunlin mit Roten	
—		78	I	beinen,	75
—		78	2	— Hun,	87
—		87	7	— Hunle, (Grolle)	87
					5

ALPHABETICUS.

			Iv.		
G. V. S.			G. V. S.		
Wasser-Ochsz,	81	24	Wind-Vogel,	78	I
— Schnepfe,	77	2	Wing, (Lap-)	70	I
— Schnepffe,	77	2	— Plover, (Lap-)	70	I
— Trostle,	75	19	Wipa,	70	I
Water-Crake,	75	19	Wood-Cock,	77	I
— Curlew,	78	I	— Cock, (White)	77	A. I
— Hen, (Little Ameri-			— Pelican,	78	8
can)	87	9	Wynkernell,	74	2
— Hen, (Small)	87	8	Wynkernnell,	74	2
— hoen,	71	I	Wyffer Reiger,	81	15
— hun,	71	I			
— Ouzel,	75	19	X.		
— Rail,	74	I			
— Rail, (Bengall)	75	9	X Oxouhqui-hoactli,	81	5
— Swallow,	75	10	—	81	11
Watn-Stare,	75	19	Xoxouqui-hoactli,	81	5
Weisser Reger,	81	15	Xoxouquihaactli, (Avis)	81	13
— Reigel,	81	15	<i>Eulopis,</i>	77	I
— Storch,	80	2			
Weltfcher-Vogel,	78	4	Y.		
Wetter-Vogel,	78	I			
Whaupe,	78	I	Y Acacintli,	87	I
Whimbrel,	78	2	Yacatopil,	75	4
Whimbrell,	78	2	Yandou,	63	I
Whistling Plover,	69	I	Yarwhelp,	76	6
White and Spoon-bill'd			Yarwip,	76	6
Heron,	79	I	Yohualeuachili,	71	4
— Curlew,	78	10	Yohualquachili,	71	4
— Gaulding,	81	15			
— Gaulding, (Largest)	81	15	Z.		
— Godwit from Hud-					
son's-Bay,	76	8	Z Akid,	80	2
— Heron,	81	15	Ziege, (Himels)	77	2
— Heron, (Great)	81	15	— (Himmel-)	70	I
— Heron, (Little)	81	18	— (Himmels-)	77	2
— Red-Shank,	75	8	Zigogna,	80	2
— Stork,	80	2	Zoltaczek,	69	8
— Wood-Cock,	77	A. I	Zoraw,	80	6
Widdle, (Tree)	75	10	—	81	I
Wimbrel,	78	2	Zweiel,	70	I

AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de manière qu'en s'ouvrant, elles puissent sortir du Livre, & se voir à droite dans l'ordre qui suit.

Page	16. Planches I.
32.	II.
42.	III.
90.	IV, V, VI & VII.
120.	VIII, IX & X.
140.	XI.
176.	XII, XIII, XIV & XV.
260.	XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI & XXII.
292.	XXIII, XXIV & XXV.
310.	XXVI.
350.	XXVII, XXVIII & XXIX.
360.	XXX.
390.	XXXI, XXXII & XXXIII.
502.	XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX & XL.
514.	XLI.
544.	XLII.

ERRATA.

Par-tout où vous trouverez épron lisez éperon	
Page	15 ligne 32. ILAND lisez ISLAND
88	36. primam lege nonam
129	17. épronées. lisez éperonnées.
205	22. pennæ lege penna
243	14. proche lisez proches
264	17. abicat lege albicat
273	35. autérieurs lisez antérieurs
277	29. entensâ lege extensâ
284	16. mer Du ca- lisez mer. Du ca-
362	31. SNIDY lisez SNIADY
371	22. j'ai vue lisez j'ai vue
398	6. extrema lege extremam
413	2. Lévars lisez Lézards
465	22. plume lisez plumes
i	13. Cafuarii lege Casuarii
xxxv	9. Gulguruk, 10 1 lege Gulguruk, 70 1



